



MINISTERIO DEL TRABAJO

ANEXO TÉCNICO

MANUAL ÚNICO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL

TÍTULO PRELIMINAR

1. Estructura.

El Anexo Técnico: Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional hace parte integral del presente Decreto y está conformado por dos (2) títulos: Título I - "VALORACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS" y Título II - "VALORACIÓN DEL ROL LABORAL, OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES". Los contenidos de cada uno de los Títulos se pueden observar en la Figura 1.

Figura 1. Estructura del Anexo Técnico del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional.

TÍTULO PRIMERO	TÍTULO SEGUNDO
VALORACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS	VALORACIÓN DEL ROL LABORAL, ROL OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES
<p>Capítulo 1 Deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer.</p> <p>Capítulo 2 Deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular.</p> <p>Capítulo 3 Deficiencias por trastornos del sistema respiratorio.</p> <p>Capítulo 4 Deficiencias del sistema digestivo.</p> <p>Capítulo 5 Deficiencias del sistema urinario y reproductor.</p> <p>Capítulo 6 Deficiencias por trastornos de la piel, faneras y daño estético.</p> <p>Capítulo 7 Deficiencias por alteraciones del sistema hematopoyético.</p> <p>Capítulo 8 Deficiencias por alteraciones del sistema endocrino.</p> <p>Capítulo 9 Deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular.</p> <p>Capítulo 10 Deficiencias por alteraciones del olfato, del gusto, de la voz, del habla y de las vías aéreas superiores.</p> <p>Capítulo 11 Deficiencias por alteraciones del sistema visual.</p> <p>Capítulo 12 Deficiencias del sistema nervioso central y periférico.</p>	<p>Capítulo 1. Generalidades.</p> <p>Capítulo 2. Calificación del rol laboral.</p> <p>Capítulo 3. Calificación de otras áreas ocupacionales.</p> <p>Capítulo 4. Valoración de roles ocupacionales.</p>

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- | | |
|---|--|
| Capítulo 13 Deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento.
Capítulo 14 Deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores.
Capítulo 15 Deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y la pelvis. | |
|---|--|

2. Principio de Integralidad.

El Manual acoge el principio general de “integralidad” como soporte de la metodología que se expondrá en adelante para calificar las deficiencias en la capacidad laboral u ocupacional. La integralidad es referida al Modelo de la Ocupación Humana que describe al ser humano desde tres (03) componentes interrelacionados: volición, habituación y capacidad de ejecución; estos tres (03) aspectos tienen en cuenta los componentes biológico, psíquico y social de las personas y permiten establecer y evaluar la manera como se relacionan con su ambiente.

La calificación integral de la invalidez, es decir del 50% o más de pérdida de la capacidad laboral, procede conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-425 de 2005 de la Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, que dispone que las entidades competentes deberán hacer una valoración integral, que comprenda tanto los factores de origen común como los de índole laboral.

3. Principios para la distribución porcentual de los títulos I y II

Para efectos de calificación, el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, se distribuye porcentualmente de la siguiente manera: El rango de calificación oscila entre un mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de cien por ciento (100%), correspondiendo, cincuenta por ciento (50%) al Título Primero (Valoración de las deficiencias ponderadas) y cincuenta por ciento (50%) al Título Segundo (Valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales) del Anexo Técnico. Para efectos del parágrafo 4 del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, se aplica el término **deficiencia**, sin ponderar con el respectivo valor porcentual.

Tabla 1. Distribución porcentual usada en el Manual

Titulo	Distribución porcentual
Título Primero: <i>Valoración de las deficiencias (ponderadas)</i>	50%
Título Segundo: <i>Valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales.</i>	50%

Esta ponderación obedece al modelo de evaluación usado en el Método Basile, propuesto por Juan Félix Basile en 1985 y llamado “*baremo de incapacidades laborales, baremo de incapacidades indemnizables y normativa para determinar porcentaje de incapacidad*”.

A efectos de una apropiada ponderación, este Manual acogió la “*Fórmula de Balthazar*” o “*Fórmula de combinación de valores*”, la cual aparece en la Primera Parte: **Valoración de las deficiencias**. Se utiliza para determinar la **deficiencia global** en aquellas personas valoradas que presentan más de un daño en varios órganos o sistemas. Para su aplicación se tienen en cuenta todas las secuelas de la **deficiencia** y los porcentajes de calificación de ésta.

Una primera **deficiencia** repercute sobre las capacidades funcionales de una persona y da lugar a una “capacidad residual específica”; en la medida en que aparezcan nuevas deficiencias, éstas afectarán progresivamente esa capacidad residual en un porcentaje adicional. Si se suman estos porcentajes, podría

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

llegar el momento en que se supere el cien por ciento (100%) de pérdida, lo cual no tendría sentido lógico. Para solucionar este inconveniente en el Manual se aplica la fórmula de Balthazard.

En los capítulos de **deficiencia** se implementan herramientas de ponderación mediante sumas aritméticas y valor mayor, las cuales se especifican en detalle en cada capítulo.

En los siniestros laborales o eventos comunes en los cuales el individuo logre la MMM y según criterio del medico tratante no se determine secuelas no será necesario determinar PCL toda vez que la ausencia de equivaler a PCL de 0%.

4. Aplicación de pruebas y valoración médica-laboral:

Para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional respecto al Título I de las Deficiencias, los médicos calificadores deberán disponer de los antecedentes técnico-médicos objetivos sobre las patologías en estudio y citar a la persona para evaluarla de manera presencial o telemedicina en concordancia con la Resolución 2654 de 2019 o la norma que adicione, modifique o sustituya, dejando constancia del tipo de examen físico realizado.

Dentro de las actividades de la TELEMEDICINA se encuentra la TELEXPERTICIA de conformidad con el artículo 17 de la Resolución 2654 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social se considera la Tele experticia como la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes, utilizando tecnologías de información y comunicación entre: Dos profesionales de la salud:

- Uno de los cuales atiende presencialmente al usuario
- y otro que atiende a distancia.

El profesional que atiende presencialmente al usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones y recomendaciones entregadas al paciente y el que atiende a distancia es responsable de la calidad de la opinión que entrega y debe especificar las condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe consignarse en la historia clínica.

Indiscutiblemente la autonomía médica cumple un papel relevante en las acciones de telemedicina a implementar.

Respecto al Título II: Valoración del rol laboral, rol ocupacional y limitación en otras áreas ocupacionales, los profesionales calificadores competentes del área de la salud, deben evaluar presencialmente el funcionamiento, habilidad ocupacional y desempeño laboral acorde con los instrumentos disponibles en la literatura científica.

Los profesionales calificadores en el marco de su competencia conocimiento técnico y científico deberán contar con título de postgrado en seguridad y salud en el trabajo o una de sus áreas, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, y tener al menos una de las siguientes condiciones: certificado de conocimientos académicos de mínimo 160 horas en determinación de origen y pérdida de capacidad laboral u ocupacional, o dos (2) años de experiencia específica en dichos campos.

No podrá calificarse de manera subjetiva sin pruebas de cuantificación, realizadas durante el proceso de atención y rehabilitación integral, la cual está incluida en el sistema de seguridad social, dejando constancia de estas valoraciones.

Todos los anteriores calificadores, Inter consultores y los médicos especialistas o tratantes; en caso de ser un profesional con formación en el área de la salud en el extranjero debe validar el título, tener su tarjeta profesional vigente ante el Colegio Médico Colombiano, estar registrados en el RETHUS (Registro Nacional de Talento Humano en Salud), y tener licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

ocupacional) que le permita generar los conceptos médicos ocupacionales solicitados y además de valorar la pérdida de capacidad laboral, ocupacional o invalidez.

Si se desea un concepto en otra especialidad o un peritaje para evaluar el estado clínico y dar un diagnóstico definitivo de la patología que presente, éste se consignará en la historia clínica y el médico a cargo tendrá en cuenta dicho concepto.

Los antecedentes e interconsultas que se requieran de acuerdo con los criterios o pruebas propias de cada capítulo deben ser proporcionados por las EPS, medicina prepagada y planes complementarios, y Administradora de Riesgos Laborales al que se encuentre afiliado el paciente o en caso de no ser un afiliado activo, es la última entidad donde estuvo afiliado según corresponda al origen, la responsable de expedir estas pruebas, para efecto de cumplir con este requisito, los calificadores deben requerir a los interconsultores el concepto técnico-médico correspondiente, cumpliendo los siguientes parámetros:

- El médico tratante o interconsultor que realiza un peritaje de su especialidad (reconocimiento y determinación del diagnóstico y estado clínico de determinada patología que presenta un afiliado), debe considerar que su informe será utilizado por el calificador para determinar la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional que presenta el individuo. Por lo tanto el dictamen final tendrá en cuenta todos los exámenes clínicos y paraclínicos que se hayan realizado.
- Debe considerar que el peritaje se solicita con el objeto de que el profesional consultor determine exclusivamente y en la forma más precisa posible, la magnitud y el compromiso de la patología presentada por el paciente. Debe evitar consignar juicios o conceptos personales sobre el grado de invalidez del individuo estudiado, pues tal apreciación es materia que sólo corresponde a quien legalmente puede determinarla.
- El médico interconsultor debe pronunciarse exclusivamente sobre el diagnóstico del afiliado, utilizando un lenguaje similar al del Manual.
- Ante la presencia de situaciones de difícil evaluación, se debe informar al calificador sobre los exámenes o pruebas de ayuda de diagnóstico adicionales que se deben realizar para poder emitir un informe exacto.
- El médico calificador evalúa la pertinencia, la utilidad y la veracidad de las pruebas aportadas para en el proceso de calificación de PCL, y en caso de dudas en cuanto a la veracidad de las mismas la justicia ordinaria decidirá sobre la validez de la prueba y las sanciones que incurre la falsedad de documento si fuera el caso.
- Debe haber consistencia entre la anamnesis relatada por la persona objeto de la calificación, los exámenes legalmente aportados y las conclusiones del médico interconsultor. Cualquier incoherencia debe ser objeto de revisión y aclaración, e informar al calificador y a la autoridad competente.
- El médico interconsultor deberá pronunciarse exclusivamente en materia de su especialidad, sobre los puntos solicitados por el Calificador, entre los cuales pueden contenerse por lo menos los siguientes: fecha de atención, diagnóstico, tratamientos recibidos o sugeridos, concepto y pronóstico

5. Definiciones relativas a la aplicación.

Con el objeto de valorar de forma apropiada, objetiva, equitativa y precisa las *deficiencias*, el Manual acogerá las siguientes definiciones que se aplican en el proceso de calificación.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

5.1 Carga de adherencia al tratamiento ‘CAT’: Índice que informa sobre el impacto que tienen la medicación, la dieta y los tratamientos indicados, así como los efectos secundarios, sobre las actividades de la vida diaria y que, por lo tanto, generan un grado de deficiencia. La CAT incluye:

- a. Los procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno o patología, según la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos.
- b. Las modificaciones en la dieta.
- c. Los monitoreos biológicos necesarios para hacer el seguimiento.
- d. La historia de radioterapia y quimioterapia.

5.2 Examen físico: Evaluación metódica de una persona mediante la observación, inspección, palpación, auscultación, percusión y medida de los signos vitales relacionados con las deficiencias a calificar. La valoración debe partir de un diagnóstico médica establecido.

5.3 Factores moduladores: Son los criterios que pueden modificar el porcentaje del grado de severidad de una deficiencia dentro de una clase funcional predeterminada por el factor principal. Este factor modifica la severidad de la deficiencia dentro de la clase funcional. Para lo anterior se deben tener en cuenta **el o todos** los factor(es) modulador(es) dados en las tablas respectivas.

5.4 Factor principal: Es el criterio utilizado en la calificación de las deficiencias y que determina la clase funcional en cada tabla de calificación; por lo tanto, es el criterio de mayor importancia y objetividad. El criterio a utilizar para este factor se encuentra previamente definido en cada una de las tablas de los distintos capítulos, salvo algunas excepciones y **en ningún caso podrá ser reemplazado por factores moduladores.**

5.5 Mejoría Médica Máxima ‘MMM’: Punto en el cual la condición patológica se estabiliza sustancialmente y es poco probable que cambie en el año próximo, ya sea para mejorar o empeorar, con o sin tratamiento. Son sinónimos de este término: pérdida comprobable, pérdida fija y estable, cura máxima, grado máximo de mejoría médica, máximo grado de salud, curación máxima, máxima rehabilitación médica, estabilidad médica máxima, estabilidad médica, resultados médicos finales, médica estable, médica estacionario, permanente y estacionario, no se puede ofrecer más tratamiento o se da por terminado el tratamiento. Incluye los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación integral que se encuentren disponibles para las personas y que sean pertinentes según la condición de salud..

5.6 Historial clínico: Describe los antecedentes, la evolución y el estado actual de la patología que se está calificando; incluye los antecedentes pertinentes y los resultados de los diagnósticos referentes a la Mejoría Médica Máxima (MMM), la Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT) y los diferentes tratamientos de la(s) deficiencia(s). Puede ser factor principal o modulador, lo cual se define en cada tabla de calificación.

5.7 Pruebas objetivas: Resultados objetivos, como los estudios clínicos o paraclínicos. Pueden constituirse en factor principal o modulador, como se define en cada tabla.

NOTA: Los laboratorios clínicos, estos **no deben** ser mayores de tres meses al momento de la calificación. Las demás valoraciones o pruebas objetivas no deben ser mayores a seis meses dentro del último año al momento de la valoración médica laboral, si a criterio del calificador se validan pruebas con mayor antigüedad deberá dejar constancia con fundamentos de hecho en el dictamen.

6. Metodología para la calificación de las deficiencias (Título Primero)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para efectos de este Manual, se han unificado los factores, los criterios y la estructura de las tablas de calificación bajo los parámetros generales que se detallarán a continuación.

La estructura de la tabla contiene tres elementos:

- a. Clase de **deficiencia**: La tabla de calificación más amplia contiene cinco (5) clases (columnas), según lo aplicable en cada capítulo; se numeran de 0 a 4. No obstante hay algunas tablas con sólo tres (3) clases o un factor único.
- b. Porcentaje de **deficiencia**: Los valores porcentuales asignados para cada clase de deficiencia van de 0 a 100%.
- c. Criterios de **deficiencia**:
 - i. Historial clínico
 - ii. Examen físico.
 - iii. Estudios clínicos o resultados de prueba(s) objetiva(s).
 - iv. Antecedentes funcionales o evaluación.

En las tablas, que tiene uno o más factores moduladores, si todos los factores principal y modulador (es) pertenecen a la última clase funcional o a la clase más alta de la tabla, se debe asignar el valor de la **deficiencia** correspondiente al último literal, “c” o “e” según sea el caso, que es el de mayor valor de la clase. Se deberán tener en cuenta las excepciones que señalen en la parte inferior de las tablas.

El modelo genérico de las tablas con las cuales se clasifican las **deficiencias** se observa en la Tabla 2:

Tabla 2. Modelo genérico para las tablas de calificación de las **deficiencias**

Clase Funcional	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Valoración de la deficiencia (%)	0	Minima %	Moderada %	Severa %	Muy severa %
Grado de severidad (%)		(A B C D E)	(A B C D E)	(A B C D E)	(A B C D E)
Historial clínico ^a	Sin síntomas en la actualidad y/o con síntomas intermitentes que no requieren tratamiento.	Síntomas controlados con tratamiento continuo o síntomas intermitentes leves pese a tratamiento continuo.	Síntomas constantes leves pese a tratamiento continuo o síntomas intermitentes moderados pese a tratamiento continuo	Síntomas constantes moderados pese a tratamiento continuo o síntomas intermitentes severos pese a tratamiento continuo	Síntomas constantes severos pese a tratamiento continuo o síntomas intermitentes muy severos pese a tratamiento continuo
Examen físico o hallazgos físicos ^b	Sin signos de enfermedad en la actualidad	Sin hallazgos físicos con tratamiento continuo o hallazgos físicos leves que ocurren de forma intermitente	Hallazgos físicos leves de forma constante pese a tratamiento continuo o hallazgos físicos moderados que ocurren de forma intermitente	Hallazgos físicos moderados que ocurren de forma constante pese a tratamiento continuo o hallazgos físicos severos que ocurren de forma intermitente	Hallazgos físicos severos que ocurren de forma constante pese a tratamiento continuo o hallazgos físicos muy severos que ocurren de forma intermitente
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas ^c	Normales en la actualidad	Consistentemente normales con tratamiento continuo o anormalidades leves e intermitentes	Anormalidades leves persistentes pese a tratamiento continuo o anormalidades moderadas intermitentes	Anormalidades moderadas persistentes pese a tratamiento continuo o anormalidades severas intermitentes	Anormalidades severas persistentes pese a tratamiento continuo o anormalidades muy severas intermitentes

^a^b Los descriptores leve, moderado, severo y muy severo serán específicos para la enfermedad.

^c Los descriptores serán los específicos de la enfermedad y se basarán en el número de anormalidades encontradas.

En otros capítulos, como el de calificación de las **deficiencias** por alteración del sistema digestivo, la tabla genérica citada también podrá adicionarse con la siguiente variable:

Carga de Adherencia al Tratamiento CAT-	Ninguno	Se basará en factores tales como el número y la vía de administración del medicamento o la necesidad de someterse regularmente a pruebas diagnósticas o procedimientos invasivos si no han sido considerados en valoraciones preliminares.
--	---------	--

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para efectos de la calificación de los signos y síntomas, en los capítulos del Título Primero - Valoración de las **Deficiencias**, se tendrán en cuenta las Tablas 3 y 4 así:

Tabla 3. Clasificación según presentación de los síntomas y signos según su frecuencia en el tiempo.

Clasificación	Porcentaje de presentación de signos y síntomas / día*
Nunca u ocasionalmente	Hasta 33% del tiempo
Frecuente	Entre 34% y 66% del tiempo
Continuo	67% o más del tiempo

* Estimación sobre las 24 horas del día, teniendo presente que el nivel de exactitud es imposible de lograr clínicamente.

Tabla 4. Clasificación según porcentaje de compromiso funcional o anatómico.

Clasificación	Porcentaje anatómico o funcional comprometido
Mínimamente anormal	Anormalidad anatómica o funcional no mayor de 10%, generalmente asintomática.
Alteración leve	Compromiso entre 11% y 25%.
Alteración moderada	Compromiso entre 26% y 50%.
Alteración severa	Compromiso entre 51% y 75%.
Alteración muy severa	Mayor del 75%.
Tener presente que el nivel de exactitud es imposible de lograr.	

7. Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia

Se realizará cuando la persona objeto de la calificación alcance la Mejoría Médica Máxima (MMM) o cuando termine el proceso de rehabilitación integral y en todo caso antes de superar los quinientos cuarenta (540) días de haber ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad para aquellas personas que tienen incapacidad temporal. Para los afiliados que no tienen incapacidad temporal, la MMM (beneficiarios, otros afiliados del régimen contributivo y régimen subsidiado) se aplica a partir de la fecha de iniciado el tratamiento integral o a partir del diagnóstico definitivo dado por el médico especialista tratante.

Para el caso de las personas que ya cuentan con una IPP (incapacidad permanente parcial) la nueva calificación se hará después de un año calendario a partir de la fecha del último dictamen médico pericial en firme o ejecutoriado en el marco de los establecido en el artículo 2.2.5.1.53 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 o la norma que modifique adicione o sustituya .

El establecimiento del grado en las *deficiencias* solo se puede dar una vez se reúnan tanto los factores principales, como todos los modulares, sin excepción, según criterios dados por cada tabla. Para esto se tendrá en cuenta el siguiente método:

- El primer paso será identificar, de acuerdo con el diagnóstico medicamente establecido, o la patología, o secuela, la(s) deficiencia(s) que se van a calificar y, por lo tanto, el o los capítulos respectivos. Posteriormente se selecciona la tabla apropiada y en ella, el criterio que se determinó como *factor principal*, el cual define la clase (de 0 a 4).
- Para determinar la clase del *factor principal* se deberá asignar un valor predeterminado que será siempre el grado medio de cada clase o el valor único (valor entero). Si la clase tiene cinco grados (A B C D E) será “C”; si tiene tres grados (A B C) será “B” (Tabla 5).
- En la Tabla 5 se identifican los *factores moduladores*, esto es, todos aquellos que no son *factor principal*, los cuales se deben calificar asignándoles un rango de deficiencia global porcentual a cada uno. Pueden existir hasta dos (2) *factores moduladores* que, para efectos de la fórmula de ajuste total, se denominarán FM₁ y FM₂.

Tabla 5. Ejemplo del encabezado de las tablas para la calificación de las deficiencias

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Rango de deficiencia global	0%	1 al 5%	6 al 10%	11 al 15%	16 al 20%
Grado de severidad (%)		1 2 3 4 5 A B C D E ↑ predeterminado clase 1	6 7 8 9 10 A B C D E ↑ predeterminado clase 2	11 12 13 14 15 A B C D E ↑ predeterminado clase 3	16 17 18 19 20 A B C D E ↑ predeterminado clase 4

Los factores moduladores son los responsables de cambiar el grado en el rango de la clase predeterminada por el *factor principal*, haciendo que ésta se desplace hacia un grado mayor (a la derecha del valor predeterminado, es decir mayor valor), o hacia un grado menor (a la izquierda del valor predeterminado, es decir menor valor). En caso de no existir valor modulador, se tomará el valor asignado en la clase de riesgo seleccionado.

La manera de darle operatividad a este método es mediante la fórmula de *Ajuste total de deficiencia* que se explica a continuación:

$$\text{Ajuste total de deficiencia} = (\text{CFM}_1 - \text{CPF}) + (\text{CFM}_2 - \text{CPF})$$

Donde,

CPF: clase asignada por el *factor principal*.

CFM₁: clase asignada por el primer *factor modulador*.

CFM₂: clase asignada por el segundo *factor modulador*.

$$\begin{aligned}
 \text{Ajuste total de deficiencia} &= (\text{CFM}_1 - \text{CPF}) + (\text{CFM}_2 - \text{CPF}) \\
 &= (2 - 3) + (3 - 3) \\
 &= (-1) + (0) \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

El resultado obtenido en la fórmula es el ajuste total de la **deficiencia**, de manera que los valores que se pueden obtener son: -2 ó -1 ó 0, 1 ó 2, que significan los lugares a derecha o izquierda en que se desplaza el grado predeterminado, como se muestra a continuación:

Grado	A	B	C	D	E
Grado de ajuste desde “C”	-2	-1	0	1	2

Entonces, si a “C” se le asigna un valor de trece por ciento (13%), y el ajuste final es -1, el literal correspondiente al porcentaje de deficiencia es “B”, que equivale a doce por ciento (12%):

Clase 3				
11 a 15%				
11	12	13	14	15
A	B	C	D	E
↑ Predeterminado clase 3				

La fórmula de “Ajuste total de deficiencia”, se aplica con el número real de factores moduladores existentes en la tabla que se está utilizando, es decir, si tiene dos factores moduladores, tomará solamente CFM₁ y CFM₂. Si tiene sólo un factor modulador, se tendrá en cuenta CFM₁; para estos casos no se considera el CFM₂, es decir, se elimina de la fórmula el otro factor modulador.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Cuando el factor principal corresponde a la clase cero (0) no se tendrán en cuenta los factores moduladores y el valor de **deficiencia** es cero (0). Si los resultados de la fórmula son valores positivos o negativos que superan el número de lugares a desplazar hacia la derecha o la izquierda, se dejará el máximo valor (derecha) o el mínimo (izquierda) dentro de la misma clase. No obstante lo anterior, se deben aplicar las instrucciones dadas en la parte inferior de la tabla.

Si se presenta más de una **deficiencia**, se aplica la fórmula de combinación de valores de Balthazard que a continuación se describe:

$$\text{Deficiencia combinada} = A + \frac{(100 - A) \times B}{100}$$

Donde, A y B corresponden a las diferentes **deficiencias**, siendo A la de mayor valor y B la de menor valor. En caso de existir más de dos valores para combinar, se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:

- a. Ordenar todos los valores de **deficiencia** de mayor a menor.
- b. El valor más alto será A y el siguiente valor B.
- c. Calcular la combinación de valores según la fórmula.
- d. El resultado será el nuevo A que se combinará con el siguiente valor de la lista, que será el nuevo B.
- e. Estos pasos se repetirán tantas veces como valores a combinar surjan.

Cálculo del Valor Final de la Deficiencia: El *valor final de la deficiencia* será el valor obtenido por la secuela calificable de cada una de las patologías de la persona; si tiene varias secuelas calificables de diferentes capítulos, estas se combinan mediante la fórmula de valores combinados. Una vez combinadas todas, la **deficiencia** del resultado final se debe **ponderar al cincuenta por ciento (50%)**, es decir se debe multiplicar por cero coma cinco (0,5). De manera tal que si el valor final fue de ochenta por ciento (80%) se multiplica por cero coma cinco (0,5) obteniendo como resultado o *Valor Final de la Deficiencia*, cuarenta por ciento (40%).

Si solamente tiene un valor de **deficiencia**, se multiplica por cero coma cinco (0,5).

Esta sólo se aplica de acuerdo con el aparte de definiciones y principios de evaluación de cada capítulo.

8. Carga de Adherencia al Tratamiento ‘CAT’.

Esta sólo se aplica de acuerdo con el aparte de definiciones y principios de evaluación de cada capítulo. La Carga de Adherencia al Tratamiento se evalúa mediante un sistema de puntos que se convierte al porcentaje de la deficiencia. Los puntos se asignan con base en los siguientes criterios:

- a. Consumo de cada uno de los medicamentos, dependiendo de la vía de administración y la frecuencia.
- b. Modificaciones en la dieta.
- c. Frecuencia de los procedimientos realizados rutinariamente.
- d. Historia de procedimientos quirúrgicos previos o radioterapia.

El puntaje obtenido se convierte en **deficiencia** de acuerdo con la Tabla 6:

Tabla 6. Deficiencia por Carga de Adherencia al Tratamiento.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Puntos totales	Deficiencia %
0-1	0
2-5	1
6-10	2
11-15	3
16-20	4
21-25	5
26-30	6
31-35	7
36-40	8
41-45	9
46+	10

En los capítulos donde se usa la CAT, los puntos de la **deficiencia** deben sumarse aritméticamente a la **deficiencia** final de la tabla respectiva a calificar, o como se establezca en los respectivos capítulos.

Nota: El CAT se utiliza en los capítulos que explícitamente lo indiquen, no se utilizará en todos los capítulos.

8.1. Deficiencias derivadas del consumo de medicamentos.

El médico calificador debe seguir los siguientes pasos para determinar los puntos que se van a usar en el cálculo de la CAT por consumo de medicamentos:

- Evaluar la frecuencia de la dosis y la ruta o vía de administración de los medicamentos propios de cada **deficiencia** a calificar según criterio, mediante la asignación de un número de puntos y seleccionar la Tabla 7 para medicamentos orales, intranasales, oculares y tópicos; la Tabla 8 para medicamentos administrados por inhalación y vía rectal; y la Tabla 9 para las vías endovenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular e intracavitaria. En caso de haber más de un (1) medicamento por cada vía o ruta de administración, se asignarán los puntos respectivos por el medicamento de mayor frecuencia de dosificación.
- Sumar los puntajes parciales asignados por cada vía, para obtener el total de puntos por medicamentos.

Tabla 7. Puntaje para medicamentos administrados por las vías oral, intranasal, ocular y tópica (diligenciar por medicamento)

Frecuencia de la dosis	Puntos
< 1 por día	0
1 a 2 por día	0.5
3 a 4 por día	1.0
5 a 6 por día	2.0
> 6 por día	3.0

Tabla 8. Puntaje para medicamentos administrados por inhalación o vía rectal (diligenciar por medicamento)

Frecuencia de la dosis	Puntos – inhalados	Puntos – rectal
< 1 por día	0	1.0

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Frecuencia de la dosis	Puntos – inhalados	Puntos – rectal
1 por día	1.0	2.0
2 por día	2.0	4.0
3 por día	3.0	6.0
4 por día	4.0	8.0

Tabla 9. Puntos para medicación endovenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular e intracavitaria (diligenciar por medicamento)

Ruta de administración	Puntos
SC, IM, ID: 1 a 3 veces por semana	1.0
SC, IM, ID: 4 a 7 veces por semana	2.0
SC, IM, ID: 2 veces por día	3.0
SC, IM, ID: 3 veces por día	4.0
SC, IM, ID: 4 veces por día	5.0
SC, IM, ID: 5 veces por día	6.0
Depósito intracavitario	Según frecuencia de llenado del depósito*
Endovenosa	1 punto por tratamiento por día arriba de 25 puntos/mes

*Nota:

Llenado una vez al mes o más frecuente: 4 puntos.

Llenado cada 2 a 4 meses: 2 puntos.

Llenado menos frecuente, es decir más de 4 meses: 1 punto.

8.2. Deficiencias derivadas de la modificación de la dieta.

Muchas condiciones de salud requieren modificaciones dietarias permanentes. El grado de necesidad varía con cada persona, lo mismo que el grado de cumplimiento de las restricciones. Los puntos de CAT por modificación de la dieta se otorgan cuando la persona sigue las indicaciones, pues se asume la premisa de que el cumplimiento de una dieta restringe las actividades de la vida diaria de maneras distintas a otros aspectos evaluados en la historia clínica y por el uso de medicamentos (Tabla 10).

Tabla 10. Puntos de deficiencia por modificación de la dieta

Modificación	Puntos
Grado I: Nutrición vía oral con modificaciones de alimentos sólidos o blandos a líquidos en forma permanente; o modificaciones en la composición de la dieta atendiendo a una enfermedad específica (Ej. Diabetes, enfermedad renal, hepática o hipertensiva entre otros)	2
Grado II: Nutrición enteral a través de sondas naso entéricas, catéteres de ostomías en forma permanente.	5
Grado III: Nutrición parenteral permanente	10

8.3. Deficiencias derivadas de los procedimientos.

No todos los procedimientos para el tratamiento de una condición de salud se realizan en forma rutinaria en todas las personas, por lo tanto, la **deficiencia** varía de acuerdo con las necesidades de cada individuo particular. El esquema para la asignación de porcentajes de **deficiencia** según el procedimiento instaurado, está consignado en la Tabla 11. En ella se incluyen procedimientos tales como la laparotomía y la radioterapia. Las **deficiencias** derivadas de procedimientos tales como diálisis peritoneal, hemodiálisis y ostomías se califican con los criterios definidos en los capítulos de órganos y sistemas respectivos.

Tabla 11. Puntos de deficiencia por procedimientos instaurados

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Procedimiento	Puntos
Monitoreo de glucosa: 1 vez por día	1.0
Monitoreo de glucosa: 2 veces por día	2.0
Monitoreo de glucosa: 3 veces por día	3.0
Monitoreo de glucosa: ≥ 4 veces por día	4.0
Hemoféresis	4.0 por episodio por mes
Transfusión (mensual)	2.0 por unidad por mes

9. Metodología de calificación del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales (Título Segundo).

Para la calificación de la segunda parte se identifican las dos poblaciones sujeto de calificación, de acuerdo con la etapa del ciclo vital y rol desempeñado, que son:

Tabla 12. Grupos poblacionales y roles ocupacionales

Grupo poblacional	Role
Personas en edad económicamente activa (conformada por las personas en edad de trabajar, que tienen un trabajo cotidiano habitual o están buscando empleo), incluye menores trabajadores, jubilados o pensionados y adultos mayores que desempeñan un rol laboral.	Laboral
Bebes, niños, adolescentes, jubilados y pensionados o personas en edad de trabajar que no tienen, ni han tenido antecedentes de trabajo habitual, adultos y adultos mayores que no trabajan	Ocupacional: de juego, estudio (vida escolar) y uso del tiempo libre o de esparcimiento respectivamente

Tabla 13. Criterios para calificar a las personas en edad económicamente activa por el Título Segundo

Criterio	Número de categorías	Tabla	Valor Máximo
Rol laboral	Seis	Tabla No. 1: Clasificación de las restricciones en el rol laboral	25%
Autosuficiencia económica	Cinco	Tabla No. 2: Clasificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica	2.5%
Edad	Seis	Tabla No. 3: Clasificación de las restricciones en función de edad cronológica	2.5%

Para la calificación de los tres criterios anteriores se evalúa el estado de la persona versus la descripción de cada categoría eligiendo la más apropiada.

Se elige **sólo una categoría** por cada criterio asignándole el valor correspondiente.

Criterio	Número de categorías	Tabla	Valor Máximo
Otras áreas ocupacionales	Cinco (0,1,2,3,4)	Tablas 6, 7, 8, 9 y 10	20%

Para calificar este criterio, se usan los valores según la clase dada en la Tabla No. 4. Escala de calificación de otras áreas de ocupacionales y los valores obtenidos en cada tabla se suman aritméticamente.

Por último, para obtener el porcentaje final de la valoración del rol laboral, se suman aritméticamente los valores obtenidos por rol laboral, autosuficiencia económica, de la edad y de las otras áreas ocupacionales. El valor final no puede ser mayor al 50%. Es de aclarar que este valor no se pondera.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

$$\text{Valor Final del Título segundo} = (\text{Rol Laboral} + \text{Autosuficiencia Económica} + \text{Edad} + \text{Otras Áreas Ocupacionales})$$

El valor de la pérdida de capacidad laboral será: **valor final de la deficiencia ponderada + valor final del Título segundo:**

$$\text{Pérdida de Capacidad Laboral} = \text{Valor Final del Primer Título} + \text{Valor Final del Título Segundo (ponderado al 50%)}$$

9.1. Criterios para calificar a los bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

9.1.1. Cálculo del Valor Final del Título segundo : Calificación del rol ocupacional de bebés, niños, niñas (de 0 a 3 años): la calificación del Título Segundo de este grupo, se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 14. Calificación del rol ocupacional de bebés, niños, niñas (de 0 a 3 años)

Grupos a calificar	Calificar el rol ocupacional	Categorías	valor máximo
Niños y niñas de 0 a 3 años	Tabla N° 11: Escala de calificación	Severidad A,B,C	50%.
	Tabla N° 12: Valoración para niños y niñas de 0 a 3 años (Actividad motriz y Adaptativa)	25 criterios Calificados en A(0), B(1), C(2).	

El valor de la pérdida de capacidad ocupacional de bebés, niños, niñas (de 0 a 3 años) será: valor final de la deficiencia ponderada + valor final del Título segundo::

$$\text{Pérdida de Capacidad Ocupacional bebés, niños, niñas (de 0 a 3 años)} = \text{Valor Final del Título Primero (ponderado al 50\%)} + \text{Valor Final del Título Segundo bebés, niños, niñas (de 0 a 3 años)}$$

9.1.2. Cálculo del Valor Final del Título Segundo: Calificación del rol ocupacional niños, niñas (mayores de 3 años) y adolescentes: la calificación del Título Segundo de este grupo se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 15. Calificación del rol ocupacional niños, niñas (mayores de 3 años) y adolescentes

Grupos a calificar	Calificar el rol ocupacional	Categorías	Valor máximo
Niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes	Tabla No. 13: Valoración de los roles ocupacionales de juego-estudio para niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes	Cinco (A,B,C,D,E)	30%
	Limitaciones de otras áreas ocupacionales Tablas 6, 7, 8, 9 y 10*	Cinco (0,1,2,3,4)*	20%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

*Para calificar este criterio, se usan los valores según la clase dada en la Tabla N° 4. Escala de calificación de otras áreas de ocupacionales y los valores obtenidos en cada tabla se suman aritméticamente.

Nota: Aplicable para las personas adolescentes (menores trabajadores) que no han tenido o tienen un empleo o un trabajo habitual.

El Valor Final del Título Segundo: Valoración de los roles ocupacionales de juego-estudio más limitaciones de otras áreas ocupacionales.

El valor de la pérdida de capacidad ocupacional para niños, niñas (mayores de 3 años) y adolescentes será: valor final de la deficiencia + valor final del Título Segundo

$$\begin{array}{l} \text{Pérdida de Capacidad} \\ \text{Ocupacional (mayores} \\ \text{de 3 años y} \\ \text{adolescentes de 17 a} \\ \text{20 años según la} \\ \text{OMS)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Valor Final} \\ \text{del Título} \\ \text{Primero} \\ \text{(ponderado} \\ \text{al 50\%)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Valor Final del} \\ \text{Título Segundo} \\ \text{bebés, niños, niñas} \\ \text{(mayores de 3} \\ \text{años)} \end{array}$$

9.1.3. Cálculo del Valor Final de la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales: Calificación del rol ocupacional de adultos y adultos mayores: la calificación del Título Segundo de este grupo se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 16. Calificación del rol ocupacional de adultos y adultos mayores

Grupos a calificar	Calificar el rol ocupacional	Categorías	Valor máximo
Adultos y adultos mayores	Tabla No. 14: Valoración del rol ocupacional de tiempo libre-espaciamiento para adultos mayores	Cinco (A,B,C,D,E)	30%
	Limitaciones en otras áreas ocupacionales Tablas 6, 7, 8, 9 y 10*	Cinco (0,1,2,3,4)*	20%

Nota: Aplicable para las personas adultas o adultas mayores que no han tenido o tienen un empleo o un trabajo.

El Valor Final del Título Segundo: Valoración del rol ocupacional de tiempo libre-espaciamiento más limitaciones de otras áreas ocupacionales


El cálculo del valor de la pérdida de capacidad ocupacional para adultos y adultos mayores será: valor final de la deficiencia + valor final del Título Segundo:

$$\begin{array}{l} \text{Pérdida de} \\ \text{Capacidad} \\ \text{Ocupacional} \\ \text{adultos mayores} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Valor Final} \\ \text{de la} \\ \text{Deficiencia} \\ \text{(ponderado} \\ \text{al 50\%)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Valor Final del} \\ \text{Título Segundo} \\ \text{adultos y} \\ \text{adultos} \\ \text{mayores} \end{array}$$

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

En la siguiente figura se presenta la esquematización de la ruta a través de la cual se deben aplicar el Título Primero y el Título Segundo del Manual, de acuerdo con la etapa del ciclo vital en el cual se encuentra la persona calificada:

Figura 2. Ruta general para la aplicación del Manual



Fuente: Alonso, C; Rodríguez, F; Suárez, H (Junio de 2011, Ajustado, Agosto 2018)

Para todos los efectos de aplicación de este Anexo Técnico “Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”, se debe considerar que el conjunto de todo el proceso para definir la calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de un individuo o persona, sujeto a los términos de calificación de primera oportunidad.

En aquellos casos donde la enfermedad es de naturaleza genética, presente y manifiesta desde el nacimiento, o degenerativa y crónica en el tiempo mayor a 540 días de evolución desde su diagnóstico, contarán los términos de calificación de primera oportunidad, para dar un dictamen definitivo a partir de la radicación de la solicitud para calificar la Invalidez, so pena de incurrir en *falta grave disciplinaria* el o los funcionarios responsables de dicha calificación, directa o indirectamente y sin perjuicio de las sanciones de otro tipo en que incurra, el o los funcionarios responsables de dicha falta.

Para efectos de aplicación de este Anexo Técnico “Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”, cuando no exista deficiencia, o su valor sea cero por ciento (0%), no se considerarán los valores por el rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Esta regla aplica para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Por lo tanto, la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional se reportará con un valor de cero por ciento (0%).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

TÍTULO PRIMERO

VALORACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS

Capítulo I Deficiencias por Alteraciones debidas a Neoplasias o Cáncer

1.1 Objetivo. Proveer los criterios para la evaluación de la deficiencia anatómica y funcional permanente por las enfermedades neoplásicas o cáncer en cualquier parte del cuerpo.

1.2 Alcance. Este capítulo incluye los criterios para el reconocimiento y evaluación de la deficiencia permanente de las neoplasias de todos los órganos y sistemas.

1.3 Definiciones y Principios de Evaluación.

Criterios Generales: Este capítulo del Manual contempla entre otros los siguientes:

- a. **Valoración en tratamiento:** Valorar cuándo se alcanza la Mejoría Médica Máxima (MMM), o se termina el proceso de rehabilitación integral; en todo caso, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. (ver numeral 4 del título preliminar).
- b. **Secuelas de tratamiento:** La calificación de las secuelas derivadas de la quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirugía y otras terapéuticas, se realiza en el capítulo correspondiente a la deficiencia y luego se realizará combinación de valores con la deficiencia derivada de la enfermedad neoplásica.
- c. **Secuelas propias de la neoplasia:** Se valorarán en los respectivos capítulos según el tipo de deficiencia, generadas por cirugías preventivas, curativas o paliativas.
- d. **Rechazo del tratamiento:** Cuando una persona con cáncer rechaza cualquier tipo de tratamiento, se debe informar al paciente del riesgo de su decisión, se debe calificar el estado actual y hacer revisiones de acuerdo con la evolución de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional.
- e. **Periodicidad de la revisión de casos:** El tiempo mínimo requerido para revisar la calificación de una persona luego de realizados los tratamientos será de doce (12) meses; en pacientes terminales, se podrá revisar antes de dicho término, de acuerdo con el concepto del especialista oncólogo, según el pronóstico de la patología.

En caso de patologías adicionales no contempladas en la calificación en firme, debe realizarse nuevamente la calificación con la documentación correspondiente, iniciando el proceso en primera oportunidad, la cual podrá realizarse antes de los doce (12) meses.

- f. **Trasplante de médula ósea:** Se valorará luego de doce (12) meses de realizado y las secuelas sobre los órganos o sistemas afectados se valorarán en los capítulos correspondientes.
- g. **Escala de Clasificación - TNM** Se actualiza al momento de calificar por parte del médico oncólogo tratante de cualquier especialidad.

1.4 Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño

Se utilizan las siguientes variables para la evaluación de la deficiencia derivada de la neoplasia o cáncer:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Criterio 1. Historial clínico (factor modulador): Incluye los datos clínicos específicos para la valoración, recolectando el curso clínico individual desde el diagnóstico, la evolución y tratamiento relevantes, como indicadores de la cronicidad y severidad de cada una de las clases de daño. Este criterio describe los síntomas y su correlación con el tratamiento.

- Síntomas de enfermedad:** se refiere a la información obtenida durante el interrogatorio a la persona evaluada sobre sus síntomas, en términos de severidad, duración y progreso, y los hallazgos clínicos que se evidencian durante el examen físico.
- Tratamiento:** se refiere a la valoración de las posibilidades de tratamiento y respuesta al mismo, es decir: si es inoperable, o no fue controlado por el tratamiento efectuado, o el tumor fue extirpado en forma incompleta, entre otros.

Criterio 2. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (factor principal). Los criterios usados son la clasificación por extensión TNM. Estos estadios son definidos por el oncólogo con base en el TNM propio de cada neoplasia o para los casos en que el cáncer no tenga un sistema de calificación definido, se tomará el que reporte el médico oncólogo tratante. En la primera se evalúan las neoplasias según la profundidad de la invasión del cáncer, el compromiso de los ganglios linfáticos y las metástasis a distancia, para lo cual el evaluador deberá establecer el estadio de la patología de la persona con base en el concepto enviado por el oncólogo:

- T: Tumor primario (profundidad de la invasión del cáncer).
- N: Metástasis en ganglios linfáticos.
- M: Metástasis a distancia (enfermedad metastásica).
- Estadios del I al IV.

La clasificación por estadios corresponde a la respuesta al tratamiento (radioterapia, quimioterapia y quirúrgicos entre otros) o cuando no existen posibilidades médicas de tratamiento ante la neoplasia.

La calificación se establece con base en el estadio de la patología de la persona, para lo cual se referencia una de las clasificaciones usadas en las Tablas 1.1 y 1.2:

Tabla 1.1 Clasificación por extensión (TNM)

T: Tumor primario (profundidad de la invasión del cáncer)			
Tx	T0	Tis	T1,T2,T3,T4,
No evaluable o no calificable	Sin evidencia clínica de tumor primario	Invasión <i>in situ</i>	De acuerdo con el tamaño o extensión local del tumor primario
N: Ausencia o Presencia de Compromiso de Ganglios Linfáticos Regionales			
Nx	N0	N1,N2,N3	
No evaluable o no calificable	Sin metástasis en ganglios linfáticos	Según el compromiso regional de los nódulos linfáticos	
M: Ausencia o Presencia de Metástasis a distancia (enfermedad metastásica)			
Mx	M0	M1	
No evaluable o no calificable	Sin evidencia de metástasis a distancia	Con existencia demostrada de metástasis	

Tabla 1.2 Clasificación por estadios

Estadio	Cáncer Oculto	I	II	III	IV
Tumor primitivo	Tx	T1	T2	T3	T4
Metástasis en ganglios linfáticos	N0	N0	N1	N1	N2

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Metástasis a distancia (enfermedad metastásica)	M0	M0	M0	M0	M1
--	----	----	----	----	----

*Sólo aplica cuando existe un M1

Para determinar el estadio se deben evaluar previamente los tres criterios de extensión (T: Tumor primario, N: Metástasis en ganglios linfáticos, M: Metástasis a distancia). No obstante, la tabla anterior y debido a que la clasificación la realiza directamente el especialista y teniendo en cuenta que cada tumor tiene un diferente TNM, se acogerá la clasificación emitida por el oncólogo del caso para la calificación.

1.5. Procedimientos Generales

La metodología de calificación incluye los pasos citados en los numerales 5 y 6 del Título Preliminar, respecto al *factor principal* y los *factores moduladores*.

Consideraciones especiales de la metodología de calificación:

- a) En relación con la leucemia linfocítica y mieloide, es importante resaltar que tiene efectos sobre otros tipos de células sanguíneas y sobre otros órganos, produciendo entre otros leucocitosis, leucopenia, anemia, trombocitopenia como manifestaciones hematológicas principales; por otro lado, afecta la funcionalidad de las células afectadas por la leucemia, ya que se producen formas blásticas inmaduras que son no funcionales. Adicional a lo anterior, pueden producirse eritrocitosis y trombocitosis. Por lo anterior, se deberán diagnosticar las consecuencias hematológicas y la afectación de otros órganos, evaluar en los capítulos correspondientes y combinar los valores con la calificación correspondiente al tipo de cáncer.
- b) **Cáncer de pulmón:** Se evaluará según los criterios de este capítulo y las secuelas funcionales con la tabla pertinente del capítulo de deficiencias por patologías pulmonares, para después combinar los valores.

1.5.1. Procedimiento para calificar el cáncer:

Aplican los criterios establecidos en la Tabla 1.3:

Tabla 1.3. Evaluación de la deficiencia concerniente a las enfermedades neoplásicas.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 10%	11% al 29%	30% al 64%	65% al 85%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2 6 10 A B C	11 21 29 A B C	30 46 64 A B C	65 75 85 A B C
Historial clínico (FM)	Síntomas tratamiento y Normales en la actualidad	Después del tratamiento o la remisión espontánea presenta un período libre de enfermedad superior a dos años	Después del tratamiento o la remisión espontánea presenta un período libre de enfermedad inferior a dos años	Remisión clínica luego de recaída locoregional o a distancia (dos años)	Remisión clínica luego de recaída locoregional o a distancia (dos años)	Sin respuesta a los tratamientos instituidos o sin posibilidades médicas de tratamiento. o Recidiva posterior a cirugía radical. El tratamiento es sólo sintomático, paliativo o ambos
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas ^a	Clasificación TNM	Sin síntomas en la actualidad	Estadio I ó Tis (carcinomas "in situ")	Estadio II	Estadio III	Estadio IV: Evidencia de metástasis a distancia

^a **Factor principal.** Estos estadios son definidos por el oncólogo tratante con base en el TNM propio de cada neoplasia o para los casos en que el cáncer no tenga un sistema de calificación definido se tomara el que reporte el médico oncólogo tratante.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Capítulo II

Deficiencias por Alteraciones del Sistema Cardiovascular

2.1. Objetivo. Proveer los criterios para la evaluación de la deficiencia anatómica y funcional permanente del sistema cardiovascular, entendido éste como el sistema conformado por el corazón, sus arterias sistémicas y pulmonares, venas y vasos linfáticos.

2.2. Alcance. Este capítulo valora las siguientes patologías o grupos de patologías: enfermedad valvular del corazón, enfermedad coronaria, enfermedades congénitas del corazón, cardiomiopatías, enfermedad pericárdica, arritmias cardíacas, enfermedad cardiovascular hipertensiva, enfermedades de la aorta, enfermedad vascular periférica de extremidades superiores e inferiores y finalmente, hipertensión pulmonar.

2.3. Definiciones. Para la evaluación del sistema cardiovascular se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

- a) **Daño en otros órganos por la enfermedad cardiovascular:** Las enfermedades del sistema cardiovascular pueden ser consecuencia de una enfermedad sistémica e igualmente pueden producir por sí mismas manifestaciones en otros órganos o sistemas; por ello, las manifestaciones clínicas en otros órganos o sistemas que son consecuencia de enfermedades cardiovasculares (sistema respiratorio, endocrino o hematopoyético) se evaluarán y combinarán con la deficiencia derivada del sistema cardiovascular.
- b) **Trasplante cardiaco u otros tratamientos quirúrgicos /intervencionistas:** Si una persona evaluada ha recibido un trasplante cardiaco, su valoración se realizará luego de seis (6) meses, se debe tener en cuenta además a las personas que hayan tenido cateterismos cardíacos, colocación de stent o colocación de marcapasos, y en aquellos casos que requiera tratamientos quirúrgicos /intervencionistas las pruebas objetivas o estudios clínicos se deben actualizar en los últimos seis (6) meses al momento de la calificación, con el fin de verificar si fue exitoso o no. Se deberá valorar las secuelas y la función cardíaca residual. Las deficiencias por los efectos del tratamiento inmunosupresor se califican según los criterios del capítulo correspondiente y se combinan con los obtenidos en este capítulo. Además, se debe adicionar la calificación por Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT) de acuerdo con el numeral 6 del título preliminar.

2.4. Principios de Evaluación.

Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño: Los criterios a considerar en la evaluación de la deficiencia derivada de las enfermedades cardiovasculares son la historia clínica, los hallazgos físicos y los resultados de pruebas objetivas:

Criterio 1. Historial clínico (factor modulador): Contiene los datos clínicos específicos para la valoración; recolecta el curso clínico individual desde el diagnóstico, pasando por la evolución y los tratamientos relevantes, como indicadores de la cronicidad y severidad de cada una de las clases de daño. Este criterio describe los síntomas y su correlación con el tratamiento.

a. Síntomas de enfermedad:

Se refiere a la información obtenida durante el interrogatorio a la persona evaluada sobre sus síntomas en términos de severidad, duración y progreso, así como los hallazgos clínicos que se evidencian durante el examen físico (datos registrados en la historia clínica por el médico tratante).

b. Clasificación funcional de las enfermedades cardíacas:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Este criterio determina el grado de limitación originada en los signos y síntomas durante las actividades físicas, aplicando los criterios de la clasificación de la New York Heart Association (NYHA), que define cuatro clases de limitación:

Clasificación funcional de las enfermedades cardíacas

Clases	Criterios
I	Personas con enfermedad cardíaca pero que no presentan limitación para la actividad física; generalmente la actividad no causa fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
II	Personas con enfermedad cardíaca que presenta una pequeña limitación en la actividad física, sin síntomas en reposo y en el desarrollo de actividad física ligera; no obstante, el ejercicio físico pesado ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
III	Personas con enfermedad cardíaca que presenta una marcada limitación en la actividad física, sin síntomas en reposo; el desarrollo de la actividad física cotidiana ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.
IV	Personas con enfermedad cardíaca que presentan inabilidad para realizar cualquier actividad física por presentar síntomas al realizarla: inadecuado gasto cardíaco, congestión pulmonar, congestión cardíaca o presencia de síndrome anginoso, incluso en reposo; cualquier actividad física, por pequeña que sea, incrementa los síntomas.

Las clases a considerar van desde I, en aquellos casos con síntomas mínimos o moderados e intermitentes, hasta IV, cuando se presentan síntomas constantes y persistentes a pesar del tratamiento.

c. Tratamiento:

Se refiere al tipo de intervención médica o quirúrgica que una persona ha recibido y la respuesta frente a los **síntomas** (no toma en cuenta el trasplante).

d. Angina:

Dolor paroxístico en el tórax que a menudo irradia a brazos, especialmente al izquierdo, debido por lo general a la interferencia con el aporte de oxígeno al músculo cardíaco, y precipitado por la excitación y el esfuerzo.

e. Edema:

Acumulación anormal de líquido en los espacios intercelulares del cuerpo.

f. Edema cardíaco:

Manifestación de insuficiencia cardíaca congestiva por el aumento de la presión venosa y capilar; a menudo se asocia con retención de sodio por los riñones.

Criterio 2. Hallazgos físicos (alteración anatómica) (factor modulador): Se refiere a los signos encontrados en el examen físico; sirven como indicadores de la gravedad o severidad de una situación particular y deben ser corroborados por la historia clínica.

a. Signos de enfermedad: Se refiere a la manifestación objetiva o física de una alteración orgánica o de enfermedad. En patología, es la manifestación de una enfermedad perceptible por el observador que, una vez evaluada, será un factor de diagnóstico.

b. Auscultación y clasificación de falla cardíaca.

c. Alteración anatómica: Se refiere al daño en la estructura orgánica o su integridad anatómica, como la dilatación cardíaca o la anormalidad aórtica, entre otras.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- d. **Hipertensión arterial (HTA):** Para efectos de la evaluación del deterioro por enfermedad hipertensiva en adultos, se deberá tener en cuenta la clasificación del “Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure” (JNC 7); para adolescentes y niños se utilizó la adaptación realizada por la Food and Drug Administration (FDA) en la revista Pediatrics 2004;1142 supply 4th report 568-569; adicionalmente, se presentan para este literal las tablas de referencia denominadas: Clasificación de la HTA en adultos, niños o adolescentes y Presión arterial manual según edad, género y percentil de talla.

Clasificación de la HTA en adultos, niños y adolescentes

Grupo	Adultos			Niños y adolescentes		
Categoría	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)	Sistólica (percentil)		Diastólica (percentil)
Normal	<120	Y	<80	Debajo del 90.	Y	Debajo del 90.
Prehipertensión ¹	120-139	Ó	80-89	Entre los percentiles 90 y 95.	O	Entre los percentiles 90 y 95.
Hipertensión:				TA por encima del percentil 95.		
Hipertensión, estado 1	140-159	Ó	90-99	Entre los percentiles 95 y 99, mas 5 mmHg.	O	Entre los percentiles 95 y 99, mas 5 mmHg.
Grupo	Adultos			Niños y adolescentes		
Grupo	Adultos			Niños y adolescentes		
Grupo	Adultos			Niños y adolescentes		
Categoría	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)	Sistólica (percentil)		Diastólica (percentil)
Hipertensión, estado 2	≥160	Ó	≥100	Entre los percentiles 95 y 99, mas 5 mmHg.	O	Entre los percentiles 95 y 99, mas 5 mmHg.

¹ El valor de la tensión arterial será el consignado en la historia clínica.

Presión arterial manual según edad, género y percentil de talla

Presión Arterial	Edad (años)	Percentil 95% de talla	
		Niños	Niñas
Sistólica	3	113	110
	6	117	114
	10	123	144
	13	130	128
	16	138	132
Diastólica	3	67	68
	6	76	75
	10	83	80
	13	84	84
	16	87	86

- e. **Falla Cardíaca, también llamada falla cardíaca congestiva:** Es un síndrome que puede obedecer a diferentes etiologías y representa la incapacidad del corazón para suministrar el aporte normal de oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo y se manifiesta por un funcionamiento inadecuado al disminuir en forma progresiva el gasto cardíaco o el aumento exagerado de la presión al final del llenado ventricular.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- f. **Disnea:** Se define según escala de la clasificación del Medical Research Council (MCR), modificada por la American Thoracic Society (ATS), que se observa en la Tabla 3.1. del capítulo de Deficiencias por Alteraciones del Aparato Respiratorio.

Criterio 3. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (factor principal):

- a. **Test de ejercicio:** Cuantifica las limitaciones debidas a los síntomas, mediante la observación de la persona durante el ejercicio en la banda sin fin o la bicicleta. Los protocolos de evaluación relacionan el ejercicio con el gasto energético y la clase funcional; el gasto energético se expresa en términos de "METS".
 - b. **Severidad de la estenosis valvular:** Se propone una medición objetiva; por ejemplo, la severidad de la estenosis valvular confirmada mediante ecocardiograma Doppler o Cateterismo Cardíaco.
 - c. **Las DAS:** defecto atrioseptal y DVS: defecto ventricular septal se califican según compromiso funcional cardiaco (Valvulopatía, cardiomiopatía o hipertensión pulmonar)

Otros principios de evaluación:

Cuando se presenta más de una alteración cardíaca en cuya valoración se aplican varias tablas, se deberá realizar combinación de valores.

En trasplante, se adiciona el 10% al valor final de la deficiencia obtenida de acuerdo a la tabla aplicada.

2.5. Procedimientos Generales.

2.5.1. Metodología de calificación.

- a. Determine el tipo de enfermedad o patología según la clasificación de las tablas que aparecerán en los siguientes apartados, a fin de elegir la tabla apropiada para la calificación.
 - b. Una vez determinada la tabla, identifique el factor principal y los factores moduladores.
 - c. Siga los pasos descritos en los numerales 5° y 6° del título preliminar, a fin de determinar el valor de la deficiencia.

2.5.2. Consideraciones especiales de la metodología de calificación.

- a. El médico calificador debe tener en cuenta que, para este capítulo, el factor principal es el resultado de los estudios clínicos o pruebas objetivas, debido a que es posible medir la funcionalidad del sistema cardiovascular con estos métodos. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente.
 - b. La clasificación de la New York Heart Association (NYHA) se eligió como base para el criterio de historia de la enfermedad, debido a su simplicidad y consistencia.

2.5.3. Procedimiento para calificar la enfermedad valvular cardíaca.

Tabla 2.1. Deficiencia por enfermedad valvular cardíaca.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1					Clase 2					Clase 3					Clase 4				
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%					15% al 49%					50% al 74%					75% al 99% ^a				
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2	5	8	11	14	15	24	32	41	49	50	56	62	68	74	75	81	87	93	99
			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas, tratamiento,	Asintomático o no está en terapia continua, excepto por la profilaxis antibiótica	Cambios en la dieta y uso de medicación para mantenerse libre de falla cardiaca, síncope, dolor					Cambios en la dieta y con medicación presenta síntomas de falla cardiaca leves, o intermitentes moderados					Falla cardiaca o síntomas con medicación presenta síntomas de falla cardiaca moderados, o intermitentes severos					Falla cardiaca y/u otros síntomas durante el reposo aún con medicación. Descompensación intermitente de los síntomas de falla cardiaca				

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

			pericárdico o embolismos			
	Clasificación NYHA: Clase funcional	Sin enfermedad cardiaca resuelta	Clase funcional I	Clase funcional II	Clase funcional III	Clase funcional IV
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Signos de falla cardiaca (Según pruebas de esfuerzo o de ejercicio)	Asintomático	Examen físico normal con actividad física severa o máxima	Signos de falla cardiaca con actividad moderada	Signos de falla cardiaca con actividad leve	Signos de falla cardiaca con actividad mínima
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas(Factor principal)^b	Disfunción o dilatación ventricular por ecocardiograma o cateterismo	No hay o mínimamente anormal	Disfunción ventricular o dilatación leves.	Disfunción ventricular o dilatación moderada.	Disfunción ventricular o dilatación severa	Disfunción ventricular muy severa o dilatación muy severas.
	Evidencia de regurgitación o prolapso de válvula por ecocardiograma o cateterismo	Sin evidencias de estenosis o regurgitación o MÍNIMAMENTE ANORMAL	Estenosis regurgitación LEVE	Estenosis regurgitación MODERADA	Estenosis regurgitación SEVERA	Estenosis o regurgitación MUY SEVERA
	METS	≥ 10	≥ 7 a 9	< 7 a ≥ 5	< 5 a ≥ 2	< 2
	VO ₂ max	mayor de 20	10 a 20 inclusive	9 a 19 inclusive	8 a 5	< 5

^aSi los tres (3) factores están calificados en la clase 4, el valor a asignar es el mayor valor correspondiente a la clase 4 (literal E).

^b Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente

VO₂ max: Volumen Máximo de O₂ (mL/min/kg).

2.5.4. Procedimiento para calificar la enfermedad arterial coronaria.

Tabla 2.2. Deficiencia por enfermedad arterial coronaria.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1		Clase 2		Clase 3		Clase 4													
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%		15% al 49%		50% al 74%		75% al 99% ^a													
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2	5	8	11	14	15	24	32	41	49	50	56	62	68	74	75	81	87	93	99
Historial clínico (Factor modulador)	Angina		Sin angina con ejercicio o actividad física mayor a 6 METS*		Angina con ejercicio o actividad física de 3 a 6 METS*		Angina con ejercicio o actividad física menor a 3 METS*		Angina en reposo													
	Sin angina		Enfermedad coronaria resuelta		Clase funcional I		Clase funcional II		Clase funcional III		Clase funcional IV											
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico y signos de falla cardiaca	Asintomático	Examen físico normal con actividad física severa o máxima		Signos de falla cardiaca con actividad moderada		Signos de falla cardiaca con actividad leve		Signos de falla cardiaca con actividad mínima													
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas(Factor principal) ^b	Ecocardiograma	Normal	Disfunción ventricular o dilatación leves		Disfunción ventricular o dilatación moderada		Disfunción ventricular o dilatación severa		Disfunción ventricular o dilatación muy severa													
	Angiografía coronaria	Normal	Irregularidades luminales (menor del 25% de estenosis)		Obstrucción fija ≥ 25% al 50%		Obstrucción fija ≥ 50 y < 75%		Obstrucción fija ≥ 75%													
	METS	≥ 10	≥ 7 a 9		< 7 a ≥ 5		< 5 a ≥ 2		< 2													
	VO ₂ max	No aplica	Mayor de 20		16 a 20		10 a 15		< 10													

^a Si todos los tres (3) factores están calificados en la clase 4, el valor a asignar es de 99%.

^b Factor principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

*Clasificación según intensidad de la actividad física por METS según OMS (2017)
VO₂ max: Volumen Máximo de O₂ (mL/min/kg).

2.5.5. Procedimiento para calificar enfermedades pericárdicas.

Tabla 2.3. Deficiencia por enfermedad pericárdica.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%	50% al 74%	75% al 99% ^b
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E	
Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas medicación y	Asintomático sin medicación	Asintomático con actividad vigorosa (\geq 7 a 9 METS) con AINES o terapia diurética o intermitente, o leve dolor precordial o falla cardiaca sin terapia	Dolor precordial intermitente o falla cardiaca con AINES o terapia diurética. Síntomas con actividad moderada de < 7 a \geq 56 METS	Dolor precordial o síntomas de falla cardiaca con actividad leve (menos a < 5 a \geq 2 METS). Con AINES de largo término o terapia para la falla cardiaca	Dolor precordial o síntomas de falla cardiaca en reposo o < 2 METS aún con terapia AINES
	Clasificación NYHA: Clase funcional		Clase funcional I	Clase funcional II	Clase funcional III	Clase funcional IV
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico y signos de falla cardiaca	Examen físico normal	Signos mínimos de falla cardiaca	Signos de falla cardiaca leve	Signos de falla cardiaca moderada. Presencia de roce pericárdico	Signos de falla cardiaca severa. Presencia de roce pericárdico
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas(Factor principal) ^c	Ecocardiograma	Normal	Efusión pericárdica pequeña, evidencia de pericarditis en ECG, VSG ^a (menor de 30) mínimamente elevado, Y	Efusión leve o evidencia de pericarditis constrictiva en ecocardiografía; ECG evidencia pericarditis; VSG ^a (30 - 50) levemente elevado, Y	Efusión moderada o evidencia de pericarditis constrictiva en ecocardiografía; ECG evidencia pericarditis; VSG ^a (51 - 70) moderadamente elevado, Y	Efusión severa o evidencia de taponamiento o pericarditis constrictiva con disfunción del ventrículo izquierdo, severa en la eco; ECG evidencia de pericarditis; VSG ^a (mayor de 71) significativamente elevado, Y
	VO ₂ max	No aplica	Mayor de 20	16 a 20	10 a 15	Menor de 10
	METS	\geq 10	\geq 7 a 9	< 7 a \geq 5	< 5 a \geq 2	< 2

^a VSG: Velocidad de Sedimentación Global ECG: Electrocardiograma

^b Si los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es de 99%.

^c Factor principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente .
VO₂ max: Volumen Máximo de O₂ (mL/min/kg)

2.5.6. Procedimiento para calificar cardiopatías.

Tabla 2.4 Deficiencia por cardiopatías y miocardiopatías.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%	50% al 74%	75% al 99% ^b
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E	
Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas y falla cardiaca	Asintomático y sin medicación	Asintomático en tratamiento continuo o síntomas de falla cardiaca durante el tratamiento ocasionales y leves	Síntomas de falla leves con terapia o síntomas moderados intermitentes de falla cardiaca con tratamiento	Síntomas de falla moderados con terapia o síntomas severos de falla cardiaca intermitentes con tratamiento	Síntomas de falla cardiaca severos en reposo o descompensación de falla cardiaca intermitente con tratamiento
	Clasificación NYHA: Clase funcional		Clase funcional I	Clase funcional II	Clase funcional III	Clase funcional IV
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico y signos de falla cardiaca	Asintomático	Examen físico normal con actividad física severa o máxima o \geq 7 a 9 en METS	Signos de falla cardiaca con actividad moderada o < 7 a \geq 5 en METS	Signos de falla cardiaca con actividad leve o < 5 a \geq 2 en METS	Signos de falla cardiaca con actividad mínima o < 2 METS
Estudios clínicos o		No aplica	Uno de los siguientes:	Al menos uno de los siguientes:	Al menos uno de los siguientes:	Al menos uno de los siguientes:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

resultados de pruebas objetivas (Factor principal) ^c	Ecocardiograma	Normal. Fracción de eyeccción mayor de 65%	Función ventrículo izquierdo (VI) incapacitante mínimamente; fracción de eyeccción mayor a 50% - ≥ 65%; hipertrofia septal (menor de 1,1 cm) mínima o evidencia de enfermedad restrictiva mínima.	Función ventrículo izquierdo (VI) levemente incapacitante (fracción de eyeccción 41 -49%); hipertrofia septal leve (1,1 - 1,2 cm) o evidencia de restricción, leve disfunción diastólica en la ecocardiografía (E > A) ^a .	Función ventrículo izquierdo (VI) moderadamente incapacitante (fracción de eyeccción 30 -40%); hipertrofia septal moderada (1,3 -1,4 cm) con gradiente moderado o evidencia de restricción o disfunción diastólica moderada en la ecocardiografía (E = A) ^a .	Función ventrículo izquierdo (VI) severamente incapacitante (fracción de eyeccción menor de 30%) o hipertrofia septal moderada (mayor a 1,4 cm) con gradiente severo o evidencia de restricción o disfunción diastólica severa en la ecocardiografía (E < A) ^a .
		VO ₂ max	Normal	Mayor de 20	16 a 20	10 a 15
		METS	≥ 10	≥ 7 a 9	< 7 a ≥ 5	< 5 a ≥ 2

^a Ondas E y A del ecocardiograma

^b Si los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es de 99%.

^c Factor principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente.
VO₂ max: Volumen Máximo de O₂ (mL/min/kg)

2.5.7. Procedimiento para calificar arritmias.

Tabla 2.5 Deficiencias por arritmias

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2		Clase 3		Clase 4	
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%		50% al 74%		75% al 99% ^b	
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E				
Historial clínico (Factor modulador)	Clasificación NYHA: Clase funcional	No aplica	Clase funcional I	Clase funcional II		Clase funcional III		Clase funcional IV	
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Síntomas	Asintomático sin medicación	Asintomático o palpitaciones o ocasionales o episodio sincopal aislado o ≥ 7 a 9 en METS	Asintomática durante las actividades diarias o < 7 a ≥ 5 en METS, palpitaciones o síntope aislado, pero requiere terapia farmacológica o marcapasos.		Síntomas incluso con medicina en terapia o marcapasos con actividad mínima o < 5 a ≥ 2 en METS o síntomas severos intermitentes.		Síntomas aún con terapia en reposo o < 2 METS síntope recurrente.	
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor principal) ^c	ECG (electrocardiograma) Holter	Normal	Tiene diagnóstico, documentando de arritmia cardiaca y no requiere tratamiento	La arritmia requiere tratamiento farmacológico		La arritmia maligna se controla con marcapasos		La arritmia maligna no se controla con marcapasos y tiene AICD ^a	

^aAICD: Implante Automático de Cardio Desfibrilador.

^b Si los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es del 99%.

^c Factor principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente.

2.5.8. Procedimiento para calificar enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Tabla 2.6. Deficiencia por enfermedad cardiovascular hipertensiva.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2		Clase 3		Clase 4	
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%		50% al 74%		75% al 99% ^a	
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E			
Historial clínico (Factor modulador)	Clasificación NYHA: Clase funcional		Clase funcional I	Clase funcional II		Clase funcional III		Clase funcional IV	
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico	Examen físico normal (incluida la fundoscopia)	Examen físico normal (incluida la fundoscopia)	Prehipertensión o estado 1 con terapia con medicamentos múltiples.		Estado 1 de HTA en terapia con medicamentos múltiples.		Estado 2 de HTA aún en terapia con múltiples medicamentos.	
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor principal) ^b	Pruebas de laboratorio y daño renal.	Sin anormalidades en los análisis y pruebas de orina	Creatinina sérica anormal, Depuración de creatinina de 75 a 90 L / 24 h (52 a 62,5 ml / min)	Proteinuria y anormalidades del sedimento urinario y, daño renal evidenciado por BUN anormal y, Depuración de creatinina de 40 a 59 L / 24 h (28 a 39 ml / min)		Proteinuria y anormalidades del sedimento urinario y, daño renal evidenciado por BUN anormal y, creatinina sérica anormal, Depuración de		Proteinuria y, anormalidades del sedimento urinario y, daño renal evidenciado por BUN anormal y, creatinina sérica anormal, Depuración de	

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

				de 60 a 74 L / 24 h (40 a 51,5 ml/min)		creatinina por debajo de 40 L / 24 h (28 ml / min)
	Daño en órgano blanco: Corazón	No aplica	Evidencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo en electrocardiograma,(ECG),	Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) leve en ecografía,	Evidencia ecocardiográfica de Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) moderada	Evidencia ecocardiográfica de Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) disfunción diastólica y/o signos de falla cardíaca severa / muy severa,
	Daño en órgano blanco: Cerebro	Sin daño de Órgano blanco Y sin historia	Historia de AIT (accidente isquémico transitorio)	Antecedentes de lesión cerebro-vascular sin secuelas al momento de la evaluación	Lesión cerebro-vascular con secuelas neurológicas permanentes.	Daño cerebro-vascular con secuelas neurológicas permanentes y encefalopatía

^aSi los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es del 99%

^bFactor Principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente o tomar el de mayor severidad cuando hay compromiso de más de un órgano blanco.

^cClasificación de Keith – Wagener – Baker

2.5.9. Procedimiento para calificar enfermedad vascular periférica de miembros superiores.

Tabla 2.7 Deficiencia por enfermedad vascular periférica de miembros superiores^b.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%	50% al 74%	75% al 99% ^a
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E	
Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas: claudicación intermitente y dolor en reposo (Arterial)	No están presentes o claudicación intermitente, o dolor en descanso	Presentes cuando hay uso exigente de extremidades superiores o dolor con exposición al frío	Presentes cuando hay uso moderado de extremidades superiores	Presentes cuando hay uso leve de extremidades superiores	Síntomas severos y constante dolor en reposo o con uso mínimo de las extremidades superiores
	Edema (Venoso)	Transitorio	Persistente moderado controlado sin soporte elástico	Persistente moderado controlado con soporte elástico	Marcado que sólo se controla parcialmente con soporte elástico	Marcado que no se controla con soporte elástico
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico (arterial)	No hay hallazgos excepto pérdida de pulsos	Daño vascular evidente como muñón de dígito amputado indolor y sanado, con evidencia de enfermedad vascular persistente	Daño vascular evidente por signos como amputación a nivel de la muñeca o más arriba o amputación de dos o más dígitos de una extremidad, con evidencia de enfermedad vascular persistente	Daño vascular evidente por signos como amputación a nivel de las dos muñecas o amputación de todos los dígitos.	
	Examen físico (venoso)	Pérdida mínima de tejido subcutáneo de puntas de dedos.	Ulcera curada de una o ambas extremidades	Ulceración superficial de una o ambas extremidades.	Ulceración profunda o diseminada persistente de una extremidad.	Con evidencia de ulceración profunda o diseminada persistente que involucra las dos extremidades.
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor principal)	Ultrasonido venoso (profundo y comunicantes) arterial o angiografía	Normal	Evidencia compromiso venoso o arterial leve	Evidencia compromiso venoso o arterial moderado	Evidencia compromiso venoso o arterial severo	Evidencia compromiso venoso o arterial muy severo

^aSi todos los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es de 99%.

^bEl linfedema se califica de acuerdo con el compromiso de los Miembros Superiores por la movilidad articular afectada y dolor en el SNP.

2.5.10 Procedimiento para calificar enfermedad vascular periférica de miembros inferiores.

Tabla 2.8. Deficiencia por Enfermedad vascular periférica de miembros inferiores^c.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%	15% al 49%	50% al 74%	75% al 99% ^a
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2 5 8 11 14 A B C D E	15 24 32 41 49 A B C D E	50 56 62 68 74 A B C D E	75 81 87 93 99 A B C D E

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas: claudicación intermitente y dolor en reposo, (Arterial)	No están presentes, o claudicación intermitente, o dolor en descanso,	Presentes cuando hay uso exigente de extremidades inferiores,	Presentes cuando hay uso moderado de extremidades inferiores (caminando 23 – 90 metros a paso promedio),	Presentes cuando hay uso leve de extremidades inferiores (menos de 23 metros) ó dolor en reposo	Síntomas severos y constante dolor en reposo o con uso mínimo de las extremidades inferiores
	Edema (Venoso)	Transitorio.	Persistente moderado controlado sin soporte elástico	Persistente moderado controlado con soporte elástico	Marcado que sólo se controla parcialmente con soporte elástico	Marcado que no se controla con soporte elástico
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico arterial	No hay hallazgos excepto por pérdida de pulsos o pérdida mínima de tejido subcutáneo	Daño vascular como muñón de dígito amputado indoloro y sanado.	Daño vascular como amputación de dos o más dígitos o una extremidad con evidencia de enfermedad vascular persistente	Daño vascular como amputación a la altura o más arriba del tobillo, o de dos o más dígitos con evidencia de enfermedad vascular persistente esparcida	Daño vascular como amputación a la altura de los dos tobillos o más arriba de dos extremidades o amputación de todos los dígitos con evidencia de enfermedad vascular persistente
	Examen físico venoso	Varicosidades venosas.	Úlcera sanada.	Ulceración superficial.	Úlcera involucrando profundamente una extremidad.	Úlcera profunda que involucra las dos extremidades.
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor principal) ^b	ITB ^d	Normal	Normal o mínimamente anormal (mayor de 0,9)	Levemente anormal (0,71 - 0,9)	Moderadamente anormal (0,41 - 0,7)	Severa o muy severamente anormal marcadamente (menor o igual 0,4)
	Ultrasonido venoso (profundo y comunicantes) arterial o angiografía	Normal	Evidencia compromiso venoso o arterial leve	Evidencia compromiso venoso o arterial moderado	Evidencia compromiso venoso o arterial severo	Evidencia compromiso venoso o arterial muy severo

^aSi los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es de 99%.

^bFactor Principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios. Sólo aplica para sistema arterial y/o sistema venosos profundo y comunicantes.

^c El linfedema se califica de acuerdo con el compromiso de los Miembros Inferiores por la movilidad articular afectada y dolor en el SNP.

^dITB: Índice Tobillo/Brazo es el cociente entre la presión arterial sistólica maleolar y la presión arterial sistólica en el brazo. El ITB es una exploración no invasiva útil para valorar la existencia de isquemia en miembros inferiores.

2.5.11. Procedimiento para calificar enfermedad arterial pulmonar.

Tabla 2.9 Deficiencia por enfermedad arterial pulmonar

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1					Clase 2					Clase 3					Clase 4				
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 14%					15% al 49%					50% al 74%					75% al 99% ^a				
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	2	5	8	11	14	15	24	32	41	49	50	56	62	68	74	75	81	87	93	99
Historial clínico (Factor modulador)	Síntomas:	Asintomático	Disnea leve que no requiere tratamiento					Disnea leve y/o otros síntomas de falla cardíaca derecha en tratamiento o disnea moderada					Disnea moderada u otros síntomas de falla cardíaca derecha en tratamiento o síntomas severos.					Disnea severa u otros síntomas de falla cardíaca derecha en reposo o síntomas muy severos intermitentes.				
	Clasificación NYHA: Clase funcional	Normal	Clase funcional I					Clase funcional II					Clase funcional III					Clase funcional IV				
Examen físico o hallazgos físicos (Factor modulador)	Examen físico	Examen físico normal. No hay signos de falla cardíaca derecha.	Signos leves de falla cardíaca derecha.					Signos moderados de falla cardíaca derecha y edema periférico.					Signos severos de falla cardíaca derecha, edema periférico y ascitis.					Signos muy severos de falla cardíaca derecha, edema severo, ascitis y edema pulmonar.				
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor principal) ^b	Hipertensión pulmonar	< 35	35 – 40					41 – 50					51 - 60					≥ 60				
	VO ₂ max	No aplica	Mayor de 20					16 a 20					10 a 15					menor de 10				
	METS	≥ 10	≥ 7 a 9					< 7 a ≥ 5					< 5 a ≥ 2					< 2				

PAP: Presión de la Arteria Pulmonar la cual podrá verificarse mediante un ECOCARDIOGRAMA .

^aSi los tres (3) factores están calificados en la clase 4 el valor a asignar es de 99%.

^bFactor Principal. Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente .

VO₂ max: Volumen Máximo de O₂ (mL/min/kg)

Capítulo III Deficiencias por Trastornos del Sistema Respiratorio

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “*Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional*”

3.1. Objetivo. Proveer los criterios para el reconocimiento y la evaluación del déficit anatómico y funcional permanente por trastornos de las vías respiratorias bajas.

3.2 Alcance. En este capítulo se consideran las enfermedades o grupos de patologías relacionadas con la inhalación de aire en los pulmones, el intercambio de gases entre el aire y la sangre y la expulsión del aire. Las alteraciones de las vías aéreas superiores serán consideradas en el capítulo de deficiencias por alteraciones de oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas.

3.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

3.3.1. Consideraciones preliminares: La Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT) es un criterio para calificar en este capítulo. En las tablas de deficiencia se incluye la CAT, por lo que no se debe generar calificación adicional por este concepto, excepto en trasplante, en el cual se adiciona el 10% al valor final de la deficiencia obtenida de acuerdo a la tabla aplicada (deben sumarse aritméticamente a la deficiencia final del capítulo).

Sólo serán objeto de valoración para calificación aquellas personas que presenten enfermedades crónicas consideradas no recuperables en cuanto a la función, con un curso clínico no inferior a doce (12) meses, contados desde el diagnóstico e inicio del tratamiento. No deben ser consideradas las alteraciones funcionales transitorias y reversibles.

La valoración de la deficiencia se fundamentará en el resultado de pruebas funcionales objetivas, como la espirometría forzada post broncodilatador o el uso de inhaladores, la capacidad de difusión del monóxido de carbono y la medida de la capacidad de ejercicio, complementada con criterios clínicos. En los estados clínicos que, como consecuencia de fases de agudización, puedan sufrir un aumento de la disfunción respiratoria, no se realizará una nueva evaluación hasta que la situación se haya estabilizado.

Cuando la enfermedad respiratoria curse en brotes, la evaluación de la deficiencia que pueda producir se realizará en los períodos inter críticos. Para la evaluación de estas situaciones, se documentará médicalemente la temporalidad según la frecuencia y duración de los episodios.

Los criterios para la valoración de personas que padecen enfermedades, que por sus características requieren ser consideradas de forma diferente al resto de la patología del aparato respiratorio, se contemplan en el apartado denominado “Criterios para la valoración de situaciones específicas”.

Las pruebas funcionales tendrán valor para la evaluación de la deficiencia respiratoria, sólo si se han efectuado cuando la persona se encuentra en una condición estable, alejada de un episodio agudo o recurrente y siempre que se hayan agotado los recursos terapéuticos pertinentes. Si la afección respiratoria forma parte de una entidad patológica con manifestaciones en otros órganos y sistemas, se combinarán los porcentajes de deficiencia correspondientes a todas las partes afectadas.

3.3.2. Criterios de evaluación del sistema pulmonar: Para la evaluación del sistema pulmonar, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Criterio 1. Historia de disnea como factor modulador.

Disnea: Es el estado en que una persona se torna consciente del esfuerzo o de la dificultad para respirar; se acompaña de una penosa sensación de no poder inspirar suficiente cantidad de aire y de un deseo de respirar con más fuerza. Para clasificar la disnea se utiliza como referente la clasificación del Medical Research Council (MRC), modificada por la American Thoracic Society (ATS), que se observa en la Tabla 3.1, esta debe ser realizada por profesionales de la salud tales con especialidad con competencia técnica y científica para tal fin tales como (especialista en medicina interna, medicina familiar, entre neumología o un terapeuta respiratorio).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 3.1 Escala de disnea MCR-ATS

Magnitud	Grado	Características
Nada	0	Sin disnea, excepto ejercicios extenuantes.
Leve	1	Al caminar rápido en plano o subir pendiente leve.
Moderada	2	Tiene que caminar más lento o debe detenerse en caminatas en terreno plano.
Severa	3	No puede caminar más de 100 metros sin detenerse por disnea.
Muy severa	4	La disnea le impide salir de la casa. La presenta al vestirse o desvestirse.

Criterio 2. Pruebas objetivas de función respiratoria como factor principal (CVF, VEF₁, DLco, Vo_{máx.}): La exploración de la función pulmonar es la base para la valoración objetiva del estado del aparato respiratorio. Incluye la espirometría forzada post broncodilatador: para efectos de calificación se utilizan la capacidad vital forzada (CVF) y el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF₁). Estos valores deben expresarse en términos absolutos y en porcentaje del valor normal esperado. Igualmente, deben ser reportados por el aparato con el cual se realizó la espirometría forzada.

Los valores de referencia establecidos para las pruebas espirométricas, de acuerdo con el sexo, la edad y la talla de la persona, disponibles entre otros son: PLATINO (2.005), NHANES III (1.999), KNUDSON (1.983) el de la American Thoracic Society (ATS), Crapo (1981) o para poblaciones en sitios de más de 2.600 de altura, el del Instituto Boliviano de Biología de la Altura (IBBA).

Debido a que el NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) es el valor de referencia que toma en cuenta las poblaciones de blancos, hispanos, nativos americanos, asiáticos, población afrodescendiente y mexicoamericana, se debe tomar como valor de referencia en las pruebas espirométricas.

3.4. Procedimiento para la Calificación de las Deficiencias

3.4.1. Metodología de calificación:

- Determine el tipo de patología según la clasificación de las tablas que aparecerán en los siguientes apartados, a fin de elegir la tabla apropiada para la calificación. Todas las enfermedades respiratorias se califican con la Tabla 3.2 (Criterios para la calificación de la deficiencia por disfunción pulmonar) excepto el asma y otras hiperreactividades (ver Tabla 3.3).
- Identifique en las tablas el “factor principal” y los “factores moduladores”.
- Siga los pasos descritos en los numerales 5 y 6 del título preliminar para determinar el valor de la deficiencia.

Tabla 3.2 Criterios para la calificación de la deficiencia por disfunción pulmonar.

CLASE	CLASE 0	CLASE 1			CLASE 2			CLASE 3			CLASE 4		
RANGO DE LA DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0	1% al 9%			10% al 24%			25% al 49%			50% al 80%		
GRADO DE SEVERIDAD (%)	N.A.	1	5	9	10	17	24	25	37	49	50	65	80
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
HISTORIA	Disnea a pesar de tratamiento(Factor modulador)		Disnea grado 1.			Disnea grado 2.			Disnea grado 3.			Disnea grado 4.	
Disnea a pesar de tratamiento(Factor modulador)	Disnea grado 0	Disnea grado 1.			Disnea grado 2.			Disnea grado 3.			Disnea grado 4.		

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

PRUEBAS OBJETIVAS (Factor principal): ^a	CVF	CVF $\geq 80\%$ del valor esperado	CVF entre 70% y 79% del valor esperado	CVF entre 60% y 69% del valor esperado	CVF entre 50% y 59% del valor esperado	CVF por debajo de 50% del valor esperado
	0	0	0	0	0	0
VEF ₁	VEF ₁ $\geq 80\%$ del valor esperado	VEF ₁ entre 65% y 79% del valor esperado	VEF ₁ entre 55% y 64% del valor esperado	VEF ₁ entre 45% y 54% del valor esperado	VEF ₁ por debajo de 45% del valor esperado	
DLco	DLco $\geq 75\%$ del valor esperado	DLco entre 65% y 74%	DLco entre 55% y 64%	DLco entre 45% y 54%	DLco debajo de 45%	
VO ₂ máx.	>25mL/(kg-min)	Entre 22 y 25mL /(kg-min)	Entre 18 y 21mL /(kg-min)	Entre 15 y 17mL /(kg-min)	<15mL/(kg-min)	
METS	0	0	0	0	0	
	>7.1	6.1-7.1	5.1-6.0	4.3-5.0	<4.3	

^a Factor principal: CVF, indica Capacidad Vital Forzada;

VEF₁, Volumen Expiratorio Forzado en el primer segundo post broncodilatadores;

DLco: Difusión o transferencia de monóxido de carbono;

VO₂ max: volumen máximo de oxígeno;

METS: equivalentes metabólicos (múltiplos de consumo de oxígeno en reposo). Para elegir la clase deben tener en cuenta al menos uno de los criterios de estudios clínicos, apoyándose en el más actualizado o reciente (no superior a tres meses). Se toma el valor esperado o el mismo valor predictivo.

Los pacientes con el uso de oxígeno domiciliario que no es continuo o en determinadas horas o situaciones no aplicaría clase IV

3.5. Criterios para la Valoración de Situaciones Específicas.

3.5.1 Asma y otras hiperreactividades: Solo debe considerarse como portadores de una deficiencia, a quienes presentan crisis persistentes o síntomas permanentes que impiden la actividad diurna o el sueño nocturno, habiéndose agotado los protocolos terapéuticos vigentes al momento de la valoración, es decir cuando se ha logrado la MMM. Se deberá hacer la evaluación definitiva después de un año de observación con tratamiento bien llevado; en todo caso, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

Califique la deficiencia por asma con los parámetros establecidos en la Tabla 3.3 y teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Criterio 1. Parámetros clínicos (factor modulador): la frecuencia de las crisis de broncoespasmo y la necesidad de medicación.

Criterio 2. Resultado de pruebas objetivas (factor principal): VEF₁ máximo post broncodilatador porcentaje del predicho, predictivo o esperado o en su defecto se aplica el PC₂₀ mg/ml: es una prueba de provocación bronquial que tiene como propósito demostrar la hiperreactividad bronquial (respuesta anormal a la administración vía aerosol de metacolina o histamina) que causa una caída del 20% respecto al VEF₁ basal. Para propósitos clínicos se informa la PC₂₀, que es la concentración del fármaco. El PC₂₀ se toma cuando ya está documentada en la historia clínica.

Califique la deficiencia por asma con los parámetros establecidos en la Tabla 3.3 y teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Diagnóstico de asma: Verifique que en la historia clínica esté debidamente soportado el diagnóstico.
- Determine la severidad del asma mediante pruebas de función pulmonar (VEF₁ posterior a broncodilatación o PC₂₀) y ubíquela en la clase respectiva.

Tabla 3.3. Criterios para la calificación de las deficiencias por asma^a

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0	1% al 9%	10% al 24%	25% al 49%	50% al 80%
GRADO DE SEVERIDAD	N.A.	1 A 5 B 9 C	10 A 17 B 24 C	25 A 37 B 49 C	50 A 65 B 80 C
Parámetros clínicos (necesidad de medicación mínima para controlar las crisis de broncoespasmo)	No requiere medicación	Uso ocasional de broncodilatador (no diario)	Inhalación diaria de dosis baja de esteroides (<500 mcg por día de beclometasona o equivalente)	Inhalación diaria de dosis alta (500-1000 mcg por día) de esteroide inhalado y/o periodos cortos de esteroides sistémicos y un broncodilatador de efecto prolongado. y/o Uso diario de esteroides, sistémicos inhalados y uso diario de broncodilatadores máximos	Asma no controlada con tratamiento
Exámenes objetivos ^b	VEF ₁ máximo post broncodilatador ^b	>80% del valor esperado	70% al 80% del valor esperado	60% al 69% del valor esperado	50% al 59% del valor esperado
	PC ₂₀ mg/mL ^b	6-8	3-5	3-0.5	0.5-0.25
					<0.24-0.125

^a Modificado de Ranavaya, M.I. El reto de evaluar la deficiencia y discapacidad en el asma.

^b Factor principal: se usa el VEF₁ (% del predicho) post broncodilatador o PC₂₀.

3.5.2. Neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca, es una enfermedad pulmonar granulomatosa intersticial y bronquial por sensibilización inmune a polvos orgánicos y a algunos antígenos químicos de bajo peso molecular. La calificación debe realizarse utilizando los parámetros establecidos en la Tabla 3.2, una vez que el episodio agudo haya desaparecido y la condición sea estable.

3.5.3. Neumoconiosis: Es la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones tisulares provocadas por su presencia. Las deficiencias por neumoconiosis se califican usando la Tabla 3.2.

Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS): Las manifestaciones del **SAHOS** (hipoventilación alveolar, hipertensión pulmonar, déficit intelectual y cambios en la personalidad, entre otros) se calificarán de acuerdo con el o los capítulos correspondientes y se combinarán los valores obtenidos. La deficiencia por hipoventilación alveolar, se calificará en Tabla 3.2.

La deficiencia de la persona total por la presencia de **SAHOS** debidamente documentada, no excede el 15% de la deficiencia de la persona global y se asigna de acuerdo con la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Criterios para calificar la deficiencia por SAHOS.

SAHOS					
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0	1% al 4%	5% al 9%	10% al 15%	16% al 25%
GRADO DE SEVERIDAD	N.A.	1 A 2 B 4 C	5 A 7 B 9 C	10 A 12 B 15 C	16 A 18 B 20 C
Clinica ^a	N.A.	Ronquidos sin somnolencia.	Ronquidos y apneas observadas y presenta un IMC ^b ≤30.	Ronquidos y apneas observadas y presenta un IMC >30.	
Uso de CPAP (PPCVR) Presión positiva continua en las vías respiratorias;), BiPAP; Presión positiva de dos niveles en la vía aérea	N.A.	No requiere	Requiere	Cuadro refractario a pesar de usar el CPAP O BiPAP	

^aFactor principal, con diagnóstico comprobado de SAHOS, ronquidos y apneas corroborados por polisomnografía.

^b Ver Tabla 4.2 y 4.3 capítulo de alteraciones del sistema aparato digestivo.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

3.5.4. Cáncer pulmonar: Las personas con cáncer pulmonar deberán calificarse bajo los criterios del capítulo de cáncer, mientras que el compromiso pulmonar se evaluará con la Tabla 3.2 de criterios para la calificación de la deficiencia por disfunción pulmonar, a fin de combinar los valores obtenidos.

3.5.5. Alteraciones circulatorias pulmonares (embolismo pulmonar e hipertensión arterial pulmonar): Las alteraciones de la circulación pulmonar pueden causar deficiencia respiratoria. Se califican con los parámetros de la Tabla 3.2. El porcentaje de deficiencia producido por esta disfunción deberá combinarse con el originado por la insuficiencia cardíaca derecha o hipertensión pulmonar, en aquellas personas que la presenten.

3.5.6. Trasplante de pulmón: Se valora doce (12) meses después del procedimiento quirúrgico, con base en el estado funcional de la persona, mediante la Tabla 3.2. de criterios para la calificación de la deficiencia por disfunción pulmonar. Se debe evaluar la Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT) de acuerdo con los criterios del numeral 6 del Título Preliminar y sumar aritméticamente la deficiencia por CAT con la deficiencia global por alteraciones pulmonares. Si se presentan secuelas por el tratamiento recibido, éstas se evaluarán en los capítulos respectivos, dependiendo del tipo de deficiencia y se procederá a combinar los valores obtenidos.

Las deficiencias por los efectos del tratamiento inmunosupresor se califican según los criterios del capítulo correspondiente y se combinan con los obtenidos en este capítulo.

3.5.7. Deficiencias pulmonares que requiere uso de oxígeno permanente: Aquellas personas que requieran uso de oxígeno domiciliario frecuente o continuo, se les asigna el valor del literal C, clase IV de la Tabla 3.2 o 3.3 de la deficiencia que dio origen a este requerimiento.

Capítulo IV Deficiencia por Alteración del Sistema Digestivo

4.1. Objetivo. Proveer los criterios para el reconocimiento y la evaluación del déficit anatómico y funcional permanente por la alteración, pérdida parcial o total de la estructura o de la función del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano; hígado, páncreas y vías biliares).

4.2. Alcance. Este capítulo establece los criterios para el reconocimiento y evaluación de la deficiencia permanente de las enfermedades del tracto digestivo superior (esófago, estómago y duodeno, intestino delgado), tracto digestivo inferior (colon, recto y ano), páncreas, hígado y vías biliares incluyendo la identificación de las hernias de la pared abdominal y del hiato; éstas alteraciones deben estar clínicamente establecidas o determinadas por deficiencias en la ingestión, el transporte (trastornos en la deglución) y la absorción de los alimentos, el metabolismo y la excreción de productos de desecho. Así mismo, en esta sección se consideran los efectos de la disfunción de la articulación temporo-maxilar o de otra parte de la boca. Se excluyen las siguientes condiciones relacionadas con el TGI que se revisaran en otro capítulo de acuerdo a la deficiencia a calificar: Lesiones tumorales o neoplasias del sistema digestivo, alteraciones de la voz y el habla, las alteraciones de las vías respiratorias altas. Se considera que la obesidad exógena no es un trastorno del tracto gastrointestinal.

Para aumentar la confiabilidad de la evaluación de la deficiencia gastrointestinal y permitir valoraciones comparables con la disfunción de otros órganos o sistemas, se han adoptado, en particular, los siguientes lineamientos:

- a. Asignar el mismo valor de deficiencia para el intestino delgado y grueso porque impactan de forma similar sobre la persona, según la gravedad de la enfermedad o lesión.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- b. Las deficiencias por alteraciones del hígado se combinarán con las deficiencias por enfermedades primarias de otros órganos del sistema digestivo.
- c. Algunos trastornos digestivos pueden producir deficiencias nutricionales, alteraciones neurológicas, psiquiátricas, hematológicas, cardiovasculares, inmunológicas, endocrinas, cutáneas, oftalmológicas y locomotoras. Estas deficiencias deben ser valoradas por separado en sus capítulos respectivos, para luego aplicar la fórmula de valores combinados en conjunto con la o las deficiencias del sistema digestivo.
- d. Se deberán adicionar puntos porcentuales por la Carga de Adherencia al Tratamiento - CAT relacionada con el régimen nutricional.

4.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

El sistema digestivo se encarga de recibir los alimentos (ingestión), fraccionarlos en sus nutrientes (digestión), absorber estos nutrientes hacia el flujo sanguíneo y eliminar del organismo los restos no digeribles.

Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño. Son tres (3) los criterios a considerar en la evaluación de la deficiencia derivada de las enfermedades del tracto digestivo (el historial clínico, los hallazgos físicos y las pruebas objetivas o paraclínicas):

Criterio 1. Historial clínico.

1. **Signos y síntomas de enfermedad:** Generalmente las alteraciones del esófago se manifiestan por disfagia, pirosis, epigastralgia, reflujo, dispepsia, sangrado gastrointestinal y pérdida de peso. Las alteraciones del estómago y el duodeno suelen presentar signos y síntomas como náuseas, dolor abdominal tipo epigastralgia, hematemesis, vómito ocasional o permanente (síndrome pilórico); en casos ocasionales, la obstrucción duodenal se manifiesta con vómito y dolor. Otros signos pueden ser diarrea crónica, con o sin malabsorción, con o sin esteatorrea y sangrado.

Las alteraciones del intestino delgado se manifiestan con dolor abdominal, diarrea crónica (más de 3 meses), con o sin malabsorción, con o sin esteatorrea, sangrado en forma de melenas, rectorragia o hematoquecia, distensión abdominal y otros signos clínicos generales como anorexia, pérdida de peso, astenia y adinamia, entre otros; además hay manifestaciones extraintestinales, como alteraciones de la piel, de las mucosas (glositis) o del sistema nervioso (deficiencia de vitaminas o minerales).

Las manifestaciones de las alteraciones pancreáticas dependen de la patología subyacente. En casos de pancreatitis crónica, con o sin pérdida progresiva e irreversible de las funciones exocrina y endocrina, puede presentarse dolor abdominal crónico, sitofobia (temor a comer), diarrea crónica con o sin malabsorción, pérdida de peso, anorexia y diabetes mellitus secundaria. Estas últimas condiciones deben ser valoradas en las tablas específicas y luego aplicar la fórmula o tabla de valores combinados de deficiencias.

En las alteraciones hepatobiliarias se presenta dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho con irradiación dorsal, náusea, vómito, anorexia, predisposición a infección por inmunosupresión, ictericia, circulación colateral, petequias, telangiectasias, asterixis, prurito generalizado (colestasis) atrofia testicular, alteración en la distribución de vello púbico y ginecomastia (hombres), pérdida de peso, acolia y hepatoesplenomegalia (en ocasiones dolorosa). En las complicaciones por enfermedad avanzada del hígado se presentan edema generalizado, ascitis, hipertensión portal, varices esofágicas con o sin hemorragia, disturbios metabólicos, encefalopatía hepática, asterixis e insuficiencia renal, entre otras. Estos deben ser valorados con los criterios de las tablas específicas y luego aplicar la fórmula o tabla de valores combinados.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Las alteraciones de la pared abdominal se pueden acompañar de malestar general, dolor intermitente, en o cerca del sitio de la hernia, protuberancia palpable, visible, o inflamación en el sitio de la hernia, que aparece o desaparece con los cambios posturales o de la presión abdominal (maniobra de Valsalva). El dolor aumenta por encarcelación o estrangulación del intestino o epiplón. La mayoría de las hernias abdominales son susceptibles de corrección quirúrgica.

Los síntomas y signos digestivos se clasifican según su frecuencia en:

Tabla 4.1 Clasificación de los signos y síntomas según su frecuencia

Clasificación según presentación de los síntomas y signos / tiempo	Porcentaje de presentación de signos y síntomas / día*
Nunca u ocasionalmente	Hasta el 33% del tiempo
Frecuente	Entre el 34% y el 66% del tiempo
Continuo	67% o más del tiempo

* Estimación sobre las 24 horas del día, teniendo presente que el nivel de exactitud es imposible de lograr clínicamente.

Criterio 2. Hallazgos físicos (alteración anatómica).

- Distancia máxima de apertura de la boca, restricción de la apertura de la boca o del cierre, mala oclusión o pérdida de la dentición.
- Pérdida de tejidos blandos (pérdida parcial de un labio, de la lengua, entre otros).
- Disfagia para sólidos y/o líquidos; reflujo gastroesofágico.
- Localización y grado de estenosis.
- Daño anatómico o funcional del órgano evaluado.
- Tamaño, localización y manejo de hernias.
- Ascitis, ictericia o hemorragia por várices esofágicas; enfermedad del tracto biliar.
- CAT: Las tablas de deficiencia de este capítulo incluyen la CAT en el aparte de Historial Clínico. Por lo anterior, no se debe generar calificación adicional por este concepto.
- Índice de Masa Corporal IMC: La pérdida de peso se calcula con el IMC, en las tablas de clasificación del grado de deficiencia, una vez ha pasado la MMM. Es un criterio esencial para evaluar la gravedad y las consecuencias de los trastornos del sistema digestivo.

Debe ser verificado al momento del examen físico durante la calificación. Para determinar el peso deseable o normal se emplea el IMC, que indica el estado nutricional de la persona y se basa en el peso actual en kilogramos (kg) y la altura en metros (mts). Su cálculo arroja como resultado un valor que indica si la persona que se evalúa se encuentra por debajo, dentro o con exceso del rango de peso establecido como normal para la edad y talla (Tablas 4.2 y 4.3). La ecuación matemática que permite obtener su valor, es la siguiente:

$$IMC = \frac{\text{Peso (Kg)}}{\text{Altura}^2 (\text{mts})}$$

En la calificación de las deficiencias, las consecuencias de los procedimientos quirúrgicos, esto es, la pérdida funcional o anatómica y la baja de peso, se establecen con base en el peso normal, empleando la tabla específica para el aparato digestivo superior. Los valores obtenidos se interpretan con base en las Tablas 4.2 y 4.3.

Tabla 4.2. Clasificación internacional de bajo peso, sobrepeso y obesidad en adultos (hombres o mujeres) según IMC (mayores de 18 años)

Categoría	Índice de masa corporal
	Punto de corte principal

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Bajo peso	Menor de 18.5
Delgadez	16.00 a 18.49
Normal	18.5 a 24.9
Sobrepeso	≥ 25.0
Preobesidad	25.00 – 29.99
Obesidad I	> 30.00 – 34.9
Obesidad II	> 35.00 – ≥39.9
Obesidad III	40 o más

Fuente: Adaptado de OMS, 1995; OMS, 2000; OMS de 2004 y 2018

Cada diez años, por encima de los 25 años, estas cifras aumentan un punto, es así que un IMC de 28 es normal para personas de 55 a 65 años.

Tabla 4.3. Interpretación del IMC para niños y adolescentes (2 a 18 años)

Categoría	Índice de masa corporal
Bajo peso	Inferior al percentil 5
Peso normal	Entre el percentil 5 y el 84
Sobrepeso	Entre el percentil 85° y el 94°
Obeso	Superior o igual al percentil 95°

Nota: Tomar como referencia las Tablas de crecimiento y desarrollo AIEPI – OPS

De acuerdo al examen físico encontrado, el compromiso funcional o anatómico se clasifica según la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Clasificación según porcentaje de compromiso funcional o anatómico

Clasificación	Porcentaje anatómico o funcional comprometido*
Mínimamente anormal	Anormalidad anatómica o funcional no mayor del 10%; generalmente asintomático
Alteración leve	Compromiso entre el 11% y el 25%
Alteración moderada	Compromiso entre el 26% y el 50%
Alteración severa	Compromiso entre el 51% y el 75%
Alteración muy severa	Mayor del 75%

* Tener presente que el nivel de exactitud es imposible de lograr objetivamente.

Criterio 3. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas: Como referencia se tienen algunas de las siguientes pruebas diagnósticas documentadas, según la patología y los criterios dados en la tabla correspondiente:

- Exámenes para evaluar la función de la articulación temporo-mandibular (ATM) y la masticación; incluye valoración de la dentición y oclusión mediante la historia clínica, el examen físico, rayos X, otras imágenes (Tomografía axial computarizada) y artroscopia de la ATM.
- Valoración de enfermedades esofágicas:
 - Imágenes diagnósticas como radiografía de vías digestivas altas con y sin contraste, esofagograma, videocinedeglución; rayos X y fluoroscopia; endosonografía endoscópica y tomografía computarizada.
 - Procedimientos endoscópicos (esófagogastroduodenoscopia), el estudio citológico o biopsias.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- Pruebas funcionales como manometría y Phmétria con o sin impedanciometria.
- c. Valoración de estómago y duodeno:
 - Imágenes diagnosticas tales como: radiografía, fluoroscopia, radioscopiade vías digestivas con y sin contraste, gammagrafía de vaciamiento gástrico (en fase sólida o líquida), endosonografía, resonancia y TAC de abdomen simple y con contraste.
 - Procedimientos endoscópicos: esófagogastroduodenoscopia y capsula endoscópica con o sin biopsia, estudio citológico
 - Pruebas de secreción gástrica (gastrina)
 - Pruebas de malabsorción (vitamina B 12, antitrasglutaminasa, anticuerpos contra células parietales)
 - Pruebas de estudio de materia fecal: coprológico, coproscópico, coprocultivo, sudan III (grasas neutras), sangre oculta en heces, detección de antígenos de helicobacter Pylori.
 - Otros: test de aliento con urea para Helicobacter Pylori y anticuerpos IGM y IGG para Helicobacter Pylori.
- d. Valoración de enfermedades del intestino delgado:
 - Imágenes: fluoroscopia y radiografía con o sin medio de contraste.
 - Procedimientos endoscópicos: esófagogastroduodenoscopia y capsula endoscópica con o sin biopsia y estudio citológico.
 - Pruebas de malabsorción intestinal, grasas en heces, pruebas de excreción urinaria de D-xyloso, prueba de alcoholemia y prueba de Schilling (específica para malabsorción de la vitamina B-12).
- e. Valoración de enfermedades de la función pancreática:
 - Imágenes: ecografía, rayos X, TAC y RMN con y sin medio de contraste, aspiración con aguja fina.
 - Pruebas de glicemia y curvas de tolerancia a la glucosa.
 - Determinación de las enzimas pancreáticas en sangre (amilasa y lipasa), orina y heces.
 - Test de electrolitos en sudor.
 - Endosonografía biliopancreática con o sin estudio citológico.
 - Pruebas de secreción.
- f. Valoración de enfermedades de colon, recto y ano:
 - Exámenes endoscópicos como la rectoscopia, sigmoidoscopia, proctosigmoidoscopia y colonoscopia izquierda y total con o sin biopsia y citología.
 - Biopsia y citología.
 - Examen de heces: coprológico, coproscópico, coprocultivo, sangre oculta en heces
 - Manometría rectal y de colon
 - Fluoroscopia y radiografía con medios de contraste (radiografía de abdomen simple, radiografía de colon por enema, radiografía de tránsito intestinal con marcadores radiopacos.)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- Otras imágenes: ecografía de recto y tejidos blandos, RMN y TAC abdominopélvico simple y contratado.

g. Valoración de la insuficiencia hepatobiliar:

- Ecografía hepatobiliar
- Rayos X con contraste, como la colangiografía percutánea y endoscópica.
- TAC y RNM de abdomen superior y colangioresonancia.
- Gammagrafía con nucleótidos, gammagrafía hepatoesplénica
- Angiografía.
- Doppler portal
- Biopsia de hígado y aspiración dirigida con aguja;
- Diferentes pruebas de laboratorio para evaluar los conductos biliares y las funciones del hígado.

h. Valoración de las hernias:

- Examen físico de la pared abdominal
- Imágenes diagnosticas: ultrasonografía de tejidos blandos de pared abdominal y pélvica, Rayos X o TAC con o sin medios de contraste.

4.4. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias.

Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia: Los criterios de deficiencia utilizados en este capítulo incluyen el historial clínico, el examen físico y los resultados objetivos o paraclínicos. La decisión para asignar la clase, se basa en el factor principal, que se establece en las tablas de cada deficiencia evaluada, mientras el ajuste de grado al interior de la clase se realiza de acuerdo con los factores moduladores. La calificación se realiza una vez se haya alcanzado la Mejoría Médica Máxima – MMM, o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Se debe fundamentar en el estado clínico actual, dentro de los últimos seis (6) meses a la fecha de la valoración médica.

4.4.1. Calificación de las deficiencias por alteraciones de la masticación y la fase oral de la deglución: Los problemas en la masticación y en la fase oral de la deglución pueden estar asociados con deficiencias de las vías respiratorias, sobre todo si se relacionan con la bronco aspiración de alimentos en la laringe. Tales condiciones deben ser evaluadas en el capítulo correspondiente. Cuando la masticación o la deglución se ven afectados, la imposición de restricciones en la dieta por lo general da resultados. El factor principal es el examen físico y los factores moduladores son el historial clínico y la pérdida de peso - IMC.

Adicionalmente a las tablas anteriores, relacionadas particularmente con enfermedades del tracto digestivo, es importante considerar los daños generados en la cavidad oral por traumas o enfermedades (Tabla 4.5)

Tabla 4.5. Criterios para la calificación de las deficiencias por alteraciones de la masticación y la fase oral de la deglución.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 5%	6% al 18%	20% al 36%	40% al 60%
GRADO DE SEVERIDAD (%)	0	1 2 3 4 5 (A B C D E)	6 9 12 15 18 (A B C D E)	20 24 28 32 36 (A B C D E)	40 45 50 55 60 (A B C D E)
HISTORIAL CLÍNICO (factor modulador)	Asintomático	Dificultades al masticar alimentos duros	La dieta está limitada a alimentos semisólidos o blandos	La dieta está limitada a alimentos líquidos.	Para la ingestión de alimentos requiere tubo de alimentación o gastrostomía
Pérdida de peso (IMC) ^(c)	No Aplica	No pérdida de peso	Pérdida de peso ≤ al 10% del límite inferior IMC.	Pérdida de peso entre el 11% y 20% del límite inferior IMC.	La pérdida de peso > 20% del límite inferior IMC.
EXAMEN FÍSICO (factor principal)	Exploración (Presentación de alteraciones anatómicas o funcionales minimas o normal)	Evidencia alteraciones anatómicas o funcionales o leves	Evidencia alteraciones anatómicas o funcionales moderadas	Evidencia alteraciones anatómicas o funcionales severas	La exploración física evidencia Alteraciones anatómicas o funcionales muy severas
	Limitación a la apertura o pérdida de tejidos blandos	No se percibe	Ligera limitación, menor de 1 cm	Pérdida de tejidos blandos (pérdida parcial de un labio, de la lengua, entre otros)	Pérdidas de tejidos blandos (pérdida mayor de media lengua y/o de un labio)
					Amplias pérdidas de tejidos blandos u óseos
				Constricción permanente de los maxilares (desplazamiento en bloque de las arcadas: inversión del articulado, seudoprognatia, retrognatia, laterognatia, apertura anterior), entre otros.	Constricción permanente inoperable de maxilares
				y/o	y/o
				pérdida óseas (pérdida de la bóveda palatina)	Amputaciones que interesan a las mejillas, labios, lengua y tejidos óseos
	Pérdidas dentales ^(b)	3 o menos de piezas dentales	De 4 a 9 piezas dentales	Más de 9 piezas dentales a edentación total superior o inferior	Edentación total superior e inferior
					No aplica

^{a)} Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

^{b)} Sólo se califican cuando no son susceptibles de corrección por contraindicación médica o quirúrgica.

^{c)} Se debe tener en cuenta que la pérdida de peso para efectos de cuantificar la deficiencia, se considera a partir del peso normal o deseable, según el IMC (ver Tablas 4.2 y 4.3) por causas médicas. En las Clases 0 y 1, las puntuaciones no se asocian con pérdida de peso y no son utilizadas para discriminar los grados dentro de la Clase 1.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

4.4.2 Calificación de las deficiencias por alteraciones del tracto digestivo superior (esófago, estómago y duodeno, intestino delgado y páncreas): Los criterios de valoración de las deficiencias relacionados con la enfermedad del tubo digestivo superior se indican en la tabla 4.6. Los antecedentes clínicos (historial clínico) son el factor principal que determina la clase de deficiencia. Por lo general, la historia clínica permite que el médico elija la clase correcta de esta deficiencia.

Tabla 4.6. Criterio para reconocimiento y evaluación de las deficiencias por desórdenes del tracto digestivo superior (esófago, estómago y duodeno, intestino delgado y páncreas.)

4.4.3. Calificación de las deficiencias por desórdenes de colon y recto.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^c
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	10% al 29%	30% al 49%	50% al 75%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 3 5 7 9 (A B C D E)	10 15 20 25 29 (A B C D E)	30 35 40 45 49 (A B C D E)	50 59 63 69 75 (A B C D E)
HISTORIAL CLÍNICO (factor principal) ^(a) síntomas o signos del tracto digestivo superior	Historia previa de enfermedad del tracto digestivo superior; no presentan síntomas activos	Frecuente y no requiere de tratamiento continuo o solo dieta indicada	Frecuente y requiere de medicación diaria con restricciones dietéticas indicadas	Continuo y alimentación enteral	Continuos y alimentación parenteral
EXAMEN FÍSICO (factor modulador) ^(b) Pérdida de peso (IMC)	No hay pérdida de peso	Pérdida de peso menor 5% del límite inferior IMC.	Pérdida de peso entre el 6% y 10% del límite inferior IMC.	Pérdida de peso entre el 11% y 15% del límite inferior IMC.	La pérdida de peso > 15% del límite inferior IMC.
RESULTADOS OBJETIVOS(factor modulador) ^{d)}	Con anormalidad es mínimas o asintomática	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional leve	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional moderada	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional severa	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional muy severa con las necesidades futuras previstas para la corrección quirúrgica o ausencia completa de órganos

a) Factor principal: Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

b) Se debe tener en cuenta que la pérdida de peso para efectos de cuantificar la deficiencia, se considera a partir del peso normal o deseable, según el IMC (ver Tablas 4.2 y 4.3) y no por la pérdida de peso por sí misma.

c) Si se clasifica en la Clase 4, basándose en el historial clínico y la pérdida de peso o los resultados objetivo que pertenecen a esta clase, el valor corresponde al predeterminado, es decir 50%. Si los dos factores moduladores están dentro de la Clase 4, entonces se asignará el valor máximo de esta clase, esto es el 75%.

d) Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los criterios para la evaluación de deficiencias por enfermedad de colon y recto se relacionan en la tabla 4.7. El historial clínico es el factor principal que determina la clase de deficiencia. Los registros médicos permitirán al médico escoger el tipo de deficiencia correcto.

Tabla 4.7. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por desórdenes del colon y recto.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(c)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	12% al 20%	22% al 38%	40% al 60%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 3 5 7 9 (A B C D E)	12 14 16 18 20 (A B C D E)	22 26 30 34 38 (A B C D E)	40 45 50 55 60 (A B C D E)
HISTORIAL CLÍNICO (factor principal) ^(a)	Historia previa de enfermedad; sin síntomas activos	Presentan síntomas o signos ocasionales y no requiere de tratamiento continuo.	Presentan síntomas o signos ocasionales y requiere de medicación diaria o de restricciones dietéticas indicadas	Presenta síntomas o signos frecuentes y requiere de medicación diaria o de restricciones dietéticas indicadas	Presenta síntomas o signos continuos y requiere de medicación diaria y de restricciones nutricionales indicadas
EXAMEN FÍSICO ^(b) Pérdida de peso (IMC)	No hay pérdida de peso	Pérdida de peso menor 5% del límite inferior IMC.	Pérdida de peso entre el 5% y 10% del límite inferior IMC.	Pérdida de peso entre el 11% y 15% del límite inferior IMC.	La pérdida de peso > 15% del límite inferior IMC.
RESULTADOS OBJETIVOS (factor modulador) ^(d)	No presenta anormalidades o presenta mínimamente anormalidades funcionales y/o anatómicas	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional leve	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional moderada	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional severa	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional muy severa o ausencia completa del órgano

^{a)} **Factor Principal.** Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

^{b)} Se debe tener en cuenta que la pérdida de peso para efectos de cuantificar la deficiencia, se considera a partir del peso normal o deseable, según el IMC (ver Tablas 4.2 y 4.3) y no por la pérdida de peso por sí misma. En las Clases 0 y 1, las puntuaciones no están asociadas con pérdida de peso y no son utilizadas para discriminar los grados dentro de la Clase 1.

^{c)} Si una persona es clasificado en la Clase 4, por otros factores diferentes al factor principal, éste se debe tomar en la clasificación un grado más alto dentro de la clase.

^{d)} Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

4.4.4. Calificación de las deficiencias por desórdenes del ano:

La enfermedad anal es una causa poco común de deficiencia, aunque la combinación de incontinencia y los síntomas anales severos que no responden a la terapia pueden ser bastante enervantes. El historial clínico es el factor principal.

Tabla 4.8. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por trastornos del ano.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 5%	6% al 15%	16% al 20%	22% al- 30%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 3 5 (A B C)	6 10 15 (A B C)	16 18 20 (A B C)	22 26 30 (A B C)
HISTORIAL CLÍNICO (factor principal) ^(a)	Historia previa de enfermedad del año. No síntomas activos.	Presentan síntomas o signos ocasionales de enfermedad y no requiere de tratamiento continuo	Presentan síntomas o signos ocasionales de enfermedad, y requiere de tratamiento.	Presenta síntomas o signos frecuentes de enfermedad, no obstante requiere de medicación diaria u otro tratamiento	Presenta síntomas o signos continuos de enfermedad, no obstante requiere de medicación diaria u otro tratamiento
RESULTADOS OBJETIVOS(factor modulador)^(b)	No presenta anormalidades o presenta mínimamente anormalidades funcionales y/o anatómicas	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional leve	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional moderada	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional severa	Se debe documentar una pérdida anatómica o funcional muy severa o ausencia completa

a) Factor Principal. Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

b) Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

4.4.5. Calificación de las deficiencias por fistulas enterocutáneas:

Las fistulas enterocutáneas permanentes del tracto gastrointestinal, tracto biliar o del páncreas, generalmente están asociadas a enfermedades de estas estructuras o son consecuencia del tratamiento de un segmento u órgano involucrado. Las estomas permanentes creados quirúrgicamente, usualmente se instauran como medio de compensación para las pérdidas anatómicas o para permitir la entrada o salida del tubo digestivo. No existe una deficiencia adicional determinada en las personas que las utilizan para su nutrición dado que la CAT está incluida en la clasificación para la ostomía. Sin embargo, se debe emplear la clasificación más alta en estas personas. De la misma forma, se debe emplear la clasificación más alta para cada categoría cuando el estoma no esté funcionando.

Se debe combinar el valor de la deficiencia dado por el estoma permanente de origen quirúrgico y luego combinar con el porcentaje obtenido por la enfermedad del órgano, siguiendo la fórmula de combinación de valores presentada en el numeral 5° del Título Preliminar.

Tabla 4.9. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por fistulas enterocutáneas.

Estoma creada	% Deficiencia total
Esofagostomía	20%
Gastrostomía	20%
Yeyunostomía	30%
Ileostomía	30%
Anastomosis ileal anal de bolsa	30%
Colostomía	20%

4.4.6 . Clasificación de las deficiencias por enfermedad del hígado:

En caso de haber realizado estudios paraclínicos o patológicos, se deben consignar los resultados de la función hepática, ecografía, tomografía computarizada – TC, resonancia magnética (RM), biopsia del hígado, colangiografía transhepática percutánea, colangiolapcreatografía retrógrada endoscópica - CPRE, EEG,

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

concentraciones de amoníaco en sangre y gammagrafía hepática con isótopos radiactivos, entre otros. La deficiencia causada por una enfermedad o lesión del hígado puede ser de origen traumático o por exposición a virus, parásitos o tóxicos además de: autoinmunes, hemocromatosis, metabolismo del cobre, hereditarias o trastornos genéticos. Tales deficiencias se clasifican en este capítulo y en la tabla 4.10. En trasplante, se adiciona el 10% al valor final de la deficiencia obtenida de acuerdo a la tabla aplicada.

Tabla 4.10. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por enfermedad del hígado.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 (c)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	5% al 14%	15% al 29%	30% al 49%	50% al 90%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		5 10 14 (A B C)	15 22 29 (A B C)	30 40 49 (A B C)	50 70 90 (A B C)
HISTORIAL CLÍNICO(factor principal)^(a)	Historia previa de enfermedad hepática resuelta	Persistencia de enfermedad hepática, sin síntomas ni antecedentes de ascitis, ictericia o hemorragia por várices esofágicas en los últimos 3 años. La enfermedad no es progresiva	Persistencia de enfermedad hepática, sin síntomas ni antecedentes de ascitis, ictericia o hemorragia por várices esofágicas en el último año	Enfermedad hepática progresiva con historia de ascitis, ictericia o hemorragia por várices esofágicas ó encefalopatía hepática resuelta	Enfermedad hepática crónica progresiva; persistencia en el último año de ictericia o de hemorragias por várices esofágicas o por várices gástricas con encefalopatía por insuficiencia hepática
HALLAZGOS FÍSICOS(factor modulador)	No hay signos de enfermedad del hígado o del tracto biliar	Buena nutrición y fuerza sin signos de enfermedad crónica del hígado o con signos leves	Con signos moderados de enfermedad crónica del hígado y presenta pérdida de peso por debajo del 10% del normal o deseable (IMC)	Signos cutáneos y oculares de enfermedad crónica del hígado y presenta entre el 10% y 20% de pérdida de peso por debajo del peso normal o deseable (IMC)	La pérdida de peso es superior del 20% del peso normal o deseable (IMC)
RESULTADOS OBJETIVOS (factor modulador)^(b)	No presenta anormalidades en las pruebas	Las pruebas bioquímicas, de imagen y/o los estudios funcionales indican alteraciones leves o trastornos en	Las pruebas bioquímicas, de imagen y/o los estudios funcionales indican alteración hepática moderada	Las pruebas bioquímicas, de imagen y/o los estudios funcionales indican alteración hepática severa con	Las pruebas bioquímicas, de imagen y/o los estudios funcionales indican alteración hepática muy severa

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 (c)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	5% al 14%	15% al 29%	30% al 49%	50% al 90%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		5 10 14 (A B C)	15 22 29 (A B C)	30 40 49 (A B C)	50 70 90 (A B C)
		la función principal del metabolismo de la bilirrubina		compromiso sistémico, alteración de las proteínas, la albúmina o los factores de coagulación	e irreversible con compromiso sistémico, alteración de las proteínas, la albúmina o los factores de coagulación.

a) Factor Principal.

b) Los hallazgos hematológicos y neurológicos deben ser evaluados también en los sistemas respectivos, aplicando combinación de las deficiencias resultadas con las del daño hepático. Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

c) Si una persona es evaluada en la Clase 4 para los factores diferentes al *factor principal*, se tomará el máximo valor de esta clase; si todos los factores son de Clase 4, se asigna la máxima calificación, esto es el 90%. La mayoría de las enfermedades señaladas en la Clase 4, deberán ser valoradas en las deficiencias respectivas, según el sistema orgánico comprometido.

d) Para calificar la severidad, RESULTADOS OBJETIVOS (factor modulador) se debe tener en cuenta la clasificación de las pruebas hepáticas de clasificación de child pugh.

Parámetros	Puntos asignados		
	1	2	3
Ascitis	Ausente	Leve	Moderada
Bilirrubina, mg/dL	</= 2	2-3	>3
Albúmina, g/dL	>3,5	2,8-3,5	<2,8
Tiempo de protrombina			
* Segundos sobre el control	1-3	4-6	>6
* INR	<1,8	1,8-2,3	>2,3
Encefalopatía	No	Grado 1-2	Grado 3-4

Una puntuación total de 5-6 es considerada leve, de 7 a 9 moderada; y 10-12 severa y de 12 a 15 muy severa.

4.4.7. CRITERIOS DE DEFICIENCIA POR TRANSPLANTE HEPATICO.

Las deficiencias por los efectos del tratamiento inmunosupresor se califican según los criterios del capítulo correspondiente y se combinan con los obtenidos en este capítulo.

4.4.8. Calificación de las deficiencias por enfermedad del tracto biliar:

Entre los criterios de valoración del daño corporal debido a enfermedad del tracto biliar, se incluyen la estenosis del tracto biliar, los cálculos impactados, la colangitis primaria o esclerosante y la cirrosis biliar primaria o secundaria. En caso de haberse realizado estudios paraclínicos y/o histopatológicos, ecografía, la colangiografía trans hepática percutánea, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica - CPRE y la gammagrafía hepatobiliar, entre otras pruebas se deben consignar los resultados en la historia clínica. Una

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

afectación considerable de la vesícula usualmente conlleva a una colecistectomía que, por lo regular, no causa síntomas o problemas significativos (5% de deficiencia). Las deficiencias en el tracto biliar y vesicular se consideran en la tabla 4.11 y se deben combinar con las deficiencias a nivel hepático en los casos en que ambas estén presentes. Los antecedentes clínicos representan el factor principal.

Tabla 4.11. Criterios para el reconocimiento y la evaluación de las deficiencias por enfermedad del tracto biliar.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(b)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	10% al 25%	26% al 49%	50% al 90%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 5 9 (A B C)	10 17 25 (A B C)	26 37 49 (A B C)	50 70 90 (A B C)
HISTORIAL CLÍNICO (factor principal) ^(a)	Historia previa de enfermedad del tracto biliar.	Historia previa de enfermedad del tracto biliar o de colecistectomía	Presenta enfermedad del tracto biliar recurrente, reparable	Presenta enfermedad del tracto biliar recurrente, irreparable.	Presenta enfermedad del tracto biliar recurrente, irreparable, con colangitis recidivante
RESULTADOS OBJETIVOS (factor modulador) ^(c) pruebas de laboratorio y estudios por imágenes	No presenta anormalidades.	Compatibles con enfermedad del tracto biliar leve.	Compatibles con enfermedad del tracto biliar moderada.	Compatibles con enfermedad del tracto biliar e insuficiencia hepática crónica severas.	Compatibles con insuficiencia hepática crónica muy severa

^{a)} Factor principal
^{b)} En esta clase no se deberá calificar las deficiencias del hígado derivadas del tracto biliar por estar ya incluidas.
^{c)} Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

4.4.9. Calificación de las deficiencias por hernias:

Los criterios para la evaluación de la deficiencia causada por una hernia abdominal se encuentran señalados en la Tabla 4.12. Una intervención exitosa típica de hernia, por lo general conlleva a deficiencia del 0%. En caso de persistir dolores causados por atrapamiento del nervio residual, se debe valorar esta deficiencia en el capítulo de deficiencia por alteraciones del Sistema Nervioso Central y Periférico. Si una hernia diafragmática o hiatal afecta la función digestiva o pulmonar, se deben valorar las deficiencias ocasionadas en el tracto digestivo superior o el sistema respiratorio. Cuando las hernias diafragmáticas afectan la respiración, se emplean los criterios para la enfermedad pulmonar restrictiva con el fin de otorgar el valor de la deficiencia. En caso de presentarse más de una hernia, los valores de cada una de ellas se combinarán. La(s) hernia(s) se califican cuando existe contraindicación de la corrección por causas médicas o quirúrgicas, no se consideran los defectos herniarios.

Tabla 4.12. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por hernias.

Tipo de hernia	% Deficiencia total
Hernia simple:	
Inguinal, umbilical, crural	5%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Hernia diafragmática	10%
Hernia inguinal bilateral	15%
H. inguino-escrotal	20%
Hernia recidivante	15%
Hernia hiatal	10%
Hernias complejas	
Eventración abdominal	40%
Hernia hiatal con sintomatología y repercusión somática	50%

Capítulo V
Deficiencias del Sistema Urinario y Reproductor

5.1. Objetivo. Proveer los criterios clínicos para la evaluación de la deficiencia dada por la alteración, disfunción o pérdida parcial o total de la estructura, o de las funciones permanentes y definitivas, relacionadas con el Sistema Urinario y Reproductor. Se excluyen de manera explícita las patologías neoplásicas y los órganos que se afecten por compromiso del sistema urogenital; estas deficiencias deben ser valoradas en los capítulos correspondientes aplicando la fórmula de combinación de valores presentada en el numeral 6° del Título Preliminar.

5.2. Alcance. Este capítulo establece los criterios para el reconocimiento y la evaluación de la deficiencia permanente de las enfermedades de los sistemas urinario, reproductor o ambos, incluyendo al tracto urinario superior (riñones y uréteres), la vejiga y la uretra, así como los órganos reproductivos masculinos (pene, escroto, testículos, epidídimo, cordón espermático, próstata y vesículas seminales) y los femeninos (vulva, vagina, cérvix, útero, trompas de Falopio y ovarios). El sistema reproductor femenino está influenciado por la edad, especialmente en las mujeres en la edad de procreación; se deben considerar las diferencias fisiológicas entre las mujeres en la edad de procreación y posmenopáusicas, al evaluar las deficiencias por enfermedades del sistema reproductivo. Como se mencionó antes, se excluyen las lesiones tumorales o neoplasias del sistema urinario y reproductor o ambos.

5.3. Definiciones y principios de evaluación. En este capítulo se tendrán en cuenta los criterios de Carga de Adherencia al Tratamiento de la persona – CAT, en relación con trasplantes, diálisis y uso de esteroides a largo plazo (más de 2 años de dosis diaria), los cuales están asociados con algunos efectos sistémicos adversos, llegando a causar en algunas personas insuficiencia suprarrenal; de presentarse, se debe calificar en el capítulo correspondiente y combinar valores. Para valorar la frecuencia de uso, vía de administración de los medicamentos y modificación de la dieta, se deben utilizar las tablas de la CAT del capítulo 8 (tablas 8.1 a 8.3, “Deficiencias por Alteración del Sistema Endocrino”). Para la valoración de la frecuencia de la diálisis se tendrá en cuenta el siguiente numeral:

5.3.1. Procedimiento basado en la frecuencia de la diálisis: Para valorar la frecuencia de la diálisis que recibe una persona con patología renal, se utiliza la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Puntuación según frecuencia de la diálisis

Procedimiento	Puntos
Grado I: Diálisis 1 vez por semana	4
Grado II: Diálisis 2 veces por semana	6
Grado III: Diálisis 3 veces por semana	8
Grado IV: Diálisis 4 o más veces por semana	10

Se suman los puntos obtenidos de cada tabla aplicada, para luego asignarle, según la Tabla 16 del numeral 6 del Título Preliminar (Deficiencia por Carga de Adherencia al Tratamiento), un valor de deficiencia final.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Las enfermedades de otros sistemas, por ejemplo los sistemas hematopoyético, endocrino o neurológico, pueden producir deficiencia en el sistema urinario o reproductivo. Estas deficiencias se deben combinar con las deficiencias del sistema urinario o reproductivo.

Para asignar la clase de deficiencia, se debe revisar y evaluar el historial clínico, los hallazgos físicos y los resultados de las pruebas clínicas objetivas. Entre las consideraciones para determinar la deficiencia, está el grado en que la enfermedad afecta las funciones específica y global del sistema urinario y/o reproductivo, así como el impacto de la medicación y la necesidad periódica de realizar procedimientos.

5.3.2. Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño: Los criterios a considerar en la evaluación de la deficiencia derivada de las enfermedades o traumas del sistema urinario, reproductor o ambos son:

Criterio 1. Historial clínico (factor principal):

Signos y síntomas de enfermedad: Los síntomas y signos presentados por enfermedad del tracto urinario superior pueden incluir cambios en la orina, edema, adinamia, astenia, pérdida de apetito y de peso, anemia, uremia, dolor de espalda, dolor abdominal o dolor a nivel del ángulo costovertebral, hematuria, escalofríos y fiebre; hipertensión y sus complicaciones; cambios en la apariencia de la orina o de sus sedimentos y cambios bioquímicos en la sangre. La enfermedad renal, especialmente, en las primeras etapas, puede hacerse evidente sólo por los resultados de laboratorio.

Los síntomas y signos presentados por enfermedad de la vejiga pueden incluir cambios en la frecuencia urinaria, disuria, goteo, incontinencia y retención urinaria; hematuria, leucocituria, obstrucción por cálculos urinarios y una masa suprapública.

Entre los síntomas y signos por enfermedad de la uretra, incluyen disuria, disminución o alteración del chorro urinario, fimosis, parafimosis, masas perituretrales y disminución del calibre urinario.

Criterio 2. Hallazgos físicos (Factor modulador): se consideran como factor modulador:

- a. Signos de enfermedad.
- b. Alteración anatómica (pérdida anatómica y anormalidades).

Criterio 3. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor modulador): se consideran también como factor modulador:

- a. **Pruebas clínicas:** creatinina sérica y creatinina en orina son criterios que evalúan la función del tracto urinario superior. El nivel de creatinina en sangre refleja la función renal global. En condiciones normales de hidratación, el nivel de creatinina sérica debe ser inferior a 133 micromoles/L (1,5 mg/dL).
- b. La tasa de filtración glomerular mide la creatinina endógena en orina; aporta una estimación cuantitativa de la población total de nefronas en funcionamiento.
- c. El daño del parénquima y la evaluación de anormalidades del conducto pueden requerir procedimientos de diagnóstico tales como exámenes de laboratorio bioquímico, análisis de orina y urocultivo, cistoscopia, biopsia, la arteriografía, la radiografía de las vías urinarias, la tomografía computarizada
- TC o resonancia magnética nuclear - RMN.
- d. Otros estudios útiles en la evaluación de la función de la vejiga incluyen la cistoscopia, cistografía, cistouretrografía miccional, cistometría, uroflometría. También se pueden realizar otros estudios para la evaluación de la función uretral mediante la uretroskopía, uretrografía, cistouretrografía, la endoscopia y cistometrografía.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

5.3.3. Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia: Se utiliza la metodología descrita en los numerales 5 y 6 del título preliminar.

5.4. Procedimientos para Calificación de las Deficiencias del Tracto Urinario.

5.4.1. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por alteraciones del tracto urinario superior: Los criterios para reconocer y evaluar las deficiencias del tracto urinario superior se encuentran en la tabla 5.2. El historial clínico es el factor principal.

La depuración de creatinina es la prueba más precisa para valorar la función renal y se asume como factor modulador importante en cada clase, dado que cuantifica el grado de deficiencia del tracto urinario superior. También muestra la gravedad y la magnitud del daño cuando otras pruebas diagnósticas describen deficiencias intermitentes o persistentes. El trasplante renal exitoso mejora notablemente la función renal, razón por la cual, se evaluará la funcionalidad residual en la tabla pertinente y se adiciona el 10% al valor final de la deficiencia obtenida de acuerdo a la tabla aplicada.

Tabla 5.2. Criterios para la evaluación de las deficiencias por desórdenes del tracto urinario superior.

CLASE DE DEFICIENCIA		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA		0	1% al 13%	14% al 29%	30% al 59%	60% al 90%
GRADO DE SEVERIDAD (%)			1 4 7 10 13 (A B C D E)	14 18 22 26 29 (A B C D E)	30 38 46 53 59 (A B C D E)	60 68 75 83 90 (A B C D E)
Historial clínico ^(b) (Factor principal)	Síntomas o signos	Tiene antecedentes de enfermedad del tracto urinario superior y presenta recuperación completa	Ocasionales que no requieren tratamiento (por ejemplo, cálculo renal) o	Ocasionales que hacen necesaria la vigilancia continua y tratamiento médico (por ejemplo, la pielonefritis crónica) o	Presenta síntomas o signos frecuentes con Disfunción renal que no están completamente controlados por el tratamiento médico-quirúrgico continuo. (por ejemplo, la insuficiencia renal con diálisis intermitente para estabilizar la función)	Presenta síntomas o signos frecuentes con Disfunción renal que no están completamente controlados por el tratamiento médico-quirúrgico continuo. (por ejemplo, la insuficiencia renal con diálisis intermitente para estabilizar la función)
	Diálisis o trasplante		Solamente funciona un riñón y no requiere diálisis	Presenta trasplante renal exitoso	Presenta trasplante renal exitoso	Requiere de diálisis peritoneal o hemodiálisis a largo plazo
Síntomas físicos y pruebas clínicas ^(c)		Mínimamente anormal asintomática o	Presenta signos intermitentes de enfermedad del tracto urinario superior con alteración leve que no requieren tratamiento continuo o vigilancia permanente	Presenta signos físicos o pruebas del tracto urinario superior con alteración moderada en forma continua que hace necesaria la vigilancia periódica y requiere tratamiento frecuente (por ejemplo, la pielonefritis crónica)	Presenta signos físicos o pruebas del tracto urinario superior con alteración severa	Presenta signos físicos o pruebas del tracto urinario superior con alteración muy severa
Pruebas función renal	Test de función renal	Normal	Depuración de creatinina de 75 a 90 L / 24 h (52 a 62,5 ml / min)	Depuración de creatinina de 60 a 74 L / 24 h (40 a 51,5 ml/min)	Depuración de creatinina de 40 a 59 L / 24 h (28 a 39 ml / min)	Depuración de creatinina por debajo de 40 L / 24 h (28 ml / min)

^{a)} Si el *factor principal* de una persona corresponde a la Clase 4 y el examen físico y/o las pruebas objetivas son también coherentes con esta clase, el médico laboral puede optar por utilizar las más altas calificaciones en la Clase 4, que caracterizan un menoscabo considerable.

^{b)} *Factor principal.* Si está en la Clase 4, elija el valor correspondiente al 60% si la diálisis es peritoneal; elija el valor del 75% si se implementa hemodiálisis 2 veces a la semana; otorgue el valor correspondiente al 90% si se hace hemodiálisis 3 veces a la semana. No anticipamos que las personas de la Clase 4 tengan hallazgos físicos o pruebas de función renales compatibles con otra clase diferente a la 4, de modo que estos factores no principales, no son moduladores de esta Clase 4. Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

^{c)} Incluye síntomas físicos y pruebas clínicas encontradas de laboratorio o procedimientos diagnósticos. Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

5.4.2. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por derivaciones quirúrgicas del tracto urinario superior: Es corriente realizar derivaciones urinarias quirúrgicas para compensar las pérdidas anatómicas e implementar la cistectomía para permitir el flujo de orina. Estas derivaciones deben ser valoradas en el capítulo correspondiente a estomas quirúrgicos, además de evaluar la porción afectada del tracto urinario; los valores resultantes deben combinarse.

Tabla 5.3. Criterios para la evaluación de las deficiencias por derivaciones del tracto urinario superior (a)

Tipo de derivación	Porcentaje de deficiencia (%)
Uréter-intestinal	20%
Ureterostomía cutánea sin intubación	20%
Nefrostomía o ureterostomía	30%

^aSi hay más de una de (1) una derivación, o la derivación es bilateral, la calificación de la segunda derivación se debe combinar con la primera.

5.4.3. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad de la vejiga: El factor principal corresponde al historial clínico.

Clasificación de incontinencia urinaria

- Incontinencia urinaria de esfuerzo:** Pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal (como toser, reír, correr o caminar). Incontinencia urinaria de urgencia.
- Incontinencia de urgencia:** Es la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente de un deseo miccional súbito e intenso.

• **Evaluación inicial:**

Historia clínica: Naturaleza y duración del síntoma de incontinencia, tratamientos previos (quirúrgicos o no), estado mental y comorbilidad. El número de episodios de incontinencia y las compresas utilizadas.

Examen físico: Palpación abdominal, examen neurológico: Sensibilidad perineal táctil y dolorosa genital, anal y glútea.

Ayudas diagnósticas: Flujometría y cálculo de residuo postmiccional, Estudios urodinámicos: Cistomanometría, Estudio miccional (estudio de presión-flujo). Pruebas de imagen: ecografía, radiografía simple de abdomen, cistouretrografía retrógrada y miccional y pielografía, endoscopia (uretrocistoscopia)

Tabla 5.4. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad de la vejiga.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	10% al 19%	20% al 29%	30% al 60%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 5 9 (A B C)	10 15 19 (A B C)	20 25 29 (A B C)	30 45 60 (A B C)
Historial clínico ^(b) (Factor principal)	Historia de enfermedad de vejiga sin secuelas	Presenta síntomas ocasionales como nicturia o goteo, con la función normal entre cada episodio	Presenta síntomas frecuentes como dolor o pérdida de control de la micción a pesar del tratamiento continuo o función anormal	Presenta poco o ningún control voluntario de la micción o síntomas continuos a pesar del tratamiento	Extracción de la vejiga o vejiga excluida y requiere procedimiento de derivación urinaria
Resultados de pruebas funcionales para vejiga(uro dinamia) ^(c)	Normales	Las pruebas están mínima o levemente anormales	Las pruebas están moderadamente anormales	Las pruebas presentan alteración severa	Las pruebas presentan alteración muy severa

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- a) Si la persona cumple con el criterio de extirpación de la vejiga, se le asigna el valor máximo de 60%.
 b) *Factor principal:* Síntomas como urgencia urinaria, frecuencia, nicturia, incontinencia urinaria, goteo y dolor. Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.
 c) Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

5.4.4. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad de la uretra:
 Los hallazgos físicos corresponden al factor principal.

Tabla 5.5. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad de la uretra.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 5%	7% al 13%	16% al 22%	24% al 28%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 3 5 (A B C)	7 10 13 (AB C)	16 19 22 (A B C)	24 26 28 (A B C)
Historial clínico	Historia enfermedad de sin secuelas	Presenta síntomas que responden al tratamiento no invasivo o los síntomas son controlados con el tratamiento continuo	Presenta síntomas que responden al tratamiento con dilataciones; éstas se llevan a cabo al menos una vez al mes	Presenta síntomas que responden al tratamiento con dilataciones una vez al mes o más o presenta incontinencia urinaria de esfuerzo	Presenta incontinencia urinaria de mínimos esfuerzos o no responde a tratamiento con dilataciones
Signos físicos encontrados (Factor principal) ^(a)	Ninguno o no se encuentran anormalidades	Presenta en la cistoscopia anomalías físicas leves por estenosis de la uretra o a la cistouretrografía la micción es menor del 25% de obstrucción	Presenta obstrucción uretral moderada, está estenosada u obstruida entre 25% y 50% por cistoscopia, uretroscopia o cistouretrografía miccional	Presenta fistula al examen físico o incontinencia severa u obstrucción uretral residual mayor al 50 y hasta el 75% por cistoscopia, uretroscopia o cistouretrografía miccional	Alteración muy severa de la uretra o incontinencia severa u obstrucción uretral residual mayor de 75% a la cistoscopia, uretroscopia o cistouretrografía miccional ^(b)

- a) *Factor principal:* Los hallazgos objetivos incluyen las evidencias en el examen físico y/o los resultados en pruebas como cistoscopia, uretroscopia o cistouretrografía. Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.
 b) Usar puntuación más alta si los dos criterios de la clase 4 se cumplen o si la uretra está en más del 90% obstruida.

5.5. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias de los Órganos Reproductivos Masculino.

En las tablas de calificación se tienen en cuenta los porcentajes por deficiencia de los órganos masculinos de personas entre 40 y 65 años de edad. Los médicos laborales deben ajustar la calificación, así: hacia arriba-sumar (para los menores de 40 años) o hacia abajo-restar (para quienes están entre 40 y 65 años), el 10% de la deficiencia obtenida, según la edad y el nivel de funcionamiento sexual pre-mórbido. Por ejemplo, la deficiencia del pene en una persona de 30 años que era sexualmente activo pertenece a la Clase tres (3), que corresponde a un valor del diecinueve por ciento (19%), se ajusta sumándole el diez por ciento (10%) de este valor, es decir el uno coma nueve por ciento (1,9%) para una deficiencia global final del veinte coma nueve por ciento (20,9%).

5.5.1. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad del pene.

Para evaluar la deficiencia del pene se deben tener en cuenta las funciones sexuales y urinarias, combinando los valores obtenidos por cada una de las disfunciones. La calificación de la deficiencia de la función sexual masculina está dada por una pérdida anatómica o funcional, esto es, la pérdida de la libido o del orgasmo por falta de interés de la persona; se deben examinar en el capítulo correspondiente a las deficiencias por alteraciones del comportamiento y la enfermedad mental, para luego combinarlos con otras deficiencias.

Dentro de las pruebas técnicas objetivas para la evaluación de la función del pene, están los estudios de tumescencia peneana, la ecografía o Doppler del flujo sanguíneo del pene, la cavernosonometría dinámica, la cavernosografía y la angiografía. El historial clínico es el factor principal.

Tabla 5.6. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad del pene.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	5% al 10%	11% al 14%	15% al 20%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

GRADO DE SEVERIDAD (%)		5 8 10 (A B C)	11 12 14 (A B C)	15 17 20 (A B C)
Historial clínico (a) (Factor principal)	Antecedente de enfermedad del pene sin secuelas	La función sexual es posible con diferentes grados de dificultad en la erección o ésta responde al tratamiento médico	La función sexual puede ser posible, con erección insuficiente a pesar del uso de medicamentos. Persona con implantes de pene pertenecen a esta categoría si el implante corrige el problema	No es posible la función sexual
Hallazgos físicos o de tumescencia peneana nocturna ^{b)}	Sin anormalidades	Presenta anomalías leves , físicas o de las pruebas de tumescencia	Presenta anomalías moderadas , físicas o de las pruebas de tumescencia	Las anormalidades físicas o la alteración de las pruebas de tumescencia son severas a muy severas

a) **Factor principal:** se debe combinar esta deficiencia con las deficiencias obtenidas por enfermedad de la próstata o por incontinencia urinaria (enfermedad de la vejiga), siempre y cuando estén presentes.
b) Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

5.5.2. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por alteraciones del escroto.

Entre los síntomas y signos por deficiencia del escroto, se encuentra dolor, ampliación escrotal, inmovilidad testicular, testículo en lugar inadecuado y masas dentro del escroto. Como pruebas objetivas para evaluar la función del escroto están disponibles, entre otras, la exploración y la ecografía escrotal. La deficiencia por enfermedad del escroto no se ajusta por edad, por lo general. Los hallazgos físicos constituyen el *factor principal*.

Tabla 5.7. Criterios para la evaluación de las deficiencias por alteraciones del escroto.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3 (a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 3%	5% al 7%	11% al 15%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 2 3 (A B C)	5 6 7 (A B C)	11 13 15 (A B C)
Historial clínico ^{c)}	Antecedente de enfermedad del escroto sin secuelas	Con la actividad sexual presenta dolor o molestias ocasionales ; no hay evidencia de disfunción testicular	Presenta con la actividad dolor o molestias frecuentes	Presenta síntomas continuos de la enfermedad del escroto que no son controlados con tratamiento
Signos físicos encontrados (Factor principal) ^(b)	No hay signos por enfermedad del escroto	Posible mala posición testicular	Presenta alguna pérdida escrotal con movilidad testicular disminuida	Los testículos están implantados en lugar diferente del escroto para preservar la función testicular o Presenta limitaciones de la movilidad de los testículos al examen

a) Si una persona cumple con los criterios físicos para la Clase 3 y los síntomas son compatibles con ésta, se debe utilizar el valor más alto para esta clase, es decir, el 15%.
b) *Factor principal*.
c) Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

5.5.3. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad del testículo, el epidídimo y el cordón espermático.

Las enfermedades de los testículos, el epidídimo y el cordón espermático, pueden incluir signos y síntomas locales que se manifiestan con dolor, hipersensibilidad y cambios en el tamaño, el contorno, la posición y la textura, y/o alteración en la producción de hormonas testiculares y líquido seminal. Las pruebas objetivas disponibles son: vasografía, ultrasonido, linfangiografía, arteriografía y venografía espermática, biopsia, análisis del semen y cuantificación de hormona folículo estimulante (FSH), cetoesteroides e hidroxiesteroides. Para valorar la deficiencia el factor principal es el examen físico.

Tabla 5.8. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad del testículo, el epidídimo y el cordón espermático.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3 (a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 5%	6% al 15%	20%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 3 5 (A B C)	6 11 15 (A B C)	
Historial clínico^(c)	Antecedentes de enfermedad del testículo, epidídimo o del cordón espermático, sin secuelas	Presenta síntomas ocasionales por enfermedad del testículo, el epidídimo o el cordón espermático que responden al tratamiento, como ocurre en la epididimitis y la orquitis	Presentan síntomas frecuentes que sólo son controlados con tratamiento permanente	Presentan síntomas continuos que no responden al tratamiento
Signos físicos encontrados (Factor principal)^(b)	Ninguno. No presenta anormalidades en la función seminal u hormonal	Signos leves de enfermedad de testículo o epidídimo: Al palpar el cordón espermático presenta dolor, tumefacción. La ecografía orienta a una inflamación del epidídimo o los testículos	Presenta alteración anatómica o persisten signos físicos en los testículos, el epidídimo o el cordón espermático o Presenta alteraciones moderadas detectables en la función seminal u hormonal	Presenta pérdida bilateral anatómica de los órganos sexuales primarios o No se detecta función seminal u hormonal

^{a)} Clase 3 reservada para las personas con pérdida anatómica completa de los órganos sexuales o sin función seminal y sin detección hormonal.
^{b)} *Factor principal.* Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.
^{c)} Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

5.5.4. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad de la próstata y de las vesículas seminales: estas deficiencias deben combinarse con las obtenidas por alteración de las funciones urinarias. Los síntomas y signos por enfermedad de la próstata y las vesículas seminales generalmente incluyen dolor local o referido, sensibilidad, cambios en el tamaño y la textura de la próstata, oligoespermia y anormalidades del tracto urinario. Las pruebas objetivas incluyen urografía, endoscopia, ultrasonido de próstata, vasografía, biopsias, examen de secreción prostática y análisis de la excreción de hormonas masculinas. Los hallazgos físicos y las pruebas objetivas constituyen el *factor principal*.

Tabla 5.9. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad de la próstata y de las vesículas seminales^(a)

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 5%	6% al 15%	20%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 3 5 (A B C)	6 11 15 (A B C)	
Historial clínico^(c)	No presenta síntomas por enfermedad de la próstata y por disfunción seminal y no requiere tratamiento	Presenta signos y síntomas ocasionales por disfunción de la próstata. No requieren tratamiento	Presenta síntomas y signos frecuentes por disfunción de la próstata a pesar del tratamiento	Presencia de síntomas continuos de disfunción de próstata. Sólo responden parcialmente al tratamiento
Pruebas físicas pertinentes (cistoscopia y/o TAC) (Factor principal)^(b)	No presenta alteración anatómica	Alteración moderada anatómica	Alteración anatómica severa	Presenta ablación de la próstata y de los vasos seminales

^{a)} Combinar con las deficiencias por disfunción sexual y/o incontinencia urinaria cuando están presentes.
^{b)} *Factor principal.* Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.
^{c)} Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

5.6. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias de los Órganos Reproductivos Femenino

5.6.1. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad de la vulva y la vagina.

La vulva tiene funciones, sensitivas, sexuales y urinarias. La disfunción urinaria de la vulva se valora en la tabla sobre enfermedades de la uretra y se deben combinar los valores obtenidos. La vagina también tiene función durante el parto como canal del nacimiento. El clítoris es un órgano eréctil importante en la función sexual.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los síntomas y signos por enfermedad de vulva y vagina incluyen pérdida o alteración de la sensibilidad, pérdida de la lubricación, vulvaginitis, vulvitis, vaginitis, cicatrización, ulceración, estenosis, atrofia o hipertrofia, displasia o neoplasia, dificultades en las relaciones sexuales, la función urinaria y el parto vaginal, así como defectos en la estructura del periné.

Las calificaciones de la función sexual femenina están determinadas por pérdidas físicas o de la función. La pérdida del interés de la libido o del orgasmo se examina en el capítulo de deficiencias por alteraciones del comportamiento y la enfermedad mental. El factor principal corresponde a los hallazgos físicos encontrados.

Tabla 5.10. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad de la vulva y la vagina

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 10%	11% al 25%	26% al 40%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 6 1 0 (A B C)	1 1 1 8 2 5 (A B C)	2 6 3 3 4 0 (A B C)
Historial clínico ^(a)	No síntomas por enfermedad de la vulva o la vagina ni interferencia con la actividad sexual	Los síntomas o signos de la enfermedad vulvar o vaginal o la deformidad no requieren tratamiento continuo, sólo se presentan con las relaciones sexuales	Los síntomas o signos de la enfermedad vulvar o vaginal requieren tratamiento continuo y La relación sexual sólo es posible con algún grado de dificultad	Los síntomas o signos de la enfermedad vulvar o vaginal no son controlados por tratamiento y las relaciones sexuales no son posibles
Signos físicos encontrados ^(Factor principal) ^(b)	Si están en la edad de procreación. Presentan una vagina adecuada para partos.	Leve alteración en la anatomía vaginal o vulvar, con impacto menor sobre el potencial para el parto vaginal en la edad de procreación	Alteración moderada en la anatomía vaginal o vulvar, con potencial limitado para el parto vaginal en la edad de procreación	Alteración severa o muy severa en la anatomía vaginal o vulvar y vaginal y No es posible el parto vaginal en la edad de procreación

^{a)} Para las personas en las cuales las relaciones sexuales no son posibles por enfermedad de la vulva o vagina, si son premenopáusicas en las Clases 2 o 3, se les asigna el mayor valor de la clase respectiva, es decir, el literal C de la clase correspondiente y para las personas postmenopáusicas, la deficiencia será el literal A de la clase correspondiente.

^{b)} **Factor principal.** Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

5.6.2. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad del cuello uterino y el útero.

Los síntomas y signos por alteraciones del cérvix y el útero incluyen anormalidades en la menstruación, fertilidad, embarazo o trabajo de parto; dilatación anormal del canal cervical, estenosis o atresia, desplazamiento del útero, displasias, neoplasias y neoformaciones tumorales benignas como los miomas.

Pruebas objetivas útiles en la evaluación de la función cervical y del útero incluyen estudios del moco cervical, frotis vaginal, cervical e intrauterino para estudios citológicos, biopsias, ultrasonido, estudios radiológicos usando medios de contraste; estudios hormonales de sangre y orina; registros de temperatura basal, estudios de concentración, movilidad de espermatozoides; dilatación y curetaje uterino; estudios microscópicos de endometrio; ginecografía; laparoscopia, RMN, TAC, histeroscopia; ultrasonido placentario y sonohisterografía con solución salina.

Los hallazgos físicos son el factor principal para la determinación de las deficiencias.

Tabla 5.11. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad del cuello uterino y el útero

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 10%	11% al 25%	26% al 35%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 6 10 (A B C)	11 18 25 (A B C)	26 31 35 (A B C)
Historial clínico ^(a)	No presenta síntomas o signos por enfermedad del cuello uterino o el útero o ambos	Presenta síntomas y signos ocasionales por deformidad del cuello o del útero. Requiere tratamiento intermitente o Presenta estenosis cervical, no requiere tratamiento	Presenta síntomas y signos frecuentes o por deformidad del cuello ó del útero. Requiere tratamiento continuo o Presenta estenosis cervical; requiere tratamiento periódico .	Los síntomas y signos continuos del cérvix y del útero no son controlados por el tratamiento
Signos físicos encontrados (Factor principal) ^(b)	No presenta patología cervical o uterina	Presenta una pérdida anatómica o deformidad moderada del cuello de útero o del útero en el período postmenopáusico	Presenta estenosis importante del cuello o una pérdida anatómica o deformidad severa y significativa del cuello del útero o del útero en el período premenopáusico	Presenta estenosis cervical completa o la pérdida funcional completa del cuello uterino y del útero en el período premenopáusico

^{a)} Si pertenece a la Clase 2 y presenta síntomas no controlados se le otorga un 25% de deficiencia. Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

^{b)} **Factor principal:** Determina la clase de deficiencia por patología anatómica y funcional en estado reproductivo. El valor máximo en posmenopáusicas es del 10%. Los conceptos de mínimo, leve, moderado, severo y muy severo se encuentran definidos en la Tabla 4.4.

5.6.3. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedad de las trompas de Falopio y el ovario.

La trompa de Falopio transporta el óvulo y espermatozoides. Los ovarios desarrollan y liberan los óvulos y secretan hormonas reproductivas.

Entre los síntomas y signos por enfermedad de las trompas de Falopio y los ovarios se incluyen dolor pélvico, sangrado o flujo vaginal; estenosis de las trompas de Falopio, obstrucción; características morfológicas anormales; masas pélvicas; neoplasias; ausencia de ovulación, ovulaciones poco frecuentes o anormales; secreciones hormonales anormales y disfunciones menstruales.

Entre las pruebas objetivas para evaluar la función de las trompas de Falopio o de los ovarios, tenemos frotis cervical y vaginal para estudios citológicos, radiografías de pelvis; histerosalpingografía, ginecografía, biopsia de ovario, análisis de hormonas en sangre y orina, ultrasonidos, RNM, TAC, laparoscopia y estudios de temperatura basal y corporal. Los desórdenes hormonales se estudiarán en el capítulo respectivo y las deficiencias se combinarán con las generadas por alteraciones de las trompas de Falopio y los ovarios.

Las pruebas objetivas son el factor principal para clasificar y predetermina el valor inicial de la deficiencia.

Tabla 5.12. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad de las trompas de Falopio y el ovario

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 9%	10% al 24%	25% al 35%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 6 9 (A B C)	10 17 24 (AB C)	25 30 35 (A B C)
Historial clínico^(c)	Sin síntomas o signos por enfermedad	Síntomas o signos ocasionales por enfermedad que no requieren tratamiento continuo	Síntomas o signos frecuentes por enfermedad que requieren tratamiento	Síntomas o signos continuos por enfermedad que no responden al tratamiento

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Resultado de pruebas objetivas(Factor principal) ^(b)	No anormalidades por daño anatómico o funcional de la trompa de Falopio o el ovario	Funcionamiento normal de una sola trompa de Falopio o de un sólo ovario en el período premenopáusico	Enfermedad significativa de la trompa de Falopio o del ovario, pero persiste la permeabilidad tubárica y la ovulación es posible	Pérdida anatómica o de la función de las trompas de Falopio o la pérdida de ambos ovarios en el período premenopáusico
---	---	--	--	--

^{a)} Si el *factor principal* está en Clase 2, pero no responde al tratamiento (Clase 3 por historial clínico), la deficiencia es del 24%. Estos valores de deficiencia se combinan con las deficiencias obtenidas por el sistema endocrino para la pérdida de la función hormonal.

^{b)} El *factor principal* que induce la deficiencia corresponde a la patología anatómica y/o al estado reproductivo. No se otorga deficiencia si la pérdida se produce en el período posmenopáusico.

^{c)} Los conceptos de nunca u ocasional, frecuente y continuos se encuentran definidos en la Tabla 4.1.

Capítulo VI

Deficiencias por Trastornos de la Piel, Faneras y Daño Estético

6.1. Objetivo. Proveer los criterios para el reconocimiento y la evaluación del déficit anatómico y funcional por alteraciones permanentes de la piel y sus faneras, en relación con la función que desempeñan.

6.2. Alcance. Para los efectos de este capítulo se considera alteración permanente de la piel, cualquier anormalidad dermatológica o pérdida de tejidos que persista después de la Mejoría Médica Máxima – MMM, o se termine el proceso de rehabilitación integral; en todo caso, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. En este capítulo se califican las alteraciones permanentes de la piel y sus faneras, desfiguración, cicatrices y dermatitis de contacto.

6.3. Definiciones. Interpretación de síntomas y signos: La información del historial clínico relativa a los síntomas, debe complementarse con los hallazgos objetivos (signos) para estimar la deficiencia; ejemplo de ello es el síntoma del prurito y los hallazgos objetivos del rascado tales como liquenificación, escoriaciones o hiperpigmentación.

6.4. Principios de Evaluación

6.4.1. Criterios a considerar para la evaluación y ponderación del daño:

Los criterios a considerar para la evaluación de la deficiencia por alteraciones permanentes en la piel son el historial clínico, la carga de adherencia al tratamiento y los hallazgos al examen físico.

Criterio 1. Historial clínico factor principal. Presentación de signos y síntomas dermatológicos.

Criterio 2. Carga de adherencia al tratamiento – CAT - Factor modulador: la necesidad de uso de medicamentos.

Criterio 3. Hallazgos al examen físico - Factor modulador. Signos, extensión y persistencia de aparición.

6.5. Procedimientos Generales.

6.5.1. Metodología de Calificación.

- a.** Determine el tipo de enfermedad o patología para elegir la tabla o numeral con el que se califica: Tabla 6.1 Piel y faneras, Tabla 6.2 Desfiguración facial y Tabla 6.3 Quemaduras.
- b.** Una vez identificada la tabla, determine el factor principal y los factores moduladores.
- c.** Siga los pasos descritos en el numeral 5 del título preliminar, para utilizar la *metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia*, a fin de determinar el valor de la deficiencia.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- d. Cuando la patología se encuentra en uno de los numerales, realice la calificación, de acuerdo con las instrucciones de estos.

6.5.2. Consideraciones especiales.

- a. Cuando la enfermedad de la piel produzca manifestaciones en otros órganos y sistemas, estas se calificarán de acuerdo con lo definido en el capítulo correspondiente y la deficiencia global del órgano o sistema se combinará con la deficiencia global por alteraciones de la piel.
- b. Para la Clase 4 de deficiencia, si los resultados del examen físico son severos o muy severos, puede desplazarse al grado más alto de la clase inicial.
- c. En los casos de manifestaciones cutáneas permanentes de enfermedades sistémicas, las deficiencias por alteraciones de la piel se combinarán con las deficiencias de los órganos y sistemas afectados por esta condición.
- d. La desfiguración facial se califica con los criterios de la Tabla 6.2. Cualquier cicatriz facial debe ser valorada de acuerdo con los criterios establecidos en esta tabla y después, debe ser combinada con otras deficiencias de este capítulo, cuando sea pertinente.
- e. Las quemaduras se califican de acuerdo con la Tabla 6.3.

Tabla 6.1. Criterios para la calificación de las deficiencias por alteraciones de la piel y faneras por enfermedades de la piel

CLASE		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)		0%	1% -al 14%	15% al 39%	40% al 57%	58% al 62%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		0	1 5 8 11 14 (A B C D E)	15 22 30 35 39 (A B C D E)	40 44 48 52 57 (A B C D E)	58 59 60 61 62 (A B C D E)
Historial clínico (factor principal)	Presentación de signos y síntomas dermatológicos ¹	Nunca	Ocasionalmente.	Frecuente	Continuo	Continuo, severo o muy severo.
CAT (Factor modulador)		0 puntos	1 a 2 puntos	3 a 4 puntos	5 a 6 puntos	>6 puntos
Hallazgos al examen físico (Factor modulador)	Extensión por superficie corporal comprometida ó	No aplica	≤ 10%	> 10% a 20%, ó	≥ 20% a 40% y ó	≥ 40%
	Compromiso de regiones especiales (cara, mano y cuello)		Excluyen la cara	Involucran significativamente la cara o la parte anterior de cuello	Además de lo anterior involucran todo la región palmar de la mano.	

¹La graduación de la severidad corresponde a la Tabla 3 “Clasificación según presentación de los síntomas y signos por su frecuencia en el tiempo” del numeral 6 del título preliminar”.

6.6. Procedimiento para la Calificación de las Deficiencias por daño Estético (Desfiguración y Cicatrices)

Se considera *daño estético* toda irregularidad física o alteración corporal externa (aspecto físico); hace referencia a las alteraciones del color, la estructura y la configuración normal de la piel o una combinación de estas condiciones. La desfiguración puede derivarse de patología activa (lesión, enfermedad) o ser residual.

Si la desfiguración genera alteraciones de la movilidad articular, esta se califica en las deficiencias por alteración de la masticación, miembros superiores e inferiores y se hace combinación de valores con las deficiencias de este capítulo.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Si existe deficiencia por desfiguración que genera alteraciones mentales, se califica en el capítulo correspondiente y se hace combinación de valores. El daño estético deberá calificarse con los criterios de la Tabla 6.2.

Los cambios producidos en la piel, su estructura y configuración, provocados intencionalmente, tales como tatuajes, perforaciones (pearcing) u otras modificaciones corporales, no son objeto de calificación; no obstante, cuando en la reparación o eliminación de las mismas se generan secuelas como cicatrices o deformaciones, se convierten en objeto de calificación de este capítulo.

6.6.1. Criterios para la calificación de las deficiencias por desfiguración facial: Para calificar la deficiencia por desfiguración facial se consideran los cambios en la anatomía y la función. Principalmente se refieren a la pérdida de la integridad estructural de la cara.

6.6.1.1. Criterios a considerar para la evaluación y ponderación del daño.

Los criterios para la calificación de la deficiencia por desfiguración facial se describen en la Tabla 6.2. La pérdida de la integridad estructural de la cara puede presentarse por desfiguración cutánea debida a pigmentación anormal o cicatrices, o por pérdida de estructuras de soporte como tejidos blandos, huesos o cartílagos del esqueleto facial o por alteraciones de la función nerviosa.

Los criterios a considerar para la evaluación de la deficiencia por desfiguración facial son el historial clínico, los hallazgos al examen físico y los hallazgos en las pruebas diagnósticas, son:

Criterio 1. Historial clínico (Factor principal). Anormalidad anatómica facial.

Criterio 2. Hallazgos del examen físico (Factor modulador). Alteración de las funciones de ver, respirar, oír, oler y degustar.

Criterio 3. Hallazgos en las pruebas diagnósticas (Factor modulador). Estudios radiológicos.

6.6.1.2. Metodología de calificación: Se toma como referencia lo descrito en el numeral

6.6.1.3. Consideraciones especiales.

Las deficiencias derivadas de la función de los órganos de los sentidos localizados en el área facial (visión, olfato, gusto, oído y tacto) deberán calificarse de acuerdo con los criterios de los capítulos correspondientes, lo mismo que los trastornos de la respiración y de la alimentación y las deficiencias resultantes deberán ser combinadas con las deficiencias por desfiguración.

Tabla 6.2 Criterios para la calificación de las deficiencias por desfiguración facial.

CLASE		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)		0	1% al 5%	6% al 10%	11% al 24%	25 % al 50%
GRADO SEVERIDAD			1 2 3 4 5 (A B C D E)	6 7 8 9 10 (A B C D E)	11 14 17 20 24 (A B C D E)	25 30 35 40 50 (A B C D E)
Historial clínico (Factor principal)	Anormalidades	Cicatriz cutánea pequeña (menor a 2 cm)	Que involucra sólo estructuras cutáneas con cicatriz grande visible (≥ 2 cm) y/o pigmentación anormal.	Con algunas pérdidas en las estructuras de soporte.	Involucran la ausencia de partes anatómicas o áreas de la cara, como la pérdida de un ojo o pérdida de parte de la nariz con deformidad cosmética.	Distorsión total de la anatomía normal de la cara con desfiguración severa.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Hallazgos del examen físico (Factor modulador).	Alteración de las funciones de respirar, oír, oler y degustar. *1	Ninguna	Leve	Moderada	Severa	Muy severa
Hallazgos en las pruebas diagnósticas (Factor modulador).	Estudios radiológicos: Hallazgos en la estructura ósea o cartilaginosas faciales.	Normales	Normales	Anormales concordantes con los hallazgos del historial clínico.	Anormales concordantes con los hallazgos del historial clínico.	Anormales concordantes con los hallazgos del historial clínico.

*1 Clasificación de severidad según Tabla 4 “clasificación según porcentaje de compromiso funcional o anatómico” del numeral 6 del Título Preliminar.

6.7. Criterios para la Calificación de las Deficiencias por Cicatrices

Para la calificación se debe contar con la descripción detallada de la cicatriz en cuanto a sus dimensiones en centímetros, la forma, el color, la localización anatómica, cualquier evidencia de ulceración, depresión o elevación, si es atrófica o hipertrófica, si es blanda y flexible o endurecida, delgada o gruesa, si está adherida a los tejidos subyacentes (huesos, músculos, otros). La deficiencia **facial** se califica con la Tabla 6.2 de este capítulo.

Cuando las cicatrices corporales, incluyendo las faciales generan una alteración de la función del nervio periférico o pérdida de los rangos de movimiento de las articulaciones, se califican por separado las deficiencias por alteraciones de la piel, las deficiencias del sistema nervioso periférico y de las extremidades, valores que se deberán combinar. Si la excursión de la pared torácica está afectada, se evalúa de acuerdo con lo definido en el capítulo del sistema respiratorio y se combina con la deficiencia por alteraciones de la piel.

6.8. Criterios para la Evaluación de la Deficiencia Global por Quemaduras.

Para determinar el grado de deficiencia ocasionado por una quemadura, hay que tener en cuenta:

- Extensión:** Para cuantificar la extensión de la lesión se aplicará la "regla del nueve", donde se le asigna el 36% de la superficie corporal al tórax y dorso, el 36% a los dos miembros inferiores, el 18% a ambos miembros superiores, el 9% a la cabeza y el 1% a los genitales (masculino o femenino); este punto se evalúa de acuerdo con los criterios de la Tabla 6.3.
- Profundidad de la quemadura:** Se evalúa mediante los criterios de la Tabla 6.3.
- Compromiso de la movilidad articular:** Se evalúa en el capítulo correspondiente.
- Secuelas estéticas:** Se evaluarán por la Tabla 6.2.

Los valores obtenidos tras la calificación de los ítems entre a. y d., se combinan mediante la fórmula de valores combinados.

Tabla 6.3. Criterios para la evaluación de la deficiencia global por quemaduras

TIPO	ÁREA COMPROMETIDA	% ASIGNADO
A	Superficial o epidermis	25% del porcentaje de la extensión de la superficie corporal lesionada
AB	Epidermis y dermis	50% del porcentaje de la extensión de la superficie corporal lesionada
B	Dermis hasta aponeurosis o hueso	Igual al área afectada

*Nota: Se debe tener en cuenta las diferentes clasificaciones para calcular las quemaduras con base a (profundidad, grado, localización, extensión) según las diferentes escalas. Regla de Wallace y el cálculo de la superficie corporal quemada.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Adicionalmente, cuando se presenten dos o más áreas comprometidas de diferente tipo de profundidad, los porcentajes de cada uno de ellos se suman aritméticamente, siendo este el valor final de la deficiencia. El valor de la deficiencia obtenida en la Tabla 6.3 **no se deberá multiplicar por el 0.5**, al que hace referencia el numeral 5 del Título Preliminar del Anexo Técnico. **“Para efectos de combinación con otras deficiencias se deberá multiplicar por 2. (se combina la quemadura con la otra deficiencia y se multiplica el total de la deficiencia por dos)”**

Las lesiones superficiales que curen sin dejar cicatriz ni secuelas, no serán motivo de calificación

6.9. Procedimiento para la Calificación de las Deficiencias por Dermatitis de Contacto

La *dermatitis de contacto alérgica* corresponde a un grupo de procesos inflamatorios cutáneos, agudos o crónicos, de causa exógena, como las sustancias capaces de producir sensibilización cutánea, mediante procesos de hipersensibilidad celular cuando entran en contacto con la piel. Esta es una reacción retardada de hipersensibilidad medida por células específicas para el antígeno tipo IV.

La *dermatitis de contacto irritativa* se define como un grupo de procesos inflamatorios cutáneos no inmunoespecíficos, agudos o crónicos, de causa exógena, desencadenados por la exposición única o repetida de la piel a un irritante, físico o químico, tóxico para los queratinocitos.

Las dermatitis de contacto alérgica e irritante pueden coexistir en la misma persona y son difíciles de diferenciar en el examen físico y la histopatología. La calificación se realiza utilizando la Tabla 6.1, y se otorgará 3% de deficiencia por cambios permanentes en la inmunidad y fisiología de la piel; los valores obtenidos en la Tabla 6.1 se sumaran aritméticamente con este tres por ciento (3%).

6.10. Criterios para la Calificación de las Deficiencias por Cáncer de Piel.

Todos los cánceres de piel se califican por el capítulo de “Deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer.”

Capítulo VII

Deficiencias por Alteraciones del Sistema Hematopoyético

7.1. Objetivo. Proveer los criterios clínicos para el reconocimiento y la evaluación de las deficiencias relacionadas con el sistema hematopoyético, determinadas por la anormalidad o pérdida permanente, parcial o total de la estructura o de la función del sistema hematopoyético.

7.2. Alcance. Este capítulo incluye los criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias permanentes de las enfermedades de médula ósea, ganglios linfáticos y bazo, los cuales producen una población heterogénea de células circulantes en sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) y una compleja familia de proteínas esenciales para la coagulación de la sangre y la defensa inmunológica.

Debido a que el sistema hematopoyético apoya a otras células u órganos del cuerpo, es preciso identificar los efectos sobre estos órganos derivados de una enfermedad hematológica, en cuyo caso se asigna directamente la deficiencia a los efectos hematológicos de la enfermedad o cáncer en la función final de los órganos afectados en el capítulo y tabla respectiva, y se combinan estas deficiencias.

Para aumentar la confianza de la evaluación de la deficiencia hematopoyética y permitir valoraciones comparables con las deficiencias de otros órganos o sistemas, se adoptan, en particular, las siguientes consideraciones:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- a. Debido a que existe una participación inevitable de otros sistemas orgánicos u otros procesos hematológicos, estos deben ser identificados, valorados, clasificados y combinados aplicando la fórmula o tabla de valores combinados.
- b. Se deberán adicionar puntos porcentuales por la Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT) .

Si bien el tratamiento de enfermedades hematopoyéticas a menudo conduce a una disminución de los síntomas y/o signos de la enfermedad, los efectos secundarios, tanto locales como sistémicos, pueden ser considerables. Ocurre con frecuencia por el uso de medicamentos, procedimientos o tratamientos tales como corticosteroides, terapia anticoagulante, transfusiones, hemoforesis y quimioterapia, tanto oral como intravenosa. La Tabla 7.1 de Carga de Adherencia al Tratamiento para el sistema hematopoyético, otorga los puntos de deficiencia de la CAT, los cuales se sumarán a la deficiencia obtenida en cada tabla de evaluación del sistema hematopoyético.

Tabla 7.1. Carga de Adherencia al tratamiento para el sistema hematopoyético (CAT)

Intervención ^{*1}	Valor porcentual asignado a la deficiencia
Terapia permanente con anticoagulante	5%
Corticosteroides por vía oral permanente	Hasta el 3%
Terapia permanente con otros inmunosupresores	Hasta el 3%
La quelación del hierro o de otras terapias sistémicas	Hasta el 3%
Quimioterapia oral permanente	Hasta el 5%
La quimioterapia intravenosa; por ciclo recibido en los últimos 6 meses. ^{*2}	1%
Radioterapia: por semana dada en los últimos 6 meses. ^{*2}	1%
Transfusiones: por unidad por mes ^{*2}	1%
Flebotomía: por tratamiento por mes ^{*2}	1%
Aféresis: por tratamiento por mes ^{*2}	3%
Trasplante de médula ósea fallido o no	10%

^{*1}El criterio para asignar estos valores corresponde al descrito en el numeral 8.4 y las Tablas 8.1 y 8.2 del capítulo de deficiencia por alteraciones del sistema endocrino.

^{*2} Hasta un máximo de un 6%

El tratamiento con anticoagulante puede controlar completamente los signos o síntomas de la enfermedad, aunque puede continuar con cierto grado de riesgo; a estas personas se les asigna un 5% de deficiencia adicional.

7.3. Definiciones y Principios de Evaluación. Los porcentajes de deficiencia reflejan la gravedad de los síntomas, de los hallazgos a la valoración física, de las pruebas objetivas (laboratorio) y de las limitaciones funcionales producidas por una enfermedad hematopoyética.

Los procedimientos auxiliares que diagnostican un deficiencia hematopoyética incluyen, entre otros:

- 1) Recuento hemático completo
- 2) Examen de la extensión de sangre periférica;
- 3) Aspiración de la médula ósea y biopsia;
- 4) Electroforesis de la hemoglobina;
- 5) Pruebas de antiglobulina directa e indirecta;
- 6) Prueba de crioaglutinina;
- 7) Citogenética de sangre periférica y/o médula ósea;
- 8) Análisis inmunoquímico de inmunoglobulinas
- 9) Biopsia de bola de Bichat y tinción con rojo Congo; y
- 10) Estudios hemostáticos.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

7.3.1. Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño. Los criterios que se deben contemplar para la evaluación de la deficiencia derivada de las enfermedades del sistema hematopoyético, son el historial clínico y los hallazgos de laboratorio:

Criterio 1. Historial clínico (verificar en cada tabla si es factor principal o modulador); A causa de la diversidad morfológica y funcional de este sistema, se contemplan diferentes criterios en relación con el historial clínico; así, se estipulan criterios para anemia, trastornos mieloproliferativos (incluyendo policitemia, mielofibrosis y trombocitosis esencial), anormalidades de los leucocitos, monocitos y macrófagos, síndromes mielodisplásicos (granulocitos), trastornos debidos a inmunodeficiencia (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), trastornos del bazo y la esplenectomía, trastornos hemorrágicos y de las plaquetas, para las deficiencias permanentes causadas por trastornos de las plaquetas, para las deficiencias por trastornos de la coagulación y la enfermedad de Von Willebrand y finalmente, para trastornos trombóticos (hereditarios y adquiridos).

Criterio 2. Hallazgos de laboratorio (verificar en cada tabla si es factor principal o modulador); A causa de la diversidad morfológica y funcional de este sistema, se contemplan diferentes criterios en relación con las pruebas objetivas; así, se estipulan criterios para anemia, anormalidades de los leucocitos, trastornos debidos a inmunodeficiencia (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), trastornos hemorrágicos y de las plaquetas, para las deficiencias por trastornos de la coagulación y la enfermedad de Von Willebrand, y para trastornos trombóticos (hereditarios y adquiridos). Para efectos de la calificación, los exámenes de laboratorio de este capítulo deben ser realizados los últimos tres meses previos a la calificación.

Para anemia: Valores de hematocrito dados en concentración de gramos por decilitro.

Para enfermedades o anormalidades de los leucocitos: Cuadro hemático, referenciado en número de leucocitos y neutrófilos por mm^3 de sangre.

Para trastornos debidos a inmunodeficiencia (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida): Niveles de CD4 T.

Para trastornos hemorrágicos y de las plaquetas: Recuento de plaquetas.

Para las deficiencias por trastornos de la coagulación los niveles de factor IX.

Para la Enfermedad de Von Willebrand Los niveles de factor VIII.

Para trastornos trombóticos (hereditarios y adquiridos):

- a. Factor de coagulación.
- b. Estado de hipercoagulabilidad: Déficit del factor V de Leiden.
- c. Niveles de proteína C o S.
- d. Anticoagulante lúpico.
- e. Anticuerpos anticardiolipina.

7.4. Procedimientos para Calificar las Deficiencias del Sistema Hematopoyético.

7.4.1. Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia: Para la anemia y la mielofibrosis, el grado de deficiencia se relaciona con la severidad y la necesidad de transfusión. La deficiencia adicional de un órgano sistémico causado por la anemia debe combinarse mediante la fórmula o tabla respectiva.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Un porcentaje de deficiencia adicional del uno por ciento (1%) se otorga con el fin de reflejar la CAT por cada unidad de sangre transferida al mes, es decir, un número determinado de puntos por un número determinado de unidades necesitadas al mes. Por ejemplo, si la persona requirió dos unidades al mes, se asignan dos puntos. Como se observó previamente, debido a que el grado en el cual las personas requieren de transfusiones es por lo general independiente de sus enfermedades o de la severidad de los síntomas, es apropiado agregar la CAT para las transfusiones a la clase de deficiencia evaluada en estas situaciones en el momento de aplicar la tabla. Para efectos de la calificación, el CAT se aplica una vez el paciente ha llegado a la Mejoría Médica Máxima o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

Los criterios para la clasificación de la deficiencia por anemia se relacionan en la Tabla 7.2. Debido a que existen solo dos factores relevantes en la clasificación, cada clase en la tabla de deficiencia se divide solamente en tres grados. El historial clínico es el factor principal.

Tabla 7.2. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por anemia.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	5% -al 15%	20% al 40%	45% al 65%	70% al 90%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		5 10 15 (A B C)	20 30 40 (A B C)	45 55 65 (A B C)	70 80 90 (A B C)
Historial clínico(factor principal) ^(b)	Historia de anemia resuelta. No requiere tratamiento	Historia de anemia crónica; con signos y síntomas ocasionales. Requiere de tratamiento médico. y No requiere de transfusiones	Historia de anemia crónica con síntomas frecuentes y Requiere transfusiones ocasionales	Historia de anemia crónica con síntomas continuos y presenta exacerbaciones y Requiere transfusión de 2 a 3 unidades cada 4 semanas	Historia de anemia crónica con síntomas continuos y presenta exacerbaciones y Requiere transfusiones de 2 o 3 unidades cada 2 semanas
Hallazgos de laboratorio ^(c)	Hemoglobina y hematocrito normales	Hemoglobina ≥ 10 pero < 12 g /dl	Hemoglobina > 8 pero < 10 g /dl	Hemoglobina ≥ 6 pero < 8 g /dl	Hemoglobina < 6 g /dl

^{a)} El mayor nivel de deficiencia (90%) se utiliza cuando cumplen con los dos criterios del historial clínico y el nivel de hemoglobina < 6 g/dl. De lo contrario, si se cumplen sólo un criterio del historial clínico y el nivel de hemoglobina o los dos del historial clínico, la calificación será de 80%.

^{b)} **Factor principal.** El grado y el alcance de los síntomas derivados de otros órganos comprometidos, implica valoraciones de deficiencia o de deficiencias adicionales que se combinarán con la deficiencia derivada de la anemia. Al valor final de deficiencia, se añaden los puntos de CAT por unidad de sangre transfundida / mes.

^{c)} El nivel de hemoglobina puede variar si se requieren transfusiones. El número utilizado como base para la calificación debe ser el nivel promedio de hemoglobina entre el valor inmediatamente antes y el valor inmediatamente después de la transfusión.

En trastornos mieloproliferativos, como la policitemia, la mielofibrosis y la trombocitosis esencial, la policitemia vera se manifiesta por valores de hematocrito por encima del cincuenta y dos por ciento (52%) en varones y el cuarenta y nueve por ciento (49%) en mujeres y por volúmenes de eritrocitos mayores de 0.036 L/kg (36 ml/kg) en varones y 0.032 L/kg (32 ml/kg) en mujeres. Si la causa principal de la eritrocitosis es tratada y se corrige, no debe haber deficiencia permanente. La flebotomía minimiza los síntomas en todas las formas de policitemia hasta llevar a un nivel normal de hematocrito. Esta condición puede conllevar a otras deficiencias de sistemas orgánicos tales como oclusiones cerebrovasculares o cardiovasculares. Estas deficiencias deben valorarse de acuerdo con las tablas específicas para luego aplicar la fórmula o tabla de valores combinados de deficiencias.

7.4.2. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos mieloproliferativos (policitemia, mielofibrosis o trombocitosis esencial)

La policitemia puede producir daños por oclusión vascular en algunos órganos, especialmente en los sistemas cardiovascular y/o cerebrovascular. De manera similar, la obstrucción vascular del sistema de la vena porta puede producir una lesión del hígado.

No existe una clasificación de deficiencia específica para la policitemia, razón por la cual deben emplearse los capítulos o tablas de deficiencias específicas según el órgano terminal afectado, además del grado de la

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Lesión que se adiciona en las clases de deficiencia específica para la flebotomía o la quimioterapia (se aplica la tabla 7.1 CAT, en caso de ser utilizadas para el control de la enfermedad).

Igualmente, no existe una clasificación definida para la trombocitosis esencial aunque en ciertas ocasiones, cuando se desarrollan los síntomas, la clasificación debe basarse en el sistema orgánico afectado o se asigne la clase específica por eventos hemorrágicos o trombóticos que se presentan.

Los criterios para el diagnóstico de la mielofibrosis de etiología primaria (idiopática) o secundaria (postpolicitemia) incluyen: la anemia progresiva. El nivel de deficiencia causado por mielofibrosis se refleja en el nivel de deficiencia causado por anemia y/o neutropenia. La deficiencia primaria se clasifica primero y luego se aplica la tabla o la fórmula combinada de deficiencia obtenida en otras líneas celulares.

7.4.3. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por enfermedades o anormalidades de los leucocito.

La función principal de los glóbulos blancos (leucocitos) es proporcionar protección contra microorganismos invasores, proteínas extrañas y otras sustancias. Se consideran tres ‘familias’ de leucocitos diferentes: los granulocitos, los linfocitos y los monocitos-macrófagos, que interactúan para ofrecer esta protección. Las anormalidades de los leucocitos se expresan, tanto en cantidades como en alteraciones funcionales.

Los linfocitos proporcionan mecanismos de defensa humoral y celular. Las anormalidades de los linfocitos están relacionadas con tres formas de transformación neoplásica: 1) Leucemias —incluyen la leucemia linfática crónica, la leucemia linfática aguda y la leucemia de células pilosas—; 2) Linfomas —incluyen la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no-Hodgkin y la micosis fungoide—; y 3) Mieloma y macroglobulinemia múltiple. Todas estas condiciones se valoran en el capítulo de neoplasias.

En los síndromes mielodisplásicos, la afectación y progresión de la línea celular (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) es variable; según la línea celular afectada, debe remitirse a las deficiencias causadas por anemia, granulocitopenia y trombocitopenia. Cuando estas líneas celulares se involucran en una progresión de transformación leucémica, se procede a calificar el déficit respectivo según el protocolo de neoplasias. La evaluación de la deficiencia mielodisplásica se basa en el grado de alteración del componente individual y en sus efectos en otros sistemas u órganos.

Las infecciones reflejan una deficiente función de los granulocitos (neutrófilos, basófilos o eosinófilos); éstas pueden variar desde infecciones localizadas y auto-limitadas, como la furunculosis, hasta infecciones sistémicas como la septicemia recurrente. La clase, la frecuencia y la severidad de las infecciones recurrentes son la base para la evaluación de la deficiencia. Dos formas diferentes de anormalidades cuantitativas de los granulocitos son la granulocitopenia y la leucemia (esta última se valora en el capítulo correspondiente a las neoplasias); la infección define la deficiencia.

Así, la Tabla 7.3 se emplea para la clasificación de las deficiencias ocasionadas por alteración de los leucocitos. Los hallazgos de laboratorio son el factor principal.

Tabla 7.3. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por alteración de los leucocitos (neutropenia).

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 (a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA (%)	0	1% -al 9%	15% al 25%	30% al 50%	60% al 80%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 5 9 (A B C)	15 20 25 (A B C)	30 40 50 (A B C)	60 70 80 (A B C)
Historial clínico	No requiere tratamiento	Requiere ocasionalmente de antibióticos para infecciones bacterianas	Requiere de antibióticos intermitentes* para prevenir las infecciones bacterianas agudas	Requiere de antibióticos orales en forma intermitente* y crónica con infección bacteriana aguda que requiere	Requiere de antibióticos orales en forma intermitente* y crónica con infección bacteriana aguda que requiere hospitalizaciones por lo menos dos veces al año

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

				hospitalización, por lo menos una al año.	o Requiere de antibióticos intravenosos domiciliarios ^{b)}
Hallazgos de Laboratorio (factor principal) ^(c)	Recuento neutrófilos > 1000	Recuento de neutrófilos > 750 y ≤ 1000	Recuento de neutrófilos > 500 y ≤ 750	Recuento de neutrófilos > 250 y ≤ 500	Recuento de neutrófilos < 250

a) Si ambas condiciones están presentes, se debe utilizar el valor mayor de las puntuaciones.
b) Si la persona reúne los dos criterios del historial clínico y el recuento de neutrófilos es <250, se asigna la más alta calificación.
c) **Factor principal.** Si el recuento de neutrófilos es sensible a los factores inmunoestimulantes, se utiliza el promedio de los recuentos antes y después del tratamiento. Si la persona tiene una enfermedad cíclica, utiliza el doble del conteo, partiendo desde el punto más bajo del recuento de los neutrófilos.
* Intermitente: se refiere al uso de medicación sólo durante los períodos de recaída de la patología.

7.4.4. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos debidos a Inmunodeficiencia - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

La infección con VIH crea un proceso patológico progresivo y finalmente fatal con un tratamiento complejo y grados predominantemente variables de la deficiencia funcional. Este virus destruye directamente los linfocitos CD4 T occasionando una deficiencia de la respuesta inmunológica normal contra las infecciones y los procesos neoplásicos. El riesgo de desarrollar una infección oportunista es, en general, inversamente proporcional al recuento absoluto de CD4 T.

La deficiencia por infección del VIH es causada por afección monosistémica o multisistémica de una infección por VIH primaria o por la infección oportunista o por el proceso neoplásico de la disfunción inmunológica. Cada sistema orgánico puede estar comprometido: hematopoyético, pulmonar, gastrointestinal, neurológico, dermatológico y renal. Por lo general, al comprometer varios sistemas simultáneamente, se determina la deficiencia utilizando las tablas específicas, según el órgano afectado, para luego aplicar la fórmula de valores combinados.

No se debe clasificar la enfermedad por VIH utilizando alguna de las tablas hematopoyéticas estándar. Se deben utilizar hallazgos de laboratorio que son el *factor principal*. El historial clínico representará el *factor modulador*. Para esto se utiliza la Tabla 7.4. **Tabla 7.4. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida - SIDA.**

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	15% -al 35%	40% al 60%	65% -al75%	80% al100%
GRADO DE SEVERIDAD (%)	15 25 35 (A B C)	40 50 60 (A B C)	65 70 75 (A B C)	80 90 100 (A B C)	
Historial clínico	No requiere tratamiento	Requiere tratamiento con antirretrovirales para controlar los signos y síntomas de la enfermedad	Requiere tratamiento con antirretrovirales y terapia médica continua para prevenir infecciones oportunistas. Historia de infecciones	Requiere terapia constante con antirretrovirales e inmunoterapia supresora permanente con al menos una infección por agentes oportunistas	Requiere terapia constante con antirretrovirales e inmunoterapia supresora permanente con al menos dos infecciones por oportunistas y/o Ha requerido una hospitalización para manejo de infección por oportunista
Hallazgos de laboratorio (factor principal) ^(b)	CD4 > 800 o PCR< 50	CD4 > 500 y ≤ 800 o PCR >50	CD4 > 200 y ≤ 500	CD4 >100 y ≤ 200	CD4 ≤ 100

a) La puntuación se asigna inicialmente por el recuento de CD4, se ajusta a un valor mayor en la Clase 4, literal b, si los criterios de historial clínico y clase funcional son de la Clase 4.

b) **Factor principal:** Recuento CD4 o Reacción en Cadena de la Polimerasa para el virus (PCR-HIV).

Para el caso de personas con infecciones oportunistas documentadas, se califica luego de recibido el tratamiento específico, en el caso de no mejorar su infección en los 6 meses siguientes al inicio del tratamiento se califica. En cualquiera de los anteriores casos se califica luego de actualizar el laboratorio.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

7.4.5. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por alteración de los monocitos – macrófagos.

Existe una limitación del conocimiento acerca de los defectos funcionales del sistema monocito-macrófago. El grado de deficiencia puede estar relacionado con la naturaleza, tipo y magnitud de la infección. De igual forma, la afectación medular puede producir deficiencias y fracturas óseas progresivas y masivas, las cuales deben ser valoradas en el sistema músculo-esquelético. Se procede de la misma forma para valorar la afección neurológica.

7.4.6. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos del bazo y la esplenectomía.

Como consecuencia de la esplenectomía se pueden desarrollar algunos trastornos funcionales mínimos o leves, aunque clínicamente silentes y morfológicos de los eritrocitos, así como un aumento transitorio del recuento plaquetario. Las personas con esplenectomía no se encuentran en un alto riesgo de contraer infecciones virales. Si una persona experimenta infecciones repetidas luego de una esplenectomía, se debe asignar una clasificación de deficiencia del 10% y ésta se adiciona a la deficiencia obtenida por alteración hematológica. De otro modo, al no presentarse infecciones repetidas, la deficiencia correspondiente será del 0%. La esplenomegalia mayor a 5 cm por debajo del margen costal es un factor incómodo y generalmente afecta la capacidad de alimentarse al causar sensación de llenura temprana; en tal caso se asigna una deficiencia del 10% la cual se agrega a la deficiencia hematológica.

7.4.7. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos hemorrágicos hereditarios.

Los trastornos hemorrágicos comprenden los relacionados con la coagulación y los debidos a alteraciones de las plaquetas. Las personas con trastornos hereditarios de la coagulación sanguínea pueden requerir de una terapia profiláctica como ayuda para realizar actividades que impliquen traumas. La enfermedad de Von Willebrand es de frecuencia leve: la hemorragia ocurre sólo después de eventos traumáticos o cirugías y no afecta significativamente las funciones como para justificar una clasificación de deficiencia. Sin embargo, algunas personas con dicha condición reúnen criterios por hemorragias recurrentes, lo que hace que presente algún grado de deficiencia.

Algunos trastornos hemorrágicos heredados pueden causar complicaciones tales como disfunción articular por hemorragia recurrente. La deficiencia causada por esta complicación se evalúa mediante los criterios señalados en el capítulo de las extremidades superiores e inferiores. Si se encuentran afectados varios sistemas orgánicos, los porcentajes de la deficiencia total de la persona se deben combinar mediante la fórmula o tabla de valores combinados de deficiencias.

7.4.8. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos de las plaquetas: Es la segunda causa de los trastornos hemorrágicos. La trombocitopenia no se clasifica como deficiencia a menos que sea severa, afecte las funciones de otros órganos y sea irreversible por esplenectomía u otros regímenes terapéuticos. Por su parte, los defectos plaquetarios cualitativos rara vez cumplen con los criterios para asignar un porcentaje de deficiencia, a menos que exista una hemorragia, la que puede suceder en algunos trastornos congénitos raros. Las complicaciones se evalúan de acuerdo con los sistemas u órganos afectados y se deben combinar con el porcentaje obtenido por deficiencia, de acuerdo con las tablas específicas y empleando la fórmula de valores combinados de deficiencias. Los criterios de deficiencia para los trastornos plaquetarios se indican en la Tabla 7.5. Como *factor principal* se asume el historial clínico.

Tabla 7.5. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias relacionada con trastornos de las plaquetas.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 ^(a)
----------------------	---------	---------	---------	---------	------------------------

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 5%	7% al 15%	25% al 35%	45% al 65%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 3 5 (A B C)	7 11 15 (A B C)	25 30 35 (A B C)	45 55 65 (A B C)
Historial clínico (factor principal) ^(b)	Trombocitopenia leve o trastornos hemorrágicos que no requieren tratamiento	Requiere de tratamiento por exacerbaciones agudas de trombocitopenia	Requiere de tratamiento para trombocitopenia posterior a trauma o antes de cirugías	Trombocitopenia severa que requiere tratamiento con transfusiones de plaquetas que responden a la terapia y/o ha presentado eventos hemorrágicos (hasta 2 veces al año)	Trombocitopenia muy severa que no responde a transfusiones de plaquetas y/o ha presentado 3 o más eventos hemorrágicos por año
Recuento de plaquetas	Más de 140.000 / ml	Entre 100.000 y 140.000 / ml	Entre 60.000 y 100.000 / ml	Entre 20.000 y 60.000 / ml	Menos de 20.000 / ml

a) Se utiliza el mayor valor, que corresponde a la clase 4, literal C. si la persona cumple con ambos criterios (en lugar de 1) del historial clínico de esta clase, así como el criterio de recuento de plaquetas.

b) **Factor principal:** Se basa en el número promedio de eventos hemorrágicos antes de 3 años —si está documentado clínicamente—; de lo contrario, se consideran los del año inmediatamente anterior.

7.4.9. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos de la coagulación: Los déficits congénitos de la coagulación se deben generalmente a deficiencias en los factores VIII ó IX o a la enfermedad de Von Willebrand. Los niveles de factor determinan el grado de deficiencia dentro de la clase asignada. Aunque existen otros trastornos hemorrágicos, en éstos la deficiencia es ocasionada principalmente por la significativa frecuencia de los episodios hemorrágicos. Cualquier anormalidad fisiológica que se desarrolle como consecuencia de estos episodios debe clasificarse por separado y debe combinarse con la deficiencia por trastorno hemorrágico.

La hemofilia se divide típicamente en tres categorías de acuerdo con el grado de factor de deficiencia. Esto se correlaciona apropiadamente con la frecuencia y riesgo de las complicaciones hemorrágicas. Las personas que presentan hemofilia leve no suelen sangrar espontáneamente pero sí requieren ser premedicados antes de procedimientos quirúrgicos; pueden responder a la desmopresina (DDAVP) la que incrementará transitoriamente los niveles del factor VIII. Aquellas personas que no responden a este medicamento, así como quienes presentan niveles bajos de factor de coagulación, requieren de infusiones de factor coagulación, por lo general auto administrados. Estos factores algunas veces se administran de manera permanente o crónica a personas con niveles de factor coagulación por debajo del 1%, como profilaxis contra la hemorragia. Las personas con hemofilia pueden desarrollar anticuerpos contra el factor de administración exógena, lo que comporta una complicación terapéutica que dificulta el tratamiento de los episodios hemorrágicos; a estas personas a veces se les prescribe el factor crónico y/o una terapia inmunosupresiva.

Existe también variación en la frecuencia de los episodios hemorrágicos entre personas con niveles similares de factor de deficiencia. La Tabla 7.6 se debe manejar con el fin de clasificar la deficiencia causada por hemofilias. Los antecedentes clínicos son el *factor principal*. La deficiencia ocasionada por hemartrosis se clasifica separadamente y se combina con la deficiencia por hemofilia.

Tabla 7.6. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias relacionadas con la hemofilia.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3 (b)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	20% al 30%	45% al 65%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 5 9 (A B C)	20 25 30 (A B C)	45 55 65 (A B C)
Historial clínico (factor principal) (a)	No requiere de tratamiento	Requiere de tratamiento con vasopresina (DDAVP), crioprecipitados o uso de plasma después de trauma o antes de una cirugía	Historia de ≤ 2 episodios hemorrágicos durante un año	Historia de más de 3 episodios hemorrágicos por año

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tratamientos requeridos	Trastornos leves de la coagulación que no requieren tratamiento	El tratamiento con factor de coagulación es necesario después de hemorragias o trauma	Requiere de tratamiento permanente con factor de coagulación	Requiere de tratamiento permanente con concentrado de factor de coagulación en combinación con anticuerpos y/o transfusiones de glóbulos rojos por los episodios agudos
Factor de coagulación	Normal	Leve: nivel de factor coagulación entre 5% y 30%	Moderado: nivel de factor de coagulación entre 1% y 5%	Severo: nivel de factor de coagulación menor del 1%

a) Basada en el número promedio de eventos dentro de los últimos tres años - si está documentado - de lo contrario se tiene en cuenta el año inmediatamente anterior.

b) Se asigna el mayor valor correspondiente la clase 3, literal C. si cumple con todos los criterios para esta clase y se asigna el valor correspondiente a la clase 3, literal B si cumple con los otros criterios que no sea el factor principal.

7.4.10. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por otros trastornos hemorrágicos (enfermedad de Von Willebrand): Se trata de un grupo heterogéneo de trastornos hemorrágicos causados por una anomalía del factor Von Willebrand; los afectados son susceptibles de sufrir hematomas, sangrado menstrual abundante y aumento de la frecuencia de epistaxis. Las personas con la enfermedad de Von Willebrand pueden experimentar hemorragia letal posttraumática o postoperatoria; si la enfermedad es severa, pueden presentar episodios hemorrágicos frecuentes (*factor principal*)

Aunque existen varios trastornos hemorrágicos adicionales (Tabla 7.7), tal como en el caso de la enfermedad de Von Willebrand, la determinación de la deficiencia se basa en la frecuencia y severidad de los episodios hemorrágicos (*factor principal*) y la necesidad de productos sanguíneos, los cuales varían según las personas.

Se debe determinar el grado de deficiencia de la misma manera para cada uno de los sistemas u órganos que estén comprometidos por los episodios hemorrágicos. Luego se combinan las diferentes deficiencias aplicando la fórmula o tabla de valores combinados de deficiencias.

Tabla 7.7. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por otros trastornos hemorrágicos (enfermedad de Von Willebrand).

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4 (a) (c)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	15% al 25%	35% al 45%	55% al 65%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		15 9 (A B C)	15 20 25 (A B C)	35 40 45 (A B C)	55 65 (A B)
Frecuencia de eventos hemorrágicos (factor principal) ^(b)	Historia de sangrado anormal; resuelta ya	Historia de sangrado crónico de las mucosas y/o hemorragias menstruales abundantes y/o sangrado de las mucosas en el año anterior que no requirió hospitalización	Historia de sangrado de las mucosas que requirió manejo hospitalario en el último año	Historia de 2 o más hemorragias en las mucosas que requirieron manejo hospitalario en el último año	Historia de 3 o más hemorragias en las mucosas, que requirieron manejo hospitalario en el último año. Al menos uno de estos sangrados generó riesgo.
Tratamientos requeridos	No requiere tratamiento	Fue necesario un tratamiento menor (hemostasis, terapia con hierro o se premedicó para procedimientos)	Requiere factor de sustitución y/ o agente hemostático	Requiere de transfusiones de menos de 2 unidades de glóbulos rojos, con o sin reposición del factor o agente antihemorrágico	Requiere de transfusiones de 2 ó más unidades de glóbulos rojos, con o sin reposición del factor o agente antihemorrágico

a) Los trastornos residuales del SNC se valoran en el capítulo de deficiencia correspondiente.

b) **Factor Principal:** basado en el número promedio de eventos en los tres años anteriores - si está documentado - de lo contrario durante el año inmediatamente anterior.

c) Se da el valor máximo de la clase 4, es decir el 65% si reúne los dos criterios de esta clase, y se asigna el menor valor, es decir el 55% si reúne solamente con el factor principal.

7.4.11. Procedimiento específico para la calificación de las deficiencias por trastornos trombóticos.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los trastornos trombóticos comprometen las arterias, las venas o ambas. La trombosis puede ser primaria, a causa de un trastorno hereditario, o secundaria, debido a condiciones adquiridas. Mientras que cada factor de riesgo puede contribuir a la trombosis, los factores combinados pueden conllevar a un riesgo mayor. La deficiencia es evaluada referida al trastorno trombótico en sí y a los efectos de las trombosis que han ocurrido en un órgano particular afectado. Este debe valorarse en las tablas respectivas y luego combinarlas.

Si la persona se encuentra bajo una terapia anticoagulante a largo plazo por trastorno trombótico, con warfarina, heparina de peso molecular bajo o heparina, u otro análogo se adiciona un diez por ciento (10%) a la deficiencia total obtenida.

La deficiencia total de la persona con trastornos trombóticos se relaciona en la Tabla 7.8. La frecuencia de los episodios trombóticos es el *factor principal*.

Tabla 7.8. Criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por trastornos trombóticos.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3 ^(a)
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	1% al 9%	15% al 25%	35% al 40%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 5 9 (A B C)	15 20 25 (A B C)	35 40 (A B)
Frecuencia de eventos trombóticos(factor principal) ^(b)	Antecedentes de trombosis; ya resuelta	Historia de un episodio de trombosis	Más de 1 evento trombótico en el pasado; ninguno en el año anterior	Uno o más eventos trombóticos por año
Estado de hipercoagulabilidad ^(c)	Anormalidades de menor importancia que no se espera como resultado un estado de hipercoagulabilidad	Déficit del factor V de Leiden, Heterocigoto ó anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o antifosfolípos Ú otros estado de hipercoagulabilidad	Los niveles de proteína C o S <35% de lo normal ó Déficit de antitrombina 3 ó Déficit del factor V de Leiden, Homocigoto ó anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o antifosfolípos ó otros estado de hipercoagulabilidad	Dos de los siguientes: proteína C o S <35% de lo normal y/ó Déficit del factor V de Leiden, Homocigoto y/ó anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o antifosfolípos y/ó otros estado de hipercoagulabilidad

^{a)} Utilice el 40% si la persona cumple los criterios para la clase 3, el 35% si la persona cumple solamente el factor principal.
^{b)} **Factor Principal.** Supone “en riesgo” que la persona está recibiendo tratamiento anticoagulante adecuado o la terapia anticoagulante no puede ser tolerada debido a efectos secundarios significativos o el tratamiento anticoagulante se ha negado.
^{c)} Si la información clínica no está disponible, por defecto la calificación se determina por el valor medio de la clase.

Capítulo VIII

Deficiencia por Alteraciones del Sistema Endocrino

8.1. Objetivo. Proveer los criterios clínicos para el reconocimiento y la evaluación de las deficiencias relacionadas con el complejo hipotálamo-pituitario, la tiroides, la paratiroides y las glándulas suprarrenales, el tejido celular de los islotes del páncreas y las gónadas.

8.2. Alcance. Este capítulo incluye las definiciones y procedimientos para la calificación de las deficiencias permanentes de las enfermedades que afectan al sistema endocrino.

El hipotálamo secreta diferentes hormonas que estimulan la hipófisis; algunas desencadenan la emisión de hormonas hipofisarias y otras la suprime. A veces, la hipófisis coordina funciones de las demás glándulas endocrinas. Algunas hormonas hipofisarias tienen efectos directos, mientras que otras solamente controlan la velocidad con la que diversos órganos endocrinos secretan sus hormonas. La hipófisis regula la tasa de secreción de sus propias hormonas a través de un mecanismo conocido como “retroalimentación”: los valores de estas hormonas en la sangre indican a la hipófisis si debe disminuir o aumentar la producción.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

No todas las glándulas endocrinas están bajo el control de la hipófisis; algunas responden de forma directa o indirecta a concentraciones de sustancias en la sangre:

Las células del páncreas que secretan insulina responden a los niveles de glucosa y a los ácidos grasos.

Las células de la glándula paratiroides responden a los niveles de calcio y a los niveles de fosfatos.

La secreción de la médula suprarrenal (parte de la glándula suprarrenal) es producto de la estimulación directa del sistema nervioso parasimpático.

La disfunción de un órgano endocrino puede derivarse de lesiones en la glándula, atrofia, hiperplasia, hipertrofia o neoplasia, o ser el resultado de una disfunción parcial o total de la glándula, como consecuencia de una resección quirúrgica, por radiación o por medicación.

Las deficiencias endocrinas pueden generar o estar asociadas con deficiencia de otros sistemas u órganos. En estos casos, la deficiencia se evalúa por separado según el órgano comprometido y se debe aplicar la fórmula de valores combinados de deficiencias (numeral 6° del Título Preliminar).

Se excluyen de este capítulo las patologías neoplásicas y los órganos que se vean afectados por el compromiso endocrino. Dichas deficiencias deben ser valoradas en los capítulos correspondientes, aplicando la fórmula o tabla de valores combinados.

8.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

8.3.1. Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño: Los criterios a considerar en la evaluación de la deficiencia derivada de las enfermedades del sistema endocrino son la historia clínica y los resultados de las pruebas objetivas:

Criterio 1. Historial clínico (Factor principal): A causa de la variedad de órganos y funciones de este sistema, se contemplan diferentes criterios en relación con el historial clínico; a continuación se estipulan los criterios para trastornos del eje hipotálámico-pituitario (HPA) y para enfermedades de la tiroides, las glándulas paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, las gónadas, las glándulas mamarias, así como para la diabetes mellitus (tipos 1 y 2) y la enfermedad metabólica ósea, para evaluarlos se tienen en cuenta: secuelas y tratamiento, síntomas residuales, examen del órgano, clasificación de la patología, tolerancia a la glucosa, entre otras.

Criterio 2. Hallazgos de laboratorio (Factor modulador): A causa de la diversidad morfológica y funcional de este sistema, se contemplan diferentes criterios en relación con las pruebas objetivas; así, se determinan criterios para trastornos del eje hipotálámico-pituitario (HPA), enfermedades de la tiroides, las glándulas paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, las gónadas, así como para diabetes mellitus y enfermedad metabólica ósea, para evaluarlos se tienen en cuenta: niveles de las hormonas, sensitometría, hemoglobina glicosilada (HbA_{1c}), entre otras. Para ello se debe hacer uso de las pruebas objetivas o estudios clínicos actualizados en los últimos tres (3) meses de la MMM o a la fecha de la calificación.

8.4. Procedimientos Generales para la Calificación de las Deficiencias del Sistema Endocrino.

8.4.1. Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia: Se sigue el procedimiento estándar mencionado en el numeral 6° del Título Preliminar.

8.4.2. Carga de Adherencia al Tratamiento (CAT)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Las tablas que contienen la CAT, en adición al historial clínico y como un *factor modulador*, sirven para establecer el *grado (%)* dentro de cada *clase*. Esto incluye:

- a) Los procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno endocrino, según la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos;
- b) las modificaciones en la dieta;
- c) los procedimientos de monitoreo necesarios para hacer seguimiento a los niveles de glicemia.

A veces, la situación más grave de un trastorno endocrino aumenta las probabilidades de que la enfermedad afecte o agrave la deficiencia de otros sistemas u órganos. Estas consecuencias secundarias deben ser valoradas en el capítulo correspondiente al órgano o el sistema afectado.

Puesto que la Mejoría Médica Máxima – MMM, para el control de enfermedades como la diabetes, requiere que las personas se adhieran a un estricto régimen dietario, a la medicación oral y/o parenteral y/o tópica, así como a controles (monitoreos) sanguíneos periódicos, se debe ajustar el *grado de deficiencia* a un valor o menor valor dentro de la *clase* según el puntaje obtenido por la Carga de Adherencia al Tratamiento. Así, en este capítulo se otorgará mayor nivel de detalle de la Carga de Adherencia al Tratamiento, en relación con lo visto en otros capítulos, de acuerdo con las siguientes reglas:

- a. **Uso y vía de administración de los medicamentos:** La Carga de Adherencia al Tratamiento evalúa la frecuencia de uso y la vía de administración de los medicamentos mediante la asignación de un número de puntos. Se debe determinar la vía de administración de los medicamentos y seleccionar la Tabla 8.1 cuando esta administración es vía enteral (oral, nasal, rectal, conjuntival) y tópica; se selecciona la Tabla 8.2 cuando la vía de administración es parenteral. En caso de haber más de un (1) medicamento para ambas vías de administración, se asignarán los puntos respectivos por el medicamento de mayor frecuencia de dosificación por cada una de las vías de administración. Por último, se totalizan los puntos asignados según las Tablas 8.1 y 8.2, obteniendo la puntuación total dada por el uso de medicamentos.

Tabla 8.1. Puntuación según frecuencia de uso de medicamentos vía enteral (oral, nasal, rectal, conjuntival) y tópica.

Frecuencia de dosificación	Puntos
Grado I: Ocasional, no diaria	1
Grado II: 1-2 veces por día	2
Grado III: > de 2 veces por día	3

Tabla 8.2. Puntuación según frecuencia de uso de medicamentos parenterales.

Frecuencia de dosificación	Puntos
Grado I: Una vez o menos por semana	2
Grado II: > una vez por semana pero inferior a una vez al día	3
Grado III: 1-2 veces por día	4
Grado IV: > de 2 veces por día	5

- b. **Modificación de la dieta:** En cuanto a las modificaciones nutricionales, la Carga de Adherencia al Tratamiento evalúa el control de la dieta necesario para modificar una enfermedad endocrinológica mediante la asignación de un número determinado de puntos. El grado en que se modifica la dieta varía de persona a persona, así como el grado en que las personas cumplen con estas modificaciones. Los puntos de Carga de Adherencia al Tratamiento se asignan según modificación de la dieta, cuando la persona requiere de ésta. Con base en el historial clínico, se conocen las restricciones o modificaciones nutricionales a nivel general, no por cada alimento, pues se considera que las restricciones en la dieta de una forma u de otra, afectan la vida de las personas (Tabla 8.3).

Tabla 8.3. Puntuación según modificación de la dieta.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Modificación		Puntos
Grado I: Nutrición vía oral con modificaciones de alimentos sólidos o blandos a líquidos en forma permanente; o modificaciones en la composición de la dieta atendiendo a una enfermedad específica (Ej. Diabetes o enfermedad renal entre otros)		2
Grado II: Nutrición enteral a través de sondas nasoentéricas, catéteres de ostomías en forma permanente.		5
Grado III: Nutrición parenteral permanente		10

c. Procedimiento de monitoreo basado en los niveles de glicemia

Son los procedimientos de base necesarios para monitorear la enfermedad (PBI, *Procedure Based Impairment*). La Carga de Adherencia al Tratamiento refleja las consecuencias de la intervención corporal de los procedimientos instaurados para el control de la enfermedad; por lo tanto, los puntos se otorgan según la frecuencia de intervención requerida (número de monitoreos) para controlar la enfermedad. Actualmente, este método se aplica para vigilar la glucosa en sangre de la persona diabética, pero puede ser utilizado como un modelo si existen otros tipos de control (Tabla 8.4).

Tabla 8.4. Puntuación según controles de glicemias.

Procedimiento	Puntos
Monitoreo de glucosa – una vez por día	1
Monitoreo de glucosa – dos veces por día	2
Monitoreo de glucosa – tres veces por día	3
Monitoreo de glucosa – cuatro o más veces por día	4
Uso permanente de la bomba de Insulina	5

Las intervenciones quirúrgicas necesarias para tratar y/o controlar una enfermedad endocrinológica se consideran como parte del tratamiento en este capítulo. Aunque no necesariamente asigna puntos de Carga de Adherencia al Tratamiento, estas intervenciones quirúrgicas permiten la inclusión en las tablas correspondientes descrita como “tratamientos que necesitan”. Se suman los puntos obtenidos de cada tabla aplicada, asignándose un total de puntos por la Carga de Adherencia al Tratamiento y ubicando clase, de acuerdo con ésta, se ajusta el valor predeterminado dado por el factor principal inicialmente.

Así, las reglas para la **determinación de deficiencia total** en las personas con deficiencia endocrinológica, son:

- Con base en el historial clínico (*factor principal*) relacionado con el sistema, órgano o glándula endocrina afectada, se elige la *clase* de deficiencia en la tabla correspondiente. Se debe empezar con el *grado*, valor medio de esa clase, como valor predeterminado.
- Se calculan los puntos, sumando las tablas correspondientes para la Carga de Adherencia al Tratamiento, y se asigna la clase correspondiente, de acuerdo con el número total de puntos. Esta clase puede modificar el *grado* predeterminado hacia un valor mayor o menor dentro de la misma.
- Si existe otro *factor modulador* diferente a los de la Carga de Adherencia al Tratamiento, se utiliza al asignar la clase correspondiente; esta nueva clase puede modificar aún más el grado predeterminado dentro de la clase inicialmente asignada, como se hizo con la Carga de Adherencia al Tratamiento.
- Combinar con cualquier otra deficiencia endocrinológica u otro sistema que se encuentre afectado, valiéndose de la fórmula de valores combinados de Deficiencias.

8.5. Procedimientos Específicos para Calificar las Deficiencias del Sistema Endocrino.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los porcentajes de deficiencia reflejan la gravedad de los síntomas, de los hallazgos en la valoración física, de las pruebas objetivas (laboratorio) y de las limitaciones funcionales producidas por una enfermedad del sistema endocrino y la carga de adherencia al tratamiento.

8.5.1. Procedimiento para la Calificación de las Deficiencias por Trastornos del Eje Hipotalámico-pituitario (HPA).

El médico examinador debe evaluar cada trastorno hormonal por separado, utilizando las tablas respectivas y combinar los valores resultantes. Tras este paso, se deben clasificar y valorar las deficiencias generadas en otras estructuras cercanas anatómicamente al eje hipotálamo- hipofisiario tales como el sistema visual, los sistemas nervioso, central y nervioso periférico, o los que causan trastornos mentales y del comportamiento. Los cuales se deben combinar mediante la fórmula o la tabla de valores combinados de deficiencias.

La Tabla 8.5 se utiliza para valorar los casos con trastorno hormonal por una deficiencia del eje hipotalámico-hipofisiario. Sólo se utiliza para valorar alteraciones de las hormonas o prohormonas producidas por este eje. No se utiliza para valorar deficiencias generadas por trastornos de las hormonas TSH y ACTH, que son producidas por el HPA; para la evaluación de estas deficiencias, se utilizarán los criterios y las tablas específicas dadas este capítulo; por ejemplo, si una persona tiene una secreción anormal de ACTH debido a un trastorno de la HPA, la alteración endocrinológica se evalúa en la sección 8.5.4 relacionada con la corteza suprarrenal en este capítulo. En los casos en que una hormona trófica sea evaluada por otra sección de este capítulo, éste se analiza como un trastorno primario ocasionado por una deficiencia de la glándula tiroides.

Aunque el historial clínico es el *factor principal* para asignar la *clase* de deficiencia, la Carga de Adherencia al Tratamiento permite que el médico evaluador ajuste adecuadamente el valor predeterminado dentro de esa clase.

Tabla 8.5. Criterios para la evaluación de las deficiencias por trastornos del eje hipotalámico-pituitario (HPA).

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Valor de la deficiencia	0	5% al 9%	10% al 14%	15% al 29%	30% al 50%
Grado de severidad (%)		5 7 9 (A B C)	10 12 14 (A B C)	15 22 29 (A B C)	30 40 50 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Presenta un trastorno del HPA. No requiere tratamiento	Presenta un trastorno del HPA. Requiere tratamiento una vez o menos por semana. No presenta secuelas	Presenta un trastorno del HPA. Requiere tratamiento diario. No presenta secuelas	Presenta un trastorno del HPA. Requiere tratamiento. Presenta secuelas mínimas o leves	Presenta un trastorno del HPA. Requiere tratamiento. Presenta secuelas significativas, moderadas, severas o muy severas
CAT (factor modulador) ^(a)	0 puntos	1-2 puntos	3-6 puntos	7-10 puntos	Mayor de 11 puntos

^{a)} CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

8.5.2. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por enfermedades de la tiroides.

Las hormonas tiroideas influyen en la tasa metabólica de muchos sistemas y órganos. La fibrilación auricular persistente después del tratamiento adecuado del hipertiroidismo debe ser evaluada en el capítulo del sistema cardiovascular. El hipotiroidismo puede ser controlado satisfactoriamente con la administración de medicamentos para la tiroides. De vez en cuando, la causa de enfermedades asociadas en otros sistemas de órganos de reemplazo hormonal completo no puede ser posible. En estas circunstancias, la deficiencia del sistema endocrino reflejará el carácter incompleto del tratamiento. Su calificación se lleva a cabo con la Tabla 8.6. El historial clínico es el *factor principal*.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 8.6. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de la tiroides.

Clase de la deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2
Valor de la deficiencia	0	1% -al 14%	15% al 30%
Grado de severidad (%)		1 5 8 11 14 (A B C D E)	15 19 23 27 30 (A B C D E)
Historial clínico (Factor principal)	Presenta un trastorno de la glándula tiroides. No requiere tratamiento. Sin síntomas residuales	Presenta un trastorno de la glándula tiroides. Requiere tratamiento. No presenta síntomas residuales.	Presenta un trastorno de la glándula tiroides. Requiere tratamiento. Presenta síntomas residuales
Examen físico (factor modulador)	Examen normal de la tiroides	Al examen presenta un bocio residual o estéticamente notable: nódulo < 1,5 cm	Al examen presenta un bocio residual o estéticamente notable: nódulo > 1,5 cm. O no presenta tiroides
CAT (factor modulador)^(a)	0 Puntos	1-3 puntos	≥ 4 puntos

a) CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

8.5.3. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por enfermedades de las glándulas paratiroides: La secreción de la hormona paratiroides (HPT) se deriva de un número variable (entre 4 y 12) de glándulas paratiroides, las cuales regulan los niveles de calcio y fósforo en la sangre, minerales esenciales para el funcionamiento adecuado de los sistemas esquelético, digestivo, renal y nervioso. La mayoría de las deficiencias de estas glándulas están relacionadas con hiperfunción, hipofunción y carcinoma.

El hipoparatiroidismo coexiste con hipofunción de otros órganos endocrinos causada por deficiencias poliglandulares autoinmunes que se presentan con el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la insuficiencia adrenal, el hipogonadismo y la anemia perniciosa, condiciones que se deben valorar en los respectivos capítulos, para luego combinarlas.

En la mayoría de los casos de hiperparatiroidismo, un tratamiento puede corregir la anormalidad primaria. No obstante, los síntomas y signos pueden persistir y presentar fracturas, cálculos renales o fallas renales, de manera secundaria. Estas deficiencias deben ser valoradas en los capítulos correspondientes y luego combinarlas usando la fórmula o tabla de valores combinados. Si la cirugía falla o la persona no puede someterse a cirugía, puede requerir de terapias por largo tiempo.

Los hallazgos encontrados en las pruebas objetivas son el *factor modulador* y hacen referencia a hallazgos físicos y a niveles del calcio sérico, los cuales son posible corregir. El *factor principal* es el historial clínico (Tabla 8.7).

Tabla 8.7. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de las glándulas paratiroides.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2
Valor de la deficiencia	0	1% al 19%	20% al 30%
Grado de severidad (%)		1 5 10 15 19 (A B C D E)	20 23 25 28 30 (A B C D E)
Historial clínico (Factor principal)	Presenta un trastorno de las paratiroides. No requiere tratamiento. Sin síntomas residuales	Presenta un trastorno de las paratiroides. Requiere tratamiento o cirugía. Sin síntomas residuales	Presenta un trastorno de las paratiroides o no presenta paratiroides. Requiere tratamiento. Presenta síntomas residuales
Laboratorios (factor modulador)^(a)	Niveles de calcio en sangre normales. (8.5 a 10.2 mg/dL)	Niveles de calcio en sangre leve o moderadamente alterados con relación a los valores normales	Niveles de calcio en sangre severa o muy severamente alterados con relación a los valores normales
CAT^(b)	0 puntos	1-2 puntos	≥ 3 puntos

a) La diferencia sólo entre las clases 1 y 2.

b) CAT Carga de Adherencia al Tratamiento.

Niveles de calcio en sangre

Normal: 8.5 a 10.2 mg/dL

Leve: 10.5 a 11.9 mg/dL

Moderado: 12 a 13.9 mg/dL

Grave: 14-16 mg/dL

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

--

8.5.4. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por enfermedades de la corteza suprarrenal.

La corteza suprarrenal sintetiza y secreta la hormona adrenocortical (o cortisol). Esta hormona participa en la regulación de los electrolitos, del agua y de los carbohidratos, así como en el control del peso y el metabolismo de las proteínas. También afectan la respuesta inflamatoria, la permeabilidad de la membrana celular y las respuestas inmunológicas. Esta hormona juega un papel en el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias. La deficiencia puede derivarse de hipersecreción o hiposecreción de las hormonas corticales.

El hipoadrenismo es usualmente permanente y requiere de terapia por largos períodos de tiempo con glucocorticoides y/o mineralocorticoides por deficiencias de estas sustancias. El factor principal es el historial clínico (Tabla 8.8).

Tabla 8.8. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de la corteza suprarrenal

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Valor de la deficiencia	0	1% al 19%	20% al 39%	40% al 60%
Grado de severidad (%)		1 10 19 (A B C)	20 30 39 (A B C)	40 50 60 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Presenta un trastorno de la corteza suprarrenal. No requiere tratamiento. Asintomático	Presenta un trastorno de la corteza suprarrenal. Requiere tratamiento. No presenta síntomas y/o signos por enfermedad activa. No presenta anormalidades bioquímicas	Presenta un trastorno de la corteza suprarrenal. Requiere tratamiento. Presenta síntomas y/o signos por enfermedad activa. Presenta anormalidades bioquímicas leves o moderadas	Presenta un trastorno de la corteza suprarrenal. Requiere tratamiento. Presenta síntomas y/o signos por enfermedad activa (Síndromes de Cushing y de Nelson). Presenta anormalidades bioquímicas severas o muy severas
CAT (factor modulador) ^{a)}	0 puntos	1-4 puntos	5-7 puntos	≥ 8 puntos

^{a)} CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

8.5.5. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por enfermedades de la médula suprarrenal.

La médula adrenal sintetiza y secreta principalmente epinefrina, cuyas funciones regulan la presión arterial y el gasto cardíaco y en cierta medida, afecta el metabolismo intermedio del cuerpo.

La hiperfunción de la médula suprarrenal puede ser causada por feocromocitoma o, raramente, por hiperplasia de células cromafines. El feocromocitoma se puede presentar en cualquier sitio del cuerpo que tenga tejido nervioso simpático. La presencia de un feocromocitoma se asocia con hipertensión arterial paroxística o sostenida y puede producir manifestaciones de enfermedad coronaria. Cuando hay signos o síntomas que no pueden ser valorados en otro sistema, deben ser evaluados por deficiencias endocrinológicas primarias. El índice de deficiencia de esta sección se calcula por estimación y extrapolación, y debe estar documentando con detalle en el historial clínico.

Tabla 8.9. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedades de la médula suprarrenal.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Valor de la deficiencia	0	1% -al 5%	6% -al 15%	20% al 30%	40% al 60%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Grado de severidad (%)		1 3 5 (A B C)	6 10 15 (A B C)	20 25 30 (A B C)	40 50 60 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Presencia de trastorno de la médula suprarrenal. No requiere tratamiento. Asintomático	Presencia de trastorno de la médula suprarrenal. Requiere tratamiento. No presenta síntomas y/o signos residuales	Los signos y síntomas por exceso de catecolaminas se pueden controlar con agentes bloqueadores en gran parte del tiempo (>75%)	Los signos y síntomas por exceso de catecolaminas se pueden controlar con agentes bloqueadores en al menos el 50% del tiempo	Los signos y síntomas por exceso de catecolaminas se pueden controlar con agentes bloqueadores muy poco (≤25% del tiempo)
CAT (factor modulador)^{a)}	0 puntos	1-3 puntos	4 - 6 puntos	7-10 puntos	> 11 puntos

^{a)} CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

8.5.6. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por diabetes mellitus.

La insulina y el glucagón son hormonas secretadas por los islotes de Langerhans del páncreas. Ambas hormonas se requieren para el metabolismo normal de carbohidratos, lípidos, y proteínas. Un daño permanente puede resultar por déficit o exceso de cada hormona. La extracción de tejido pancreático normal durante la resección de un tumor de las células de los islotes de Langerhans no constituye una alteración del sistema endocrino, si después de la operación, la tolerancia a los carbohidratos de la persona es normal.

Según la ADA (Asociacion Americana de Diabetes), la diabetes mellitus se clasifica en 4 grupos: tipo 1, tipo 2 , diabetes gestacional y otras diabetes (por otras causas) .

- **Tipo 1:** Una falta de insulina debido a la destrucción de las células Beta del páncreas. .
- **Tipo 2:** Es la resistencia a la insulina..
- **Diabetes gestacional (DG):** Definida como “cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo”
- **Otras Diabetes:** (diabetes neonatal, enfermedades del páncreas exocrino como fibrosis, diabetes producida por sustancias químicas).

Criterios diagnósticos de la diabetes: La diabetes se diagnostica actualmente cuando se constatan niveles de glucosa en la sangre en ayunas iguales o superiores a 126 mg/dl (7,0 mmol/L), mediante la prueba de tolerancia a la glucosa anormal (2 horas postprandial de glucosa) en niveles superiores a 200mg/dL (11,1 mmol/L),Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) igual o superior a 6,5%(48mmol/mol), Paciente sintomático con toma al azar igual o mayor a 200 mg/dl(11,1mmol/L)Test de O Sullivan para diagnóstico de DGL prueba consiste en una toma en ayunas, una carga de 75 g de glucosa y 2 tomas pos prandiales a la hora y a las 2 horas. El umbral para el diagnóstico es valor \geq 92 mg/dl en ayunas, o \geq 180 mg/dl a la hora o \geq 153 mg/dl a las 2 horas (o su equivalente en miliosmoles por litro: ayunas: \geq 5,1 mmol/L, o 1 hora \geq 10,0 mmol/L o 2 horas \geq 8,5 mmol/L) de glucosa plasmática.)

La prediabetes se diagnostica cuando las concentraciones de glucosa en sangre se hallan en el rango de 100 a 125 mg/dL para glucosa en ayuno alterado, la intolerancia a la glucosa se presenta en valores de glicemia de 140 a 199 mg/dL o estableciendo la curva de tolerancia de glucosa, o valores de hemoglobina glucosilada 5.7 - 6.4 %.

Gran parte de los daños que resultan de la diabetes se relacionan con complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, en la persona con diabetes el examinador determina la presencia o ausencia de vasculopatía, retinopatía, nefropatía y neuropatía; el grado de deficiencia debe ser evaluado en el respectivo capítulo y, de ser necesario, se debe aplicar la tabla o fórmula de valores combinados.

La alteración endocrinológica creada por la condición de la diabetes se evalúa mejor mediante el uso de la medicación prescrita para controlar la enfermedad, como un sustituto de la gravedad. La deficiencia se basa en el número de medicamentos utilizados para controlar esta condición, la frecuencia con que se administran y las consecuencias de la falta de dosis de la medicación.

Las pruebas objetivas son un método poco apropiado para calificar la deficiencia en la persona diabética, por lo que las mediciones séricas de glucosa son inadecuadas como herramienta exclusiva de evaluación

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

de la deficiencia. Si bien son valiosas en el control diario del tratamiento de la diabetes, son más un reflejo de la adecuación del tipo y dosis del medicamento o medicamentos, del cumplimiento de las restricciones dietéticas y los efectos del estilo de vida, que incluyen la regularidad y cantidad de ejercicio que la persona mantiene como parte de su rutina diaria. Los niveles séricos de insulina y el glucagón son mediciones de cierto valor en el diagnóstico de algunas condiciones de la glicemia, pero no tienen ningún valor para la evaluación de la deficiencia.

Mientras que la medición de los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA_{1c}) es una medida pobre de la condición diabética, desde el punto de vista del índice de deficiencia, se puede utilizar para detectar el cumplimiento de los regímenes de tratamiento, ya que elevaciones significativas denotan un control deficiente. También puede ser usada para reflejar la severidad de la diabetes: entre más severa la enfermedad, es probable que una persona no sea capaz de hacer todos los ajustes necesarios para mantener el control en forma estricta. El inadecuado control de la diabetes, se refleja en una elevada HbA_{1c}, que puede ser el resultado del uso de medicación indebida, dieta inadecuada, conducta inapropiada de ejercicio o una prescripción inadecuada de medicamentos.

Los niveles elevados se utilizan como un *factor modulador*, pues el grado de elevación denota un menor cumplimiento y/o capacidad para mantener un “control estricto” sobre la diabetes. El inadecuado control de la condición diabética se asocia con un mayor número de complicaciones cardiovasculares, neurológicas y nefrológicas y proporciona un mayor riesgo de deficiencia hacia el futuro.

Por lo tanto, desde un punto de vista endocrinológico, la diabetes mellitus se valora principalmente por la necesidad de medicación, la vía de administración de la medicación, la necesidad de pruebas de sangre y la necesidad de ajustes en la dieta. Otros factores de importancia en la evaluación clínica son los problemas ocasionados por la hiperglicemia y la hipoglucemia. Cada condición puede causar síntomas, así como las hospitalizaciones. Para evaluar integralmente la deficiencia creada por la diabetes, como un indicador de interferencia importante en la vida normal de una persona, se utiliza la Tabla 8.10.

Tabla 8.10. Criterios para la evaluación de las deficiencias por diabetes mellitus

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Valor de la deficiencia	0	1% al 9%	10% -al19%	20% al 39%	40% al 60%
Grado de severidad (%)		1 3 5 7 9 (A B C D E)	10 13 15 17 19 (A B C D E)	20 25 30 35 39 (A B C D E)	40 45 50 55 60 (A B C D E)
Historial clínico (Factor principal)	Historia de intolerancia a la glucosa, establecida bioquímicamente, que no requiere tratamiento o modificación en la dieta.	Diabetes ^(b) y/o síndrome metabólico; requiere régimen nutricional.	Diabetes ^(b) ; requiere (tratamiento con 1 o 2 hipoglucemiantes orales) y modificaciones en la dieta.	Diabetes controlada ^(b) , requiriendo tratamiento: dieta y medicación (insulino requeriente- puede hacer uso de bomba de insulina).	Diabetes ^(b) , que requiere tratamiento: dieta agresiva y medicación (insulino requeriente- puede hacer uso de la bomba de insulina). Aun así no se controla.
Pruebas de laboratorio (factor modulador)	Hemoglobina A _{1c} normal: < 0.06 (<6%)	Hemoglobina A _{1c} normal: 0.06 a 0.065(6% - 6.5%)	Hemoglobina A _{1c} normal dentro del rango alto: 0.066 a 0.08 (6.6% - 8%)	Hemoglobina A _{1c} elevada: 0.081 a 0.10 (8.1% - 10%)	Hemoglobina A _{1c} elevada: > 0.10 (>10%)
CAT (factor modulador) ^(a)	0 puntos	1- 5 puntos	6 – 10 puntos	11 -15 puntos	> 16 puntos

a. CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

b. Diagnóstico de diabetes establecida bioquímicamente.

8.5.7. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por hipoglucemia.

Hay que distinguir entre la presencia de hipoglucemia postprandial y la postabsortiva; la segunda sugiere la posibilidad de un trastorno grave o incluso mortal, mientras que la postprandial por lo general es autolimitada y rara vez produce deficiencia física. La determinación del grado de la deficiencia por hipoglucemia sigue los

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

mismos principios que en la diabetes. Como puede verse en la Tabla 8.11, los daños como consecuencia de la hipoglicemia por sí sola son pocos.

Tabla 8.11. Criterios para la evaluación de las deficiencias por hipoglicemia.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2
Valor de la deficiencia	0	1% al 9%	10% -al 20%
Grado de severidad (%)		15 9 (A B C)	10 15 20 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Historia de hipoglicemia determinada bioquímicamente, que no requiere tratamiento o modificación en la dieta	Historia de hipoglicemia determinada bioquímicamente, controlada con tratamiento	Historia de hipoglicemia determinada bioquímicamente, no controlada con tratamiento
Pruebas de laboratorio (factor modulador)	Hemoglobina A _{1c} normal: < 0.06 (<6%)	Hemoglobina A _{1c} normal: 0.06 a 0.065 (6% - 6.5%)	Hemoglobina A _{1c} elevada: 0.066 a 0.08 (6.6% - 8%)
CAT ^(a)	0 puntos	1 - puntos	>6 puntos

^(a) CAT: Carga de Adherencia al Tratamiento.

8.5.8. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por alteración de las gónadas.

Además de producir las hormonas sexuales de género específicas que determinan la apariencia física, la función sexual, el desarrollo y el comportamiento, las gónadas también producen células germinales: espermatozoides y óvulos. La principal hormona de los testículos es la testosterona, mientras que las de los ovarios son los estrógenos y la progesterona. La función gonadal también puede variar por trastornos del eje hipotálamo-hipófisis.

Al evaluar el sistema reproductivo del hombre o de la mujer se debe poner atención en evitar la duplicación de la deficiencia, o lo que es más importante, el abuso de valoración funcional en los capítulos del sistema endocrino y en las secciones del capítulo renal relativas a los órganos sexuales. Las deficiencias pueden ser evaluadas en las secciones del sistema urinario y el reproductivo que tratan principalmente de los aspectos anatómicos de estos órganos. Por su parte, en este capítulo se enfoca en los aspectos hormonales del sistema reproductivo.

La infertilidad puede ser causada por anomalía anatómica o por alteración hormonal. Independientemente de la causa anatómica y hormonal, puede representar una afectación significativa para hombres y mujeres. Al evaluar la deficiencia de infertilidad, se debe contemplar la edad de la persona y el “deseo” que tenga la persona para reproducirse. Aparentemente los hombres pueden ser fértiles durante toda su vida; sin embargo, su deseo de reproducción no suele ser tan duradero. Esta situación debe estar descrita en el historial clínico para designar la deficiencia antes de otorgar cualquier valor porcentual sobre la base de infertilidad. Por otra parte, las mujeres tienen una expectativa limitada de fertilidad, aunque con los avances médicos en los últimos años, esta situación se ha vuelto más compleja que en el pasado: en efecto, con el uso adecuado de hormonas exógenas y óvulos almacenados, toda mujer de cualquier edad, siempre y cuando tenga un sistema reproductivo intacto, puede ser potencialmente fértil.

Estas situaciones, tanto en hombres como mujeres, son complejas y van más allá del alcance del presente capítulo. La deficiencia derivada de la insuficiencia de hormonas gonadales es difícil de evaluar mediante el uso de fórmulas similares a las encontradas en otros capítulos de la medicina interna. En consecuencia, el método de asignar una persona en una clase determinada se basa en enfermedades y alteraciones que no han sido tratadas en otros sistemas y llegan al capítulo de las deficiencias hormonales; como ejemplo, se mencionan las deficiencias causadas por el hábito corporal alterado y la infertilidad. La falta de tratamiento de la insuficiencia gonadal rara vez provoca patología grave de inmediato; además, muchos de los efectos a largo plazo pueden ser tratados directamente, de manera que el tratamiento “no es necesario”. Si la persona presenta síntomas leves que no afectan la fertilidad, el tratamiento se considera como “recomendado” pero si hay signos físicos (como la masculinización o feminización del hábito corporal) el tratamiento se clasifica como “altamente recomendado”. Los problemas psicológicos deben ser valorados en el capítulo de deficiencia por alteraciones del comportamiento y la enfermedad mental.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

La deficiencia de la Clase 3 tiene en cuenta la edad de la persona y su deseo de permanecer reproductiva. Si esto conduce a un uso intermitente de medicamentos o procedimientos quirúrgicos para lograr la fertilidad, éstos se consideran como parte de la Carga de Adherencia al Tratamiento. Este valor debe ser combinado con otros deterioros endocrinos que se encuentran bien documentados en esta u otras secciones de este capítulo.

Tabla 8.12. Criterios de valoración del daño corporal por alteración de las gónadas.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Valor de la deficiencia	0	1% - al 5% ^(a)	6% al 10%	11% al 15%
Grado de severidad (%)		1 3 5 (A B C)	6 7 8 9 10 (A B C D E)	11 12 13 14 15 (A B C D E)
Historial clínico (Factor principal)	Trastorno en las gónadas determinado bioquímicamente y asintomático	Trastorno en las gónadas determinado bioquímicamente. Con síntomas leves ; de acuerdo con éstos se recomienda tratamiento.	Trastorno en las gónadas determinado bioquímicamente. Con síntomas moderados o secuelas físicas con tratamiento recomendado.	Trastorno en las gónadas determinado bioquímicamente. Con infertilidad por disfunción hormonal.
Hallazgos físicos (factor modulador)	No hay anormalidades físicas por trastorno gonadal	No hay anormalidades físicas por trastorno gonadal	Hay anormalidades que conllevan a alteración de los hábitos.	Con peso corporal o estatura anormales debido a la alteración hormonal
CAT ^(b)	0 puntos	1 - 2 puntos	3 - 4 puntos	≥ 5 puntos

a) Si no hay hallazgos físicos, la deficiencia se considera como Clase 1.

b) CAT que incluye el uso intermitente de medicamentos o procedimientos quirúrgicos para controlar la infertilidad.

8.5.9. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por alteración de las glándulas mamarias.

La ausencia de glándulas mamarias no causa deficiencia en los hombres, pero si en la mujer premenopáusica porque imposibilita la lactancia. En algunos trastornos endocrinos puede haber galactorrea en mujeres y ginecomastia en hombres. La deficiencia más significativa de las glándulas mamarias se asocia con trastornos de carácter psicológico debido a las alteraciones cosméticas, las cuales deben ser evaluadas en el capítulo de deficiencia por trastornos del comportamiento y la enfermedad mental y se combinan con el valor de esta tabla.

La deficiencia cosmética causada por cualquier origen en los senos debe estar asociada con una alteración funcional de la mama para ser calificada por esta tabla. Las cicatrices se evalúan en capítulo de piel y se combinan los valores.

Con el advenimiento de diversos procedimientos de cirugía plástica de las mamas, muchos de los resultados quirúrgicos insatisfactorios, comunes en el pasado, pueden ser mitigados. La calificación se debe realizar luego de mejoría médica máxima – MMM o terminado el proceso de rehabilitación integral, o en todo caso, antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Cada mama debe evaluarse de forma independiente.

La incapacidad de lactancia y los problemas asociados con la galactorrea se aplican a ambos pechos al mismo tiempo. Se asigna una calificación máxima de cinco por ciento (5%) de deficiencia para las personas con alguno de estos problemas. La incapacidad de lactancia es un problema que sólo afecta a las mujeres en edad reproductiva que son capaces de embarazarse, en tanto que la galactorrea se aplica a ambos sexos.

Cualquier deformidad estética en un hombre, expresada como un problema psicológico, se evalúa usando el capítulo correspondiente a la deficiencia por trastornos del comportamiento y la enfermedad mental y sólo se puede otorgar una deficiencia adicional del cinco por ciento (5%).

Tabla 8.13. Criterios para la evaluación de las deficiencias por alteraciones de las glándulas mamarias.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2 ^(a)
Valor de la deficiencia	0	2% al 10%	20% al 30%
Grado de severidad (%)		2 6 10 (A B C)	20 25 30 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Asintomático; Glándula mamaria restaurada estéticamente	Historia de problemas de lactancia, galactorrea, o de desfiguración del seno; no es necesario tratamiento. La desfiguración se aplica a cada seno por separado, los resultados se combinan.	Historia de mastectomía no susceptible de corrección cosmética y / o cirugía reconstructiva.
Hallazgos físicos (factor modulador)	Ninguno	La lactancia puede o no estar presente; presenta una desfiguración menor en uno o ambos senos.	Ambos senos extirpados quirúrgicamente o deformidad estética severa con ninguna capacidad de lactancia.

^{a)}La mastectomía de una (1) mama tiene una deficiencia del 20% pero si es bilateral, la deficiencia será del 30%.

8.5.10. Procedimiento para la calificación de las deficiencias por enfermedad metabólica ósea.

Esta condición de los huesos normalmente no suele resultar en una deficiencia, a menos que haya fractura, dolor, deformidad o atrapamiento de un nervio periférico.

El hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, el exceso de glucocorticoides, el hipertiroidismo, la deficiencia nutricional y ciertos medicamentos, pueden causar osteoporosis, la cual es reversible con tratamiento; así mismo, otras patologías que se discuten en otros capítulos, como el mieloma múltiple y otras neoplasias malignas, también pueden inducir enfermedad metabólica ósea.

El tratamiento de la osteodistrofia renal puede representar un gran éxito, pero incluso después del trasplante renal, la enfermedad metabólica de los huesos puede persistir. Para prevenir la deficiencia esquelética progresiva puede ser necesario instaurar un tratamiento continuo para osteoporosis primaria, hipogonadismo, enfermedad de Paget y la vitamina D-osteomalacia resistente. El raquitismo puede resultar en una deformidad permanente, fracturas osteoporóticas y osteogénesis imperfecta.

La enfermedad metabólica de los huesos es normalmente asintomática, a menos que ocurran complicaciones como fracturas o trastornos importantes en el metabolismo del calcio, que conducen a síntomas neurológicos y/o enfermedad renal.

Los estudios clínicos pertinentes incluyen:

- 1) Energía dual por absorciometría de rayos X (DEXA);
- 2) Marcadores bioquímicos como fosfatasa alcalina, osteocalcina y los enlaces cruzados del colágeno;
- 3) Excreción urinaria de calcio;
- 4) Radiografía y escanografía de hueso
- 5) Biopsia de hueso.

La deficiencia de la persona debe ser considerada sobre la base de la historia clínica y los hallazgos de las pruebas de diagnóstico objetivo (*T-score*). La Carga de Adherencia al Tratamiento varía enormemente según las preferencias de la persona y puede ser mínima; a causa de las amplias variaciones en la dosificación (de una vez al día, a una vez al año), los puntos de la Carga de Adherencia al Tratamiento se incorporan intrínsecamente en el régimen que encuentra en la Tabla 8.14.

Tabla 8.14. Criterios para la evaluación de las deficiencias por enfermedad metabólica ósea.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2
----------------------	---------	---------	---------

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Valor de la deficiencia	0	1% al 9%	10% al 20% ^(a)
Grado de severidad (%)		159 (A B C)	10 15 20 (A B C)
Historial clínico (Factor principal)	Historia de osteoporosis; no requiere tratamiento.	Historia de osteoporosis; requiere tratamiento.	Historia de osteoporosis; refractaria al tratamiento.
Pruebas objetivas (factor modulador)	Antecedentes de densitometría ósea anormal. Los resultados actuales actuales > -1	Antecedentes de densitometría ósea anormal. Los resultados actuales entre < -1 hasta < -2	Densitometría ósea anormal. Los resultados actuales ≤ -2.

^{a)} Si están ambos criterios use 20% y si es un solo criterio use 10%.

Capítulo IX

Deficiencias por Alteraciones del Sistema Auditivo y Vestibular

9.1. Objetivo. Proveer los criterios para la evaluación de la deficiencia anatómica y funcional permanente del sistema auditivo y vestibular, así como sus funciones sensoriales (audición y equilibrio).

9.2. Alcance. Este capítulo evalúa las pérdidas de la audición conductivas, neurosensoriales, mixtas o centrales, de diversa etiología. Incluye, entre otras limitantes, la exposición al ruido, a medicamentos ototóxicos y a sustancias ambientales. Así mismo, evalúa las deficiencias generadas por enfermedades de la infancia (meningitis, rubeola, rubeola congénita, entre otras), además de las pérdidas hereditarias, presbiacusias, meningitis, tumores, infecciones y traumas encefalocraneanos.

9.3. Definiciones y Principios de Evaluación. Los principios que se consideran en este capítulo para la evaluación y ponderación de las deficiencias por pérdida de las capacidades auditiva y vestibular deben determinarse posteriormente a la Mejoría Médica Máxima – MMM o terminado el proceso de rehabilitación integral; en todo caso, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de incapacidad temporal continua.

Una vez se establezca el diagnóstico clínico dado por Otorrinolaringología, se valoran las deficiencias auditivas de acuerdo a los criterios que exponen. En caso de existir deficiencia auditiva y vestibular, se deberá calcular por separado cada una y posteriormente se procederá a combinar las deficiencias.

9.3.1. Valoración de la pérdida por alteraciones del sistema auditivo:

Criterio. Audiometría.

La agudeza auditiva se entiende como la capacidad que tienen los oídos para captar los sonidos; el oído humano percibe un rango de frecuencias que varía entre 20 y 20.000 Hz. La medición de la conducción aérea evalúa el estado del oído externo, medio e interno y la cóclea; por su parte, la conducción ósea mide la función neurosensorial más directamente.

La audiometría tonal es una prueba audiométrica que busca registrar los umbrales de audición de una persona mediante la presentación de tonos puros a diferentes intensidades y frecuencias. Mediante el audiómetro es posible medir la audición de tonos puros; para tal fin, se deben realizar mediciones a 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. Es una prueba subjetiva que depende del evaluado.

La sensibilidad auditiva puede ser evaluada con o sin audífonos, implante coclear u otros dispositivos; no obstante, para efectos de la evaluación de la deficiencia, la audiometría se debe realizar **con los**

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

dispositivos (ayudas técnicas) anteriormente mencionados. La pérdida permanente de la agudeza auditiva, corresponde a una disminución mayor al rango normal para adultos, jóvenes o niños saludables.

La valoración del oído incluye el examen y valoración de síntomas y signos; la presencia de tinnitus y de otorrea es subjetiva por cuanto depende de los reportes individuales de la persona afectada, pero no puede ser medida objetivamente.

9.3.2. Valoración de las alteraciones del sistema vestibular.

Criterio 1. Historial clínico (Factor principal)

Síntomas y tratamiento.

Criterio 2. Examen físico.

- a. Exploración de la marcha.
- b. Test de Romberg.

Criterio 3. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas.

- a. Test de balance.
- b. Electronistagmografía o videonistagmografía.
- c. Posturografía Dinámica Computarizada.
- d. Respuesta Evocada Vestibular.
- e. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) cerebral.

9.4. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias.

9.4.1. Procedimiento específico para calificar la deficiencia por pérdida de la agudeza auditiva.

La evaluación de la agudeza auditiva se realiza midiendo cada uno de los oídos por separado y los dos oídos simultáneamente mediante la audiometría tonal. Se deberán realizar tres audiometrías, separadas una de otra por lo menos una semana y teniendo en cuenta la indicación de reposo auditivo de por lo menos 12 horas; este reposo no se puede reemplazar con la utilización de elementos de protección personal. El porcentaje de deficiencia de la audición binaural (relativa a ambos oídos) se realiza con base en la severidad de la pérdida de la audición que causa los cambios en la función del sistema auditivo-vestibular.

La metodología de calificación contempla los siguientes pasos:

Primero: Evalúe cada oído por vía ósea separado con una audiometría para tonos puros de 500, 1.000, 2.000 y 3.000 Hz, hallando el umbral auditivo en dB para cada oído. Para los valores extremos se aplican las siguientes reglas:

- a. Si el nivel de audición en una frecuencia específica es mayor de 100 dB, se debe tomar como 100 dB.
- b. Si el nivel de audición para una frecuencia específica tiene un valor negativo, debe tomarse como “0” dB.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para las lesiones de oído interno o del sistema nervioso central se tomarán en cuenta las audiometrías realizadas por vía ósea. Para los casos con compromiso del oído medio y externo se tomará en cuenta la audiometría vía aérea.

Segundo: Sume los valores de audición en dB de las cuatro frecuencias para cada oído por separado y para las tres audiometrías promedie. En caso de tener menos de tres audiometrías se tomará aquella en la cual hay más severidad de las audiometrías para el cálculo. Cuando se trate de una hipoacusia mixta, con audiometrías realizadas por vía ósea y vía aérea, se califica con base en la de mayor severidad; si la vía aérea es la de mayor severidad, y para tener en cuenta esta vía, la persona debe presentar un daño permanente del oído externo o medio y no temporal (ejemplo: “tapón de cerumen”). Si se descarta un daño permanente, solo se tiene en cuenta la vía ósea

Tercero: Para calcular la deficiencia monoaural se toma el valor de suma y se lleva a la Tabla 9.1 cruzándola con la del oído normal para determinar el porcentaje de deficiencia de cada oído.

Cuarto: Para estimar la deficiencia binaural se toman los valores obtenidos en la sumatoria del paso 2 y se llevan a la Tabla 9.2. El oído con mayor pérdida, esto es, el que obtuvo la sumatoria de mayor valor (peor oído), se localiza en el eje vertical (Y), mientras la sumatoria del oído con menor pérdida (mejor oído) se ubica en el eje horizontal (X): el valor de la deficiencia binaural corresponderá al cruce de los dos valores en la Tabla 9.2.

Quinto: El valor de deficiencia binaural se lleva a la Tabla 9.3 para convertirlo en porcentaje de deficiencia auditiva global.

Estas tablas son adecuadas para valorar la pérdida auditiva en adultos que han adquirido habilidades del lenguaje. La evidencia sugiere que la adquisición del lenguaje en niños que aún no tienen habilidades de lenguaje puede retrasarse cuando el promedio de agudeza auditiva se halla entre 15 y 25 dB; por lo tanto, en estos niños se estima la pérdida de la agudeza auditiva con este procedimiento, pero los problemas de adquisición del lenguaje se evaluarán en el aparte de habla y voz.

La calificación de la deficiencia de la agudeza auditiva no evalúa la discapacidad para el trabajo, ni las actividades de la vida diaria (AVD), para ello se utiliza el tercer título del presente manual.

Pérdida monoaural: Si la sumatoria de la intensidad en las cuatro frecuencias de un oído es de 100 dB (es decir 25dB cada uno) o menor, se asigna una deficiencia de 0% por considerar que no presenta limitaciones en las AVD (Tabla 9.1). Por el contrario, si la sumatoria es mayor o igual a 91,7 dB se asigna un 100% de deficiencia por cuanto se ha perdido la habilidad de realizar las AVD dependientes de la audición, como entender el habla. Para calificar la pérdida de la audición, a cada decibel por encima de 25 dB se asigna un 1,5% de pérdida, por lo que una pérdida de 67 dB por encima de 25 dB genera el 100% de pérdida.

Pérdida binaural: Cuando solamente un oído muestra daño, asigne al oído sin daño 0% en la Tabla 9.2 (que utiliza la fórmula de cálculo de la pérdida binaural) y luego aplique la Tabla 9.3 para convertir de deficiencia binaural a deficiencia global.

Uso de potenciales evocados de estado estable (incluye todas las frecuencias): en los casos de simulación se puede utilizar y realizar la calificación con base en los hallazgos del examen, acompañado del potencial evocado de latencia corta para definir la lesión.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 9.1. Deficiencia monoaural

Sumatoria de umbrales auditivos(db)	%	Sumatoria de umbrales auditivos(db)	%
100	0	240	52,6
105	1,9	245	54,5
110	3,8	250	56,3
115	5,6	255	58,2
120	7,5	260	60,1
125	9,4	265	62,0
130	11,3	270	63,8
135	13,1	275	65,7
140	15,0	280	67,6
145	16,9	285	69,5
150	18,8	290	71,4
155	20,7	295	73,2
160	22,5	300	75,1
165	24,4	305	77,0
170	26,3	310	78,9
175	28,2	315	80,7
180	30,0	320	82,6
185	31,9	325	84,5
190	33,8	330	86,4
195	35,7	335	88,3
200	37,6	340	90,1
205	39,4	345	92,0
210	41,3	350	93,9
215	43,2	355	95,8
220	45,1	360	97,6
225	46,9	365	99,5
230	48,8	Mayor de 370	100,0
235	50,7		

La metodología de calificación contempla los siguientes pasos:

La calificación de la deficiencia de la agudeza auditiva no evalúa la discapacidad para el rol laboral u ocupacional, ni las actividades de la vida diaria (AVD), para ello se utiliza el segundo título del presente manual.

El valor de la deficiencia auditiva, así obtenida se multiplica por el 2,0, para el calculo del valor final de la deficiencia, se deberá aplicar la ponderación al 50% de que hace referencia el último inciso del numeral 5°- **Metodología para la calificación de las deficiencias (Título Primero)** del presente Decreto, es decir que se pondera al momento de sumar el valor obtenido en el título segundo.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 9.2. Deficiencia binaural

		% de Deficiencia Binaural	
Otros	Perd	Otros	Perd
100	90	105	93
110	95	110	96
115	93	115	92
120	13	123	44
125	31	127	63
130	16	134	56
135	34	136	66
140	25	141	56
145	23	144	59
150	31	147	62
155	34	150	66
160	30	153	69
165	41	156	72
170	44	159	75
175	47	163	78
180	50	166	81
185	53	169	84
190	56	172	86
195	59	175	88
200	63	178	92
205	66	181	97
210	69	184	100
215	72	188	103
220	75	191	106
225	78	194	109
230	81	197	112
235	84	200	115
240	88	203	119
245	91	206	123
250	78	199	126
255	94	202	129
260	97	205	132
265	94	208	135
270	84	211	138
275	88	214	141
280	91	217	145
285	94	220	148
290	97	223	151
295	100	226	154
300	103	229	157
305	106	232	160
310	110	235	163
315	113	238	166
320	116	241	169
325	119	244	172
330	122	247	175
335	125	250	178
340	128	253	181
345	131	256	184
350	134	259	187
355	137	262	190
360	140	265	193
365	143	268	196
370	146	271	199
375	149	274	202
380	152	277	205
385	155	280	208
390	158	283	211
395	161	286	214
400	164	289	217
405	167	292	220
410	170	295	223
415	173	298	226
420	176	301	229
425	179	304	232
430	182	307	235
435	185	310	238
440	188	313	241
445	191	316	244
450	194	319	247
455	197	322	250
460	200	325	253
465	203	328	256
470	206	331	259
475	209	334	262
480	212	337	265
485	215	340	268
490	218	343	271
495	221	346	274
500	224	349	277
505	227	352	280
510	230	355	283
515	233	358	286
520	236	361	289
525	239	364	292
530	242	367	295
535	245	370	298
540	248	373	301
545	251	376	304
550	254	379	307
555	257	382	310
560	260	385	313
565	263	388	316
570	266	391	319
575	269	394	322
580	272	397	325
585	275	400	328
590	278	403	331
595	281	406	334
600	284	409	337
605	287	412	340
610	290	415	343
615	293	418	346
620	296	421	349
625	299	424	352
630	302	427	355
635	305	430	358
640	308	433	361
645	311	436	364
650	314	439	367
655	317	442	370
660	320	445	373
665	323	448	376
670	326	451	379
675	329	454	382
680	332	457	385
685	335	460	388
690	338	463	391
695	341	466	394
700	344	469	397
705	347	472	400
710	350	475	403
715	353	478	406
720	356	481	409
725	359	484	412
730	362	487	415
735	365	490	418
740	368	493	421
745	371	496	424
750	374	499	427
755	377	502	430
760	380	505	433
765	383	508	436
770	386	511	439
775	389	514	442
780	392	517	445
785	395	520	448
790	398	523	451
795	401	526	454
800	404	529	457
805	407	532	460
810	410	535	463
815	413	538	466
820	416	541	469
825	419	544	472
830	422	547	475
835	425	550	478
840	428	553	481
845	431	556	484
850	434	559	487
855	437	562	490
860	440	565	493
865	443	568	496
870	446	571	499
875	449	574	502
880	452	577	505
885	455	580	508
890	458	583	511
895	461	586	514
900	464	589	517
905	467	592	520
910	470	595	523
915	473	598	526
920	476	601	529
925	479	604	532
930	482	607	535
935	485	610	538
940	488	613	541
945	491	616	544
950	494	619	547
955	497	622	550
960	500	625	553
965	503	628	556
970	506	631	559
975	509	634	562
980	512	637	565
985	515	640	568
990	518	643	571
995	521	646	574
1000	524	649	577

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 9.3. Conversión de deficiencia binaural a deficiencia auditiva global.

% de deficiencia binaural			% de deficiencia global
-		0	0
0,1	a	2	1
2,1	a	4	2
4,1	a	6	3
6,1	a	8	4
8,1	a	10	5
10,1	a	12	6
12,1	a	14	7
14,1	a	16	8
16,1	a	18	9
18,1	a	20	10
20,1	a	22	11
22,1	a	24	12
24,1	a	26	13
26,1	a	28	14
28,1	a	30	15
30,1	a	32	16
32,1	a	34	17
34,1	a	36	18
36,1	a	38	19
38,1	a	40	20
40,1	a	42	21
42,1	a	44	22
44,1	a	46	23
46,1	a	48	24
48,1	a	50	25
50,1	a	52	26
52,1	a	54	27
54,1	a	56	28
56,1	a	58	29
58,1	a	60	30
60,1	a	62	31
62,1	a	64	32
64,1	a	66	33
66,1	a	68	34
68,1	a	70	35
70,1	a	72	36
72,1	a	74	37
74,1	a	76	38
76,1	a	78	39
78,1	a	80	40
80,1	a	82	41
82,1	a	84	42
84,1	a	86	43
86,1	a	88	44
88,1	a	90	45
90,1	a	92	46
92,1	a	94	47

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

94,1	a	96	48
96,1	a	98	49
98,1	a	100	50

9.4.2. Procedimiento específico para calificar la deficiencia por tinnitus: El tinnitus no es en sí mismo una enfermedad sino el síntoma de una enfermedad o una lesión. Lo más importante, en relación con la estimación de la deficiencia, es que es un síntoma y por lo tanto, es subjetivo y difícil de verificar. En los casos en que el tinnitus afecte el estado emocional de las personas, estas deficiencias se califican en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. No existe ninguna herramienta homologada para valorar el tinnitus y tampoco ninguna metodología aceptada por todas las agrupaciones de especialistas, por lo que la forma de valoración debe ser dada por el médico especialista tratante. Con base en lo anterior se calificará así: el tres por ciento (3%) o cinco por ciento (5%) a la deficiencia auditiva, dependiendo de la gravedad de la interferencia. Así, se otorga el tres por ciento (3%) cuando presenta tinnitus subjetivo recurrente y cinco por ciento (5%) cuando presenta tinnitus objetivo recurrente o permanente, debidamente soportado por el otorrinolaringólogo, si existe otra deficiencia se sumará aritméticamente este valor.

Procedimiento específico para calificar la deficiencia por alteraciones vestibulares y del equilibrio: La metodología de calificación es la contemplada en los numerales 5° y 6° del Título Preliminar.

Cuando las deficiencias de equilibrio se originan en cualquier sistema diferente de los mencionados, éstas deberán evaluarse en dicho sistema y capítulo; por ejemplo, las deficiencias originadas en los sistemas nervioso, cardiovascular o visual.

Los tres sistemas reguladores (vestibular, ocular o visual y quinestésico o propioceptivo) se relacionan en el reflejo oculo-vestibular. La evaluación de la deficiencia puede remitirnos a cualquiera de los tres, pero para los efectos de este capítulo, se tomará en cuenta sólo lo atinente al sistema vestibular.

Para efectos de este capítulo las alteraciones del equilibrio se han clasificado así:

Vértigo, entendido como la sensación de rotación de los objetos o de la persona alrededor de cualquier plano;

Mareo sin la sensación de rotación; y,

Anormalidades posicionales que afectan la estabilidad de la postura y/o el balance en posición de pie, con o sin vértigo.

Para efectos de la calificación y atendiendo la cronología de presentación, se establece la siguiente clasificación clínica del vértigo:

- **Vértigo espontáneo prolongado**, incluye: Otomastoiditis, laberintitis sifilítica, neuronitis vestibular, contusión vestibular con o sin fractura temporal, infarto del laberinto, tronco encefálico o cerebelo y otoesclerosis.

- **Vértigo recurrente**: Síndrome de Méniere, enfermedad vestibular inmunoinducida, vértigo recurrente benigno, fistula perilinfática, migraña basilar, epilepsia temporal.

- **Vértigo posicional**: Vértigo posicional paroxístico benigno, vértigo posicional asociado a atrofia espinocerebelosa, esclerosis múltiple, malformación de Chiari de tipo I, tumores de tronco encefálico y cerebelo, trastornos vasomotores crónicos, vértigo cervical e insuficiencia vertebrobasilar.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los estudios clínicos que se pueden emplear son, entre otros: Electronistagmografía (ENG), irrigación calórica, test rotatorios y posicionales, posturografía dinámica, test de Romberg o tandem Romberg y estudios de imagenología cerebral, los cuales deben estar relacionados con la historia clínica y los hallazgos del examen físico.

La electronistagmografía – ENG, es una técnica útil para registrar los movimientos de los ojos y el nistagmo inducido y espontáneo.

La videoenistagmografía – VNG, utiliza una cámara infrarroja para detectar los movimientos de los ojos en vez de electrodos.

Otras pruebas comportamentales son los test o maniobras de Romberg y de Dix-Hallpike;

Tabla 9.4. Criterios para estimar la deficiencia por enfermedades vestibulares.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0	2% al 15%	16% al 30%	31% al 50%	51% al 70%
GRADO DE SEVERIDAD (%)			2 6 9 12 15	16 20 24 27 30	31 36 41 46 50	51 56 61 66 70
Historial clínico (factor principal) ^(a)	Síntomas y tratamiento	Síntomas o signos de desequilibrio o vestibular presentes sin presencia de hallazgos objetivos	Síntomas o signos de desequilibrio vestibular consistentes con hallazgos objetivos. Vértigo espontáneo prolongado	Síntomas o signos de desequilibrio vestibular consistentes con hallazgos objetivos. Vértigo recurrente	Síntomas o signos de desequilibrio vestibular consistentes con hallazgos objetivos. Vértigo posicional.	
Examen físico o hallazgos físicos		No hay hallazgos confirmables	No hay hallazgos confirmables ni marcha levemente anormal, ni test de Romberg (+) ni otros hallazgos	Marcha inestable y test de Romberg anormal	Dificultad para caminar para sin asistencia	Dificultad para caminar o mantenerse de pie sin asistencia
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas	Electronistagmografía (ENG) o videoenistagmografía (VNG)	Hallazgos diagnósticos no confirmados	Evidencia clínica del nistagmo posicional o respuesta calórica anormal	Evidencia clínica del nistagmo posicional o respuesta calórica anormal	Hallazgos moderadamente anormales como nistagmo posicional o respuesta calórica anormal.	Hallazgos severamente anormales como nistagmo posicional o respuesta calórica anormal.

^(a) Factor principal.

Capítulo X
Deficiencias por Alteraciones del Olfato, del Gusto, de la Voz, del Habla y de las Vías Aéreas Superiores

10.1. Objetivo. Proveer criterios clínicos para evaluar las deficiencias derivadas de la anormalidad, la pérdida parcial o total, permanente y definitiva de las estructuras o de las funciones relacionadas con el gusto y el olfato. Así mismo, aporta criterios para evaluar la pérdida funcional o estructural, parcial o total de las estructuras que hacen parte del proceso motor de la voz y el habla por daños secundarios a la glossectomía, la laringectomía o la estenosis cicatricial de la laringe y/o demás estructuras que intervienen en la fonación.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Así mismo, aportar criterios para evaluar la pérdida funcional y orgánica del olfato y del gusto. Se excluyen de este capítulo las patologías neoplásicas.

10.2. Alcance. Este capítulo se enfoca en la valoración de las deficiencias ocasionadas por alteraciones funcionales y estructurales de los sentidos del gusto y el olfato, la voz y el habla (primera parte), además de las deficiencias relativas a la reducción del paso de aire a través de las vías aéreas superiores (segunda parte). Igualmente, evalúa las pérdidas del gusto y del olfato, además de las alteraciones de la voz y el habla de cualquier etiología.

Las neoplasias se excluyen de este capítulo y deben valorarse en el capítulo respectivo.

10.3. Definiciones y Principios de Evaluación

10.3.1. Gusto

Principios de evaluación y ponderación de la deficiencia

Se debe verificar el diagnóstico clínico aportado por las especialidades médicas tratantes, según la patología de base, los antecedentes clínicos, su evolución y los antecedentes patológicos. En especial, se consideran los trastornos olfativos primarios, las enfermedades metabólicas, la toxicidad a medicamentos y los trastornos de las vías gustativas (es decir, las enfermedades del sentido del gusto, del nervio facial, del nervio glosofaríngeo y del tronco cerebral) como los principales causantes de deficiencia. Para tal fin, se toma como base de calificación la Tabla 10.1.

Tabla 10.1 Deficiencias globales por alteración en las funciones del gusto.

Deficiencia del gusto	Porcentaje de deficiencia
Ageusia	6.0%
Hipoguesia	3.0%

10.3.2 Olfato.

Principios de evaluación y ponderación de la deficiencia: Para determinar las deficiencias del olfato se utiliza la Tabla 10.2.

Tabla 10.2. Deficiencias globales por alteración en las funciones del olfato.

Deficiencia del olfato	Porcentaje de deficiencia
Anosmia	6.0%
Hiposmia	3.0%

10.3.3. Voz, habla y lenguaje.

Principios de evaluación y ponderación de la deficiencia: La gravedad de la insuficiencia del habla es intuitivamente obvia; si una persona no puede hablar de manera inteligible, la comunicación verbal es extremadamente difícil o imposible en el hogar, el lugar de trabajo y en diversos contextos sociales. No obstante, el impacto de los trastornos de la voz sobre las Actividades de la Vida Diaria (AVD) ha sido subestimado durante largo tiempo y su importancia no se evidencia de inmediato.

La generación de sonidos fisiológicos alternativos (por las cuerdas vocales falsas o el esófago) no se considera directamente en este capítulo, sino a través de sus secuelas o afectación sobre la voz. Como norma general, para efectos de la calificación de la deficiencia en este capítulo, se tomarán en cuenta sólo las secuelas y no la etiología de los trastornos de la voz.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Se admiten dos (2) criterios para la valoración de las deficiencias por trastornos de la voz, los cuales se detallan a continuación:

Criterio 1. La valoración básica de la voz se hace integrando los siguientes parámetros: 1) La audibilidad, 2) La inteligibilidad, y 3) La eficiencia funcional de la palabra. Estos factores se asumen como *factor principal*:

- Audibilidad:** Permite que la persona sea escuchada aunque haya ruido de fondo; por lo general, refleja la condición de la voz.
- Inteligibilidad:** Se basa en la capacidad de articular y vincular las unidades fonéticas de la palabra con la precisión suficiente para ser comprendido.
- Eficiencia funcional:** Se refiere a la capacidad de producir una cantidad suficiente de habla, rápida, con ritmo y durante un período de tiempo suficiente, de forma que permita una comunicación eficiente.

Los síntomas de los trastornos de la voz son los siguientes: 1) Volumen anormal (fatiga de la voz, debilidad o intensidad de sonido); 2) Control anormal (tono y/o variación melódica); y/o 3) Calidad anormal (voz disfonía, dureza y/o afonía).

Criterio 2. Índice de incapacidad vocal abreviado (*Voice Handicap Index* o VHI-10): Prueba que representa el *factor modulador* y evalúa el rendimiento de la voz y el habla de una persona en relación con el ambiente. Está validada en español y consta de un cuestionario de diez (10) preguntas que abarca los dominios funcional, físico y emocional y que se establecen en la Tabla 10.3; en ésta, se asigna el valor (0: *nunca*; 1: *casi nunca*; 2: *a veces*; 3: *casi siempre*; y, 4: *siempre*) de acuerdo con la respuesta dada por la persona. La valoración global de este índice se establece mediante el uso de una escala de gravedad (leve, moderada, severa y muy severa) en la Tabla 10.4, en la que se consigna la sumatoria de los valores establecidos en la Tabla 10.3.

Tabla 10.3. Índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-10)

Criterios de funcionamiento	Preguntas	Escalas de puntuación				
		Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
		0	1	2	3	4
Funcional 1	La gente le oye con dificultad debido a su voz					
Funcional 2	La gente no le entiende en sitios ruidosos					
Funcional 8	Los problemas con la voz alteran su vida personal y social					
Funcional 9	Se siente desplazado de las conversaciones o reuniones por su voz					
Funcional 10	El problema de voz afecta su rendimiento laboral					
Físico 3	La gente le pregunta: ¿Qué le pasa en la voz?					
Físico 5	Siente que necesita tensionar la garganta para producir la voz					
Físico 6	La calidad de su voz es impredecible					
Emocional 4	Su voz le molesta					
Emocional 6	Su voz le hace sentir incomodidad					

Tabla 10.4. Escala de valoración global según el VHI-10 abreviado.

Escala	Puntaje obtenido (sumatoria)
Leve	Igual o menor de 10 puntos
Moderada	Entre 11 y 20 puntos

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Severa	Entre 21 y 30 puntos
Muy severa	Entre 31 y 40 puntos

10.3.4. Procedimiento para la calificación global de la deficiencia por alteraciones de la voz y el habla

Para calificar la deficiencia global en este capítulo se utiliza la Tabla 10.5 (incluye la *clase* a la cual pertenece la deficiencia y el *grado* de severidad en cada clase). Para evaluar la deficiencia se debe esperar lograr la Mejoría Médica Máxima – MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral, o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad y se aplica la metodología de *factor principal* y *factor modulador* que se estableció en los numerales 5 y 6 del Título Preliminar.

Para calificar la deficiencia se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

- En la Tabla 10.5 se analiza la fila correspondiente a los “Criterios de funcionamiento de la voz y el habla”, los cuales se asumen como *factor principal*, a fin de asignar la *clase* de deficiencia. Esta se selecciona de acuerdo con el **criterio clínico más comprometido** entre los atributos de audibilidad, inteligibilidad y eficiencia funcional.
- Se asigna el valor para *factor principal* en la Tabla 10.5, de acuerdo con las instrucciones que se presentaron en los numerales 5 y 6 del Título Preliminar.
- El *factor modulador* se deriva de la Tabla 10.3 (“Índice de incapacidad vocal abreviado, VHI-10) en la que se califican las 10 preguntas y esos puntos se suman.
- La sumatoria se lleva a la Tabla 10.4 (“Escala de valoración global según el VHI-10 abreviado”), para interpretar la gravedad, de leve a muy severa.
- Se asigna valor para *factor modulador* de acuerdo con las instrucciones de los numerales 5 y 6 del Título Preliminar.
- Si con el *factor principal* se alcanza el valor más alto en la *clase*, se omite la calificación de *factor modulador*.

Tabla 10.5. Deficiencia global por alteraciones de la voz y el habla.

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 9%	10% al 19%	20% al 29%	30% al 50%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 6 9 (A B C)	10 15 19 (A B C)	20 25 29 (A B C)	30 40 50 (A B C)
Criterios de funcionamiento de la voz y el habla ^(b) ^(c)	Audibilidad	La persona produce una voz con intensidad suficiente para atender la mayoría de las necesidades del habla cotidiana y suele hacerse escuchar en condiciones normales; sin embargo, pueden tener dificultades para hacerse oír en lugares ruidosos (estaciones de automóviles y autobuses, lugares públicos y restaurantes).	La persona puede producir una voz con intensidad suficiente para atender algunas de las necesidades del habla cotidiana, como una conversación cercana; sin embargo, tiene dificultades considerables a distancia o en lugares ruidosos (estaciones de automóviles y autobuses, lugares públicos y restaurantes) porque la voz se cansa fácilmente y es inaudible después de unos segundos.	La persona puede producir habla con intensidad suficiente para atender algunas necesidades del habla cotidiana, pero apenas puede ser oído por un oyente cercano o por teléfono y puede ser capaz de hablar al oído sin elevar la voz.	La persona no puede producir habla con intensidad suficiente para atender algunas necesidades del habla cotidiana.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE DE DEFICIENCIA	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALOR DE LA DEFICIENCIA	0	2% al 9%	10% al 19%	20% al 29%	30% al 50%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		2 6 9 (A B C)	10 15 19 (A B C)	20 25 29 (A B C)	30 40 50 (A B C)
Inteligibilidad	La persona puede realizar la mayoría de los actos articulatorios necesarios para el habla cotidiana, pero en ocasiones se le pide que repita; puede ser difícil o imposible producir algunas unidades fonéticas.	La persona puede realizar muchos actos articulatorios necesarios para el habla cotidiana y ser entendido por un extraño, pero puede tener numerosas inexactitudes y dificultades para articular o imposibilidad para producir algunas unidades fonéticas.	La persona puede realizar muchos actos articulatorios necesarios para el habla cotidiana y normalmente puede conversar con familiares y amigos; puede ser entendido por extraños con dificultad y con frecuencia se le puede pedir que repita lo expresado.	La persona puede realizar algunos actos articulatorios necesarios para el habla cotidiana y producir algunas unidades fonéticas y unas pocas palabras (como los nombres de los miembros de la familia), pero es ininteligible en otros contextos.	La persona no puede realizar actos articulatorios necesarios para el habla cotidiana.
	La persona puede satisfacer la mayoría de las demandas de la articulación y la fonación para el habla cotidiana con la velocidad adecuada y facilidad, pero en ocasiones puede dudar o hablar despacio.	La persona puede satisfacer la mayoría de las demandas de la articulación y la fonación para el habla cotidiana con la velocidad adecuada y facilidad, pero a veces habla con dificultad y el habla puede ser discontinua, interrumpida, vacilante o lenta.	La persona puede satisfacer la mayoría de las demandas de la articulación y la fonación para el habla cotidiana con la velocidad adecuada y facilidad, pero a veces sólo puede sostener una conversación continua por breves períodos, dando la impresión de que se cansa con facilidad.	La persona puede satisfacer a algunas demandas de la articulación y la fonación para el habla cotidiana con la velocidad adecuada y facilidad (como una sola palabra o frases cortas), pero no puede mantener el flujo verbal. El habla es difícil y el ritmo es excesivamente lento.	La persona no puede satisfacer las demandas de la articulación y la fonación para las necesidades del habla cotidiana con la velocidad y facilidad adecuadas.
Pruebas objetivas	VHI-10 ^(a)	Deben ser normales o casi normales	Leves	Moderadas	Severas
					Muy severas

a) Índice de Incapacidad Vocal (VHI-10).

b) Factor principal.

c) Tanto el examen físico de la voz y la palabra, como las pruebas de confrontación (hacer leer un texto a la persona a 2m), deben ser coherentes con las descripciones clínicas para cada clasificación.

10.4. Deficiencias por Alteración de la Respiración en las Vías Aéreas Superiores

10.4.1. Objetivo. Proveer los criterios para evaluar las deficiencias funcionales o estructurales que comprometen las vías aéreas superiores y ocasionan disfunción de las vías respiratorias altas. Incluye los trastornos en las funciones respiratorias por alteración de las cuerdas vocales (parálisis e inflamación), por congestión o estenosis (parcial o completa) de faringe, laringe y/o tráquea y por reflujo esofágico. Se excluyen las neoplasias y la apnea de sueño.

10.4.2. Alcance. En este capítulo se consideran las enfermedades o grupos de patologías relacionadas con la vía aérea superior: las fosas nasales, las cavidades nasales, boca, faringe, laringe y tráquea.

10.4.3. Principios de evaluación. El trastorno más común es la obstrucción de la vía aérea superior, la cual puede ser parcial (en los casos de congestión o estenosis) o completa (como en la oclusión). La obstrucción y otros defectos del paso del aire se evidencian mediante disnea (dificultad para respirar) y apnea de sueño; este último trastorno se trata en el capítulo de deficiencias por alteraciones del sistema respiratorio.

10.4.4. Criterios para calificar las deficiencias

Criterio 1. Historial clínico: Se asume como *factor principal*. El síntoma más relevante es la disnea, para lo cual se acogen los criterios de la escala de disnea MCR-ATS (ver Tabla 3.1 “severidad de la obstrucción” capítulo 3 “Deficiencias por trastornos del sistema respiratorio”).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Criterio 2. Pruebas objetivas: Diagnóstico u otros resultados de pruebas objetivas que se asumen como *factor modulador*. Los exámenes disponibles incluyen la laringoscopia y laringoscopia nasal, la traqueostopia, los estudios radiológicos, la RMN y la TAC.

10.4.5. Procedimiento específico para calificar las deficiencias por alteraciones de las vías respiratorias altas.

Las personas con defectos del paso de aire pueden ser evaluadas acudiendo a la clasificación de deficiencia incluida en la Tabla 10.6. (“Deficiencia global por alteraciones de las vías respiratorias altas”). La metodología para determinar el grado dentro de una *clase* de deficiencia tiene en cuenta los siguientes pasos:

- Determinar el tipo de enfermedad, patología o deficiencia de acuerdo con la clasificación de las tablas del libro de deficiencias.
- Asignar los valores para el factor principal y el factor modulador según las instrucciones dadas en los numerales 5° y 6° del Título Preliminar.

Tabla 10.6. Deficiencia global por alteraciones de las vías respiratorias altas.

Clase de deficiencia	Clase 0	Clase 1	Clase 2 ^(a)	Clase 3	Clase 4 ^(b)
Valor de la deficiencia	0	1% al 9%	10% al 24%	25% al 49%	50% al 70%
Grado de severidad (%)		1 5 9 (A B C)	10 17 24 (A B C)	25 39 49 (A B C)	50 60 70 (A B C)
Historial clínico (factor principal) ^(c)	Sin disnea	Disnea leve	Disnea moderada	Disnea severa	Disnea muy severa
Diagnóstico y otros resultados objetivos	TAC: mucosa sinusal con engrosamiento TAC: inflamación de los cornetes, la nasofaringe o la orofaringe. Laringoscopia: función de las cuerdas vocales	Estos exámenes no demuestran obstrucción de la nariz, los senos paranasales, nasofaringe, o la laringe	Leve 0 Moderado 0	Severo 0	Muy severo 0
		Leve 0 Moderada 0	Severa 0	Muy severa 0	
		Alteración leve	Alteración moderada	Alteración severa	Alteración muy severa (como en la parálisis bilateral)

^{a)} Las personas con traqueotomía o estoma se les asigna un 25% por deterioro o deficiencia total.

^{b)} Aumentar los grados dentro de la Clase 4, según la severidad y el número de hallazgos en el examen físico y los resultados objetivos, siempre y cuando pertenezcan a la Clase 4.

^{c)} Factor principal.

Capítulo XI

Deficiencias por Alteraciones del Sistema Visual

11.1. Objetivo. Proveer los criterios para evaluar las deficiencias derivadas de la anormalidad, la pérdida parcial o total, permanente y definitiva de las estructuras o de las funciones relacionadas con el sistema visual.

11.2. Alcance. En este capítulo se valoran las secuelas del sistema visual ocasionadas por cualquier tipo de patología que afecte, entre otros, a los medios transparentes, la retina, el nervio óptico, la vía visual intracraniana y la corteza visual; así mismo, se enfoca en las deficiencias derivadas de patologías palpebrales, de las vías lagrimales y de la motilidad extrínseca. Además, se tendrán en cuenta las consecuencias de enfermedades sistémicas que afectan la visión funcional.

11.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

11.3.1. Factores a considerar para la evaluación y ponderación del daño

En este capítulo del manual se contemplará únicamente el criterio de función visual.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Criterio 1. Función visual. Representa el factor principal y único; se valorará en relación con los conceptos de agudeza visual, campo visual y motilidad ocular, los cuales se describen a continuación.

a. **Agudeza visual:** Se expresa como una fracción en la que el numerador (número superior) se refiere a la distancia entre la persona y el optotipo o cartilla de lectura, generalmente de 6 metros (20 pies), mientras el denominador (número inferior) indica la distancia a la que una persona con visión normal podría leer correctamente la línea con las letras más pequeñas. Por ejemplo, la razón 20/20 se considera normal, pero 20/40 indicaría que la línea que la persona leyó correctamente a los 20 pies puede ser leída por una persona con visión normal a los 40 pies. La agudeza visual se deriva de la función macular.

La deficiencia debida a la disminución de la agudeza visual deberá evaluarse con la mejor corrección óptica (anteojos o lentes de contacto) y se estimará respecto de la visión de lejos. La agudeza visual lejana debe ser medida usando el cartel modelo **Early Treatment Diabetic Retinopathy Study© (ETDRS)** de la casa Lighthouse (Modelo Reducido, segunda edición, USA) o la **Cartilla de Colenbrander** (August Colenbrander M.D., Precision Vision, USA). En caso de no tener las anteriores, realizar la valoración con el test de SNELLEN. En el concepto indicar el test, cartel o la cartilla utilizada.

Para la calificación de la agudeza visual de “Baja visión” (entre rangos de 20/200 y 20/1200) se debe utilizar preferiblemente la cartilla EDTRS para un metro de distancia, o realizarla con cartilla de Snellen a un metro y expresar los resultados para esta distancia.

La valoración de la agudeza mediante el método de Puntaje de Agudeza Visual Funcional (PAVF) está referida a la funcionalidad y en ella se integran los puntajes de la agudeza visual monocular y binocular, mediante un factor de ponderación.

b. **Campo visual:** Es la porción del espacio en la cual los objetos se perciben simultáneamente cuando se mira un punto fijo e inmóvil. Debe evaluarse mediante las pruebas de campo visual por confrontación o campimetría visual computarizada. Sus límites máximos son de 60° en el sector superior, 60° en el sector nasal, 70° en el sector inferior y 90° en el sector temporal.

El campo visual debe ser explorado con pupila normal y con corrección óptica, entendida como la corrección mediante lentes de prueba que tiene el perímetro de corrección para visión de cerca, de acuerdo con la edad de la persona y su refracción. Cuando la persona usa lentes de contacto, por defectos refractivos muy altos, el examen se realizará con los lentes y se le adiciona la corrección para cerca, si está indicada para la edad de la persona.

Se evalúan dos campos fundamentales: la zona central y la zona periférica: la zona central (o campo visual central), corresponde al área limitada por la isóptera de treinta grados o a los 30 grados centrales y evalúa la región macular. Esta zona central es la que capta la región macular. El déficit en el campo visual se determina por la disminución del área total del campo o de la isóptera más periférica, por pérdidas sectoriales o por la presencia de escotomas.

Exámenes que evalúan el campo visual:

1. **Test de Goldman (prueba no computarizada):** Es un método estandarizado para evaluar el campo visual y su resultado se registra en isópteras. La isóptera III-4-e se utiliza para el cálculo de la pérdida por campo visual. Es preciso anotar que este tipo de perimetría ha desaparecido casi por completo de la práctica clínica.
2. **Perimetría automatizada:** Se realiza con equipos de las marcas comerciales Humphrey©, Octopus©, Dicon© y otras. El análisis del campo visual computarizado se basa en los valores

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

numéricos obtenidos y en los análisis estadísticos de los mismos; el resultado se registra gráficamente como una escala de grises. Evalúa usualmente hasta los 24°, que son los de mayor importancia en el diagnóstico; no obstante, para efectos de la calificación se debe extender hasta los 60° utilizando para ello el estímulo de 10 dB (ver Figuras 11.1 y 11.2). Para la valoración médico-laboral de la Perimetría Estática Automática Computarizada se traza una pseudoisoóptera que incluye los puntos con una sensibilidad igual o mayor de 10 dB.

La evaluación del campo visual se realiza midiendo los campos visuales por separado, en tanto que el campo bilateral se construye mediante la superposición de los reportes de los dos ojos o con el reporte campimétrico binocular. La valoración mediante campimetría debe realizarse cuando se sospeche compromiso del campo visual.

El método para la evaluación será el del Puntaje de Campo Visual Funcional (PCVF); es un método que integra los puntajes de campo visual monocular y binocular, tanto de agudeza como de campo visual, utilizando un factor de ponderación.

El fundamento teórico es el concepto de *visión funcional*, esto es, cómo funciona la persona con su capacidad visual residual para efectuar las AVD, asumiendo que una buena agudeza o campo de un ojo puede compensar parte del déficit de la misma función en el ojo contrario. Conceptualmente las funciones visuales (agudeza visual, campo visual, entre otras) reflejan cómo funciona el ojo, en tanto que la visión funcional expresa cómo funciona la persona en su entorno.

c. Motilidad ocular: El movimiento de los ojos está determinado por la integridad de los pares craneanos oculomotores III, IV y VI, y de los músculos oculomotores, que en conjunto garantizan la visión binocular y el paralelismo de los ejes visuales de cada ojo al mirar a un determinado punto. La valoración de este parámetro se realiza en relación con la presencia y gravedad de la diplopía y no sólo por la desviación ocular por sí misma.

11.4. Procedimientos para la Calificación de la Deficiencia Visual.

La deficiencia del sistema visual se valora mediante los parámetros de agudeza visual, campo visual (por campimetría o perimetría), cálculo del deterioro del sistema visual, motilidad ocular y finalmente, se valoran otras patologías oculares. Pruebas que deben ser realizado por el médico especialista en Oftalmología, previo diagnóstico clínico .

11.4.1. Procedimiento específico para calificar la deficiencia visual mediante valoración de la agudeza visual.

- a. En primera instancia se debe determinar si el evaluado tiene corrección visual, pues como ya se dijo, se debe valorar con la mejor corrección posible para el ojo derecho y luego para el izquierdo, para finalmente calificar la visión binocular. La agudeza visual es medida por el profesional (oftalmólogo u optómetra) empleando cartillas EDTRS o Colenbrander, que debe reportar la agudeza visual de cada ojo, la binocular y la cercana, preferiblemente en medidas inglesas o decimales.
- b. Para calcular el Puntaje de Agudeza Visual Funcional (PAVF) se toman los valores de agudeza visual evaluados y reportados por el profesional en cualquiera de los dos sistemas de medida posibles para el ojo derecho (OD), el ojo izquierdo (OI) y para ambos ojos (AO, es decir binocular) y se determina cuál es el valor correspondiente a dicha agudeza visual en la Tabla 11.1 (columnas “b” o “c”, dependiendo del sistema utilizado para reportar las tres agudezas citadas).
- c. El puntaje obtenido en el paso anterior se convierte en PAVF para cada uno de ellos, mediante la columna (d) de la tabla citada. El máximo valor que se puede asignar a la PAVF es de 100.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- d. Luego, se determinan los valores de PAVF para el ojo izquierdo (OI), el ojo derecho (OD) y para ambos ojos (AO) y se procede a determinar la agudeza visual mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{PAVF} = \frac{(\text{PAVF AO} \times 3) + (\text{PAVF OI} \times 1) + (\text{PAVF OD} \times 1)}{5}$$

Esto significa, que el factor ponderador de la fórmula es de cinco (5), que se distribuye dando mayor valor a la agudeza visual bilateral (60%, es decir 3), que a las agudezas visuales de cada ojo (20%, es decir 1).

- e. El valor porcentual de la Deficiencia por Agudeza Visual (DAV) se calcula restando de 100 el valor de PAVF, como se indica en la siguiente fórmula:

$$\text{DAV} (\%) = 100 - \text{PAVF}$$

Determinación de la pérdida de la agudeza visual por lectura de cerca (PAVc)

La determinación de la agudeza para leer, es decir la agudeza de visión cercana, es opcional y se determina usualmente de manera binocular. Si la agudeza para la lectura es menor que la PAVF, ésta se debe ajustar con el promedio de las dos, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula, en la cual se determina la Pérdida de Agudeza Visual Global (PAVG):

$$\text{PAVG} = \frac{(\text{PAV} + \text{PAVc})}{2}$$

Si no existe pérdida del campo visual, el valor final de la deficiencia, será el obtenido a través de la agudeza visual.

Tabla 11.1. Deficiencia por pérdida de la agudeza visual funcional.

Rangos de deficiencia - (a)		Sistema inglés (b)	Sistema métrico (c)	Puntaje de Agudeza Visual Funcional (PAVF) - (d)	Deficiencia (% pérdida) - (e)
Visión normal (Visión cercana)	Rango de visión normal	20/12.5	1/0.63	110	
		20/16	1/0.8	105	
		20/20	1/1	100	0
		20/25	1/1,25	95	5
	Visión cercana normal (pérdida leve)	20/32	1/1,6	90	10
		20/40	½	85	15
		20/50	1/2,5	80	20
		20/63	1/3,2	75	25
		20/80	¼	70	30
		20/100	1/5	65	35
Baja visión	Baja visión moderada	20/125	1/6,3	60	40
		20/160	1/8	55	45
		20/200	1/10	50	50
		20/250	1/12,5	45	55
	Baja visión Severa	20/320	1/16	40	60
		20/400	1/20	35	65
		20/500	1/25	30	70
	Baja visión de profundidad	20/630	1/32	25	75

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Rangos de deficiencia - (a)		Sistema inglés (b)	Sistema métrico (c)	Puntaje de Agudeza Visual Funcional (PAVF) - (d)	Deficiencia (% pérdida) - (e)
Ceguera	Ceguera en visión cercana	20/800	1/40	20	80
		20/1000	1/50	15	85
		20/1250	1/63	10	90
		20/1600	1/80	5	95
		20/2000 ó menos	1/100 ó menos	0	
	Ceguera Total	No percepción de luz		0	100

a.b.c.d.e : Tener en cuenta lo señalado en el 11.4.1.

11.4.2. Procedimiento específico para calificar la deficiencia visual mediante campo visual.

Para determinar la pérdida del campo visual se requiere contar con un estudio campimétrico del mismo, que debe ser realizado con una corrección óptima de la agudeza visual, como se indicó anteriormente. Las perimetrias de uso son la cinética y la estática. Se recomienda que el profesional que practica la campimetría, tome en cuenta las siguientes indicaciones técnicas:

- En la *perimetria cinética o manual*, para la valoración de la deficiencia, el estímulo que se debe utilizar es el de la isóptera III-4-e de Goldman. En el aparato de Humphrey se recomienda que el examen se extienda por lo menos hasta los 60°. A pesar de que su uso casi ha desaparecido, se describe para aquellos casos en que se disponga de este campo visual.
- En la *perimetria estática o automática computarizada*, se debe determinar la pseudoisoptera. Se debe evaluar el campo completo de 60° (Humphrey 60-2 o el equivalente), pero se admite un campo de 30° de visión central (Humphrey 30-2 o el equivalente)
- Cuando se comprueba que hay visión luego de los 30° mediante el examen de confrontación, el uso de las campimetrías de los 24 (24-2) grados centrales o menos, para el cálculo, es viable cuando se verifique que no está alterado el campo visual periférico o más allá del campo visual medido.
- La solicitud del campo visual debe especificar que se trata de un proceso de calificación, que examine los 60 grados (o la que se requiera según el caso) con estímulo III blanco. Incluir los diagnósticos y hallazgos clínicos más relevantes, incluida la agudeza visual y la refracción en uso.

Los pasos para calificar la deficiencia por campo visual son los siguientes:

- Determine la extensión del campo visual con la mejor corrección posible para el ojo izquierdo, el derecho y la visión binocular.

Determine el Puntaje de Campo Visual Funcional (PCVF): para ello se toman los valores del campo visual reportados en la perimetria o campimetría; los puntos vistos se ubican en la gráfica de la trama de radios (Figuras 11.1 y 11.2).

Gráfica de la trama de radios: En forma ilustrativa y para tener un acercamiento sobre el valor dado a cada índice se muestra la siguiente gráfica y las figuras 11.1 y 11.3 dada mediante el dibujo de 10 radios, dos en cada uno de los cuadrantes superiores y tres en cada uno de los cuadrantes inferiores. La posición asignada a los 10 radios es la siguiente:

Superior derecho:	25°, 65°
-------------------	----------

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Superior izquierdo:	115°, 155°.
Inferior izquierdo:	195°, 225°, 255°
Inferior derecho:	285°, 315°, 345°

Figura 11.1. Gráfica de trama de radios para el entendimiento de la deficiencia mediante campo visual.

A lo largo de estos radios se distribuyen cinco puntos espaciados cada 2° hasta los 10° centrales (primer círculo concéntrico) y cinco puntos espaciados cada 10° , a partir de los 10° y hasta los 60° o más (es decir, cada círculo alrededor del primero tiene 10°) hasta representar en cada radio 10 puntos para un total de 100 (Figura 11.2).




Figura 11.2. Gráfica de trama de radios para la calificación de la deficiencia visual mediante campo visual de los ojos derecho, izquierdo y binocular (AO como superposición de OD y OI): efecto de una pérdida de campo en sector nasal sobre el campo binocular.

Los radios nasales y superiores pueden alcanzar 60°, pero los temporales e inferiores pueden extenderse más allá. Por lo tanto, el puntaje estándar considerado como normal para un ojo es de 100 puntos o cercano a él. Teniendo en cuenta lo anterior:

- a. El puntaje del campo visual central (10° iniciales) es de 50 puntos, lo cual refleja que el campo central corresponde al 50% de la corteza visual primaria.
 - b. La pérdida del campo visual central (10° iniciales) equivale a una agudeza visual de 20/200.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- c. Las cuadrantopsias y hemianopsias se evalúan con la misma metodología. Una hemianopsia homónima completa recibe un puntaje de 50 puntos. Esto implica que se considera tan discapacitante como una restricción del campo central o una agudeza visual de 20/200.
- d. Los cuadrantes inferiores tienen tres radios y los superiores dos; esto se explica por la aplicación del concepto de que los campos inferiores tienen una mayor importancia funcional que los superiores, por lo cual pesan el 60% del campo visual.

Metodología para el cálculo con la trama de radios en campimetría computarizada:

1. Tome el gráfico numérico de la campimetría computarizada tipo 30-2, la identificará porqué tiene 38 índices numéricos (cuadros) en la parte superior y 38 en la parte inferior, para un total de 76 índices numéricos. Recuerde que la campimetría central 30-2 solo evalúa los 30 grados centrales del campo visual, es decir, en la grilla de puntos evalúa 70 puntos (50 de los primeros 10° y 10 para cada uno de los 20° y 30°); por lo tanto, si la persona no tiene alteraciones en el campo periférico de 40° a 60°, se considerará que los restantes 30 puntos son vistos por la persona a evaluar (10 puntos por cada uno de los grados 40°, 50° y 60°). Cuando se sospeche que hay alteración en el campo visual más allá de los 30° centrales, se debe solicitar la campimetría computarizada a 60° (60-2 o equivalente).
2. Identifique los **índices que son iguales o inferiores a 10 dB**, los cuales se asumirán **como no vistos** y señale los cuadros correspondientes.
3. Para realizar el cálculo del número de puntos vistos puede realizar la siguiente metodología
 - A. Obtenida la campimetría computarizada, se utiliza la siguiente metodología: Identifique en la figura 11.3; 11.4; 11.5 y 11.6 los cuadros donde el puntaje fue inferior a 10 decibeles y asigne a cada cuadro (índice numérico) no visto el valor correspondiente en dicha gráfica: si es una 30-2, según la figura 11.3 y si es 24-2 la figura 11.5. Sume los valores de todos los cuadros no vistos y aproxíme al entero más cercano. Este será el valor de puntos no vistos correspondiente a la campimetría, para encontrar el valor de los puntos vistos, deberá restarlo de 100.
 - B. Para el cálculo del valor de los índices numéricos en puntos de la campimetría periférica 60-2 o 60-4 complementaria de la 30-2 se utilizan los valores a los índices numéricos según la figura 11.4 y se suman a lo obtenido en el punto anterior para completar los 100 puntos de la campimetría. Se procede a reemplazar en la fórmula. Para la 24,2 se utilizan los valores a los índices numéricos según la figura 11.6 y se suman a lo obtenido en el punto anterior para completar los 100 puntos de la campimetría. Se procede a reemplazar en la fórmula.
4. Continúe con los demás pasos ya descritos para determinar la pérdida del campo visual.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

			0,13	0,25	0,25	0,13			
		0,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,13	
	0,13	0,25	0,25	0,38	0,38	0,25	0,25	0,13	
0,13	0,25	0,25	0,5	2	2	0,5	0,25	0,25	0,13
0,25	0,25	0,38	2	6	6	2	0,38	0,25	0,25
0,25	0,5	0,75	2	11	11	2	0,75	0,5	0,25
0,13	0,25	0,5	0,75	2	2	0,75	0,5	0,25	0,13
	0,13	0,25	0,5	0,75	0,75	0,5	0,25	0,13	
		0,13	0,25	0,5	0,5	0,25	0,13		
			0,13	0,25	0,25	0,13			

Figura 11.3 Valores correspondientes a cada cuadro del grafico numérico de una campimetría computarizada 30-2 (Alonso, C; Rodríguez, FE; Suárez, H, junio de 2018).

		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,50	0,50	Interno 30-2					0,50	0,50
0,50	0,50	Interno 30-2					0,50	0,50
0,64	0,64						0,64	0,64
0,64	0,64						0,64	0,64
		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
				0,64	0,64	0,64	0,64	

Figura 11.4. Valores correspondientes a cada cuadro del grafico numérico de una campimetría computarizada 60-4 (campo periférico con un centro de 30°) para cada ojo. (Alonso, C; Rodríguez, FE; Suárez, H, junio de 2018)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”




Figura 11.5. Valores correspondientes a cada cuadro del grafico numérico de una campimetría computarizada 24-2. (Alonso, C; Rodríguez, FE; Suarez, H, junio de 2017)




Figura 11.6. Valores correspondientes a cada cuadro del grafico numérico de una campimetría computarizada 60-4 (campo periférico con un centro de 24°). (Alonso, C; Rodríguez, FE; Suarez, H, junio de 2017)

5. Determine el Puntaje de Campo Visual Funcional (PCVF) mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{PCVF} = \frac{(\text{PCVF AO} \times 3) + (\text{PCVF OI} \times 1) + (\text{PCVF OD} \times 1)}{5}$$

6. Esta fórmula es la combinación de los campos monoculares y el campo binocular en términos de campo visual conservado (Tabla 11.2), considerando que el campo visual funcional normal es del 100%. La fórmula asigna un peso al campo visual residual binocular (PCVF AO) de 60% y al puntaje de cada

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

campo monocular (PCVF OI y PCVF OD) del 20%. El valor porcentual Deficiencia por Campo Visual (DCV) se calcula restando de 100 el valor de PCVF, como se indica en la siguiente fórmula:

$$DCV (\%) = 100 - PCVF$$

Tabla 11.2 Cifras de campo visual de un ojo

Puntaje del gráfico de la trama de radios del campo visual conservado
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

11.4.3. Procedimiento específico para calificar la Deficiencia global del Sistema Visual (DSV).

La deficiencia global del sistema visual se calcula mediante la siguiente fórmula: que integra por el Puntaje de Agudeza Visual Funcional (PAVF) y el Puntaje de Campo Visual Funcional (PCVF):

$$DSV (\%) = 100 - \frac{PAVF \times PCVF}{100}$$

11.4.4. Procedimiento específico para calificar la deficiencia visual por motilidad ocular.

Para efectos de calificar las diplopías se usan los criterios establecidos en la Tabla 11.3:

Tabla 11.3. Deficiencia por diplopías (motilidad ocular)

CRITERIOS	% DEFICIENCIA GLOBAL
Diplopías en zonas altas de la mirada	8
Diplopías en la parte inferior del campo	18
Diplopías en la mirada lateral	15
Diplopías en todas las posiciones de la mirada (no compensables y que obligan a ocluir un ojo)	23

11.4.5. Procedimiento específico para calificar la deficiencia visual por otras patologías oculares

Para determinar la deficiencia total del sistema visual, cuando dos o más de los ítems anteriormente nombrados se encuentran alterados, se debe usar la tabla de combinación de valores. Para los efectos de este capítulo, no se consideran las deficiencias debidas a las deformidades de la órbita y a sus defectos estéticos, puesto que no alteran la función ocular.

Tabla 11.4. Deficiencia global visual debida a lesiones no consideradas en puntos anteriores.

CLASES DE LESIONES	% DEFICIENCIA GLOBAL
Oftalmoplejía interna total, unilateral (acomodación)	23

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Oftalmoplejía interna total, bilateral.	30
Midriasis y lesiones del iris cuando ocasionan trastornos funcionales, unilateral	5
Midriasis y lesiones del iris, bilateral.	7
Ptosis palpebral, pupila descubierta.	5
Ptosis palpebral o blefaroespasio, pupila cubierta bilateral, de acuerdo con agudeza visual en posición primaria (mirada de frente)	20
Deformaciones palpebrales, unilateral	10
Deformaciones palpebrales, bilateral	15
Epífora	10
Fístulas lagrimales	10
Glaucoma bilateral	10
Glaucoma unilateral	5

Estos porcentajes de deficiencia se deben combinar con las otras deficiencias halladas en este capítulo.

Capítulo XII

Deficiencias por Alteraciones del Sistema Nervioso Central y Periférico

12.1. Objetivo. Proporcionar los criterios para la valoración del déficit anatómico y funcional causado por alteraciones permanentes de las diferentes partes del sistema nervioso central y periférico.

12.2. Alcance. Este capítulo valora las siguientes patologías o grupos de patologías: los trastornos del cerebro, de la médula espinal, de los nervios craneales, nervios espinales (plexos y raíces) y nervios periféricos.

12.3. Definiciones y Principios de Evaluación. Para la evaluación del sistema nervioso central y periférico se tendrá en cuenta lo siguiente:

12.3.1. Interpretación de Signos y Síntomas.

Los trastornos del sistema nervioso se pueden presentar acompañados de síntomas generalizados o focales. Los síntomas pueden incluir alteraciones de la conciencia, confusión, pérdida de la memoria, dificultades del lenguaje, cefalea, visión borrosa, visión doble, fatiga, dolor y debilidad facial, zumbido en los oídos, mareo, vértigo, disfagia, disgracia, debilidad en uno o varios miembros, dificultad al caminar o subir escaleras, dolores agudos, adormecimiento y hormigueo de las extremidades, temblor, pérdida de la coordinación, pérdida de control de esfínteres y pérdida de la función sexual.

Muchos de estos síntomas describen el deterioro funcional experimentado por la persona, si bien la evaluación neurológica y las pruebas clínicas complementarias determinan la ubicación anatómica, el plexo y los nervios afectados o sus ramas y por ende la tabla que debe ser utilizada en la calificación. La dificultad al caminar; por ejemplo, puede ser el resultado de problemas del sistema nervioso central, periférico o ambos, igualmente puede ser resultado de una gran variedad de problemas osteomusculares.

12.3.2. Descripción de los estudios clínicos.

Un examen neurológico detallado permite al médico identificar la localización del daño en el sistema nervioso. El propósito de las pruebas complementarias es evaluar la gravedad y establecer la localización de la lesión y confirmar la patología subyacente.

A continuación se describen brevemente los estudios clínicos más comunes para fines diagnósticos dentro de la MMM del sistema nervioso;. Es de anotar que los estudios clínicos a utilizar son aquellos propios de

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

los criterios dados en las respectivas tablas del presente capítulo. Las demás valoraciones son de carácter ilustrativo para un buen entendimiento de este capítulo y las pruebas deben ser aportadas por las profesiones competentes a nivel médico de rehabilitación.

Evaluación y consulta neuropsicológica: Ayudan a caracterizar las alteraciones cognitivas y conductuales. La evaluación neuropsicológica y la batería de pruebas cubren muchos campos funcionales, como la atención, el lenguaje, la memoria, las habilidades viso-espaciales, las funciones ejecutivas, la inteligencia, la velocidad motora y los logros educativos, mediante la aplicación de pruebas con validez y fiabilidad establecidas. El desempeño neuropsicológico es afectado por muchos factores como la edad, la educación, el estado socioeconómico y los antecedentes culturales, influencia que debe ser considerada en la evaluación de los resultados de las pruebas.

Electroencefalograma (EEG): Registra la actividad eléctrica espontánea generada por la corteza cerebral y es útil para el registro del sitio y la clase de descarga eléctrica asociada con la actividad convulsiva. No obstante, un trastorno convulsivo no necesariamente se acompaña de un EEG anormal. Igualmente, muchas enfermedades y anomalías metabólicas producen alteraciones inespecíficas en el EEG. Un EEG puede ser normal en presencia de un examen neurológico claramente anormal, debido a que muchas áreas del cerebro no son accesibles al registro de los electrodos y también porque el EEG se basa en períodos específicos, es decir, normal entre las descargas. De otro lado, en una cantidad significativa de personas asintomáticas “normales” se pueden encontrar alteraciones del EEG.

Potenciales evocados (respuestas evocadas): Son registros de respuestas eléctricas del cerebro a ciertos estímulos; tienen la capacidad de registrar la respuesta del sistema nervioso a múltiples estímulos somatosensoriales, visuales y auditivos.

Tomografía computarizada - TC: Muestra la anatomía del cerebro, la médula espinal, el cráneo y la columna vertebral.

Resonancia magnética - RM: La resonancia magnética nuclear (RMN) es un examen médico no invasivo que, a través de un campo magnético potente y un computador, crea imágenes detalladas de los órganos, tejidos blandos, huesos, y prácticamente el resto de las estructuras internas del cuerpo, permitiendo evaluar mejor varias partes del cuerpo y determinar la presencia de ciertas enfermedades que no se podrían evaluar adecuadamente con otros métodos por imágenes como los rayos X, el ultrasonido o las tomografías axiales computarizadas .

Neuroconducción y electromiografía de aguja – EMG: Sirven para determinar cuáles nervios están afectados y su localización anatómica. También evidencia si las fibras sensoriales o motoras, o ambas, se encuentran predominantemente involucradas y si se encuentra presente una degeneración axonal, una desmielinización o una combinación de ambas. Se debe realizar el estudio comparativo del lado afectado con el asintomático (si lo hay) y se puede complementar con respuestas tardías como la Onda F y el Reflejo H..

12.4. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias.

Metodología de calificación

Determinado el diagnóstico y la región del sistema nervioso comprometida o afectada, es decir, Sistema Nervioso Central o Sistema Nervioso Periférico a la cual corresponde la deficiencia, se califica de la siguiente manera:

12.4.1. Metodología de calificación Sistema Nervioso Central – SNC.

1. Evaluar la deficiencia del SNC es determinar cuál de las siguientes categorías de la deficiencia cerebral es la más severa, de acuerdo con la Tabla 12.1. Criterios para la calificación de la deficiencia

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

por alteraciones de la conciencia, por pérdidas de conciencia episódicas, por trastornos del sueño y vigilia, debida a alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora y por afasia o disfasia.

2. Una vez determinado elija el mayor valor, este será el valor de la deficiencia.

3. En caso de existir otras deficiencias del SNC tales como:

- La deficiencia de los nervios craneales, la función de origen neurológico en las extremidades superiores, (Tabla 12.2.)
- Extremidades inferiores, postura y marcha (Tabla 12.3.)
- Función intestinal función de la vejiga, función sexual y función respiratoria (Tabla 12.4.),
- Disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal (Tabla 12.5),
- Migraña (Tabla 12.6),
- Neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo (Tabla 12.7)
- Sistema nervioso periférico misceláneos (Tabla 12.8)

Se deben combinar los valores hallados con la deficiencia de mayor valor de la Tabla 12.1 utilizando la fórmula de valores combinados para deficiencias presentadas en el numeral 5° del Título Preliminar.

12.4.1.1 Criterios para la calificación de deficiencia cerebral - Tabla 12.1.

Criterios para la calificación de alteraciones de la conciencia y/o de la orientación.

Las personas que experimentan alteraciones de la conciencia presentan una gran variedad de síntomas desde crisis de alteración de la conciencia, hasta un estado vegetativo persistente o un coma sin respuesta.

Criterios para la calificación de deficiencia por trastornos neurológicos episódicos.

Son motivo de calificación los trastornos neurológicos episódicos persistentes y permanentes. La condición episódica implica la ocurrencia de más de un episodio. Sólo serán objeto de valoración el grupo de personas que hayan tenido crisis frecuentes en más de un (1) año y se tendrán en cuenta las del último año a la fecha de calificación.

En los casos de manifestaciones similares causadas por otros sistemas corporales (ej. cardiovascular o respiratorio) que afectan de manera secundaria al SNC, es necesario para su calificación remitirse al capítulo o capítulos correspondientes.

Criterios para la calificación de deficiencia por trastornos del sueño y vigilia.

Los trastornos del sueño y la vigilia incluyen trastornos relacionados con el inicio y mantenimiento del sueño o la incapacidad de dormir; la somnolencia excesiva, incluye el trastorno del sueño inducido por insuficiencia respiratoria y por los horarios de sueño/vigilia.

Los trastornos neurológicos asociados a hipersomnía incluyen el síndrome de apnea del sueño central, la narcolepsia, la hipersomnía idiopática, los desórdenes del movimiento, el síndrome de piernas inquietas, la depresión, los tumores cerebrales, la hipersomnía postraumática, la esclerosis múltiple, la encefalitis y postencefalopatía, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica y los trastornos neuromusculares con apnea del sueño.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Criterios para la calificación de deficiencia por alteraciones del estado mental, cognición y función integradora superior.

La alteración del estado mental, la cognición y la función integradora, incluye el síndrome orgánico cerebral, la demencia y algunas deficiencias específicas, focales y neurológicas, con defectos en la orientación, comprensión, memoria y comportamiento.

Criterios para la calificación de deficiencia por alteraciones de la comunicación (disfasia y afasia).

La comunicación involucra la comprensión, el entendimiento, el lenguaje y una interacción efectiva entre varias personas.

Criterios para la calificación de deficiencia por alteraciones emocionales o conductuales.

Los trastornos emocionales, del humor y del comportamiento ilustran la relación que existe entre los trastornos neurológicos y los trastornos mentales y del comportamiento.

Los trastornos emocionales secundarios a las alteraciones neurológicas verificables (ej. trauma o lesión craneal) se califican con los criterios de este capítulo (excepto las derivadas de patología mental).

Tabla 12.1. Criterios para la calificación de la deficiencia por alteraciones de la conciencia, por pérdidas de conciencia episódicas, por trastornos del sueño y vigilia, debida a alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora y por afasia o disfasia.

Criterios para la calificación de la deficiencia por alteraciones de la conciencia.					
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0%	25%	50%	75%	100%
Descripción	Sin alteración en el estado de conciencia.	Letárgico ó somnolencia: alerta pero, existe dificultad en la orientación temporal y/o espacial.	Obnubilado	Estuporoso	Semicoma o coma irreversible
Criterios para la calificación de la deficiencia causada por pérdidas de conciencia episódicas ^{1*} .					
Descripción del trastorno paroxístico	Sin alteración en el estado de conciencia	Presenta uno a dos episodios anuales	Presenta entre 3 y 11 episodios al año	Presenta de 1 a 3 episodios mensuales de epilepsia	Trastorno paroxístico incontrolado ó refractario Y Presenta 4 ó más episodios mensuales
	No aplica	No aplica	No evidencia de deterioro de las funciones cerebrales	Evidencia de deterioro leve de las funciones cerebrales	Evidencia de deterioro moderado a severo de las funciones cerebrales
^{1*} Cuando reúne el primer criterio por frecuencia de los episodios dado en la clase 3 o 4 y el segundo criterio, no evidencian deterioro de las funciones cerebrales, se otorga un valor equivalente a la clase 2.					
Criterios para la calificación del deterioro causado por trastornos del sueño y vigilia.					
Alerta, rendimiento y concentración (insomnio, somnolencia, problema del ritmo del sueño y conductas que interrumpen el sueño)	Normal durante el día	Disminuidos en forma ocasional	Disminuida en forma frecuente.	Disminuidos en forma continua	Disminuidos en forma continua y severa
Criterios para la calificación de la deficiencia neurológica debida a alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora.					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Examen del estado para personas con afecciones neurológicas (Pruebas neuropsicológicas)	Normal	Presencia de déficit en atención, concentración u otras funciones mentales, que pueden compensarse con ayudas adecuadas	Además de lo anterior, existen alteraciones en la orientación, cognoscitivas y sensoriomotoras (afasias, apraxias, agnosias).	Además de los déficits anteriores, la persona presenta alteraciones en la organización de la conducta, en las operaciones intelectuales, disminución del nivel de abstracción, de la capacidad de aprendizaje, que dificultan la organización consciente y voluntaria de la conducta.	Presencia importante de todas o algunas de las alteraciones anteriores y deterioro marcado de automatismos sensorio-motores que están en la base del autocuidado.
Criterios para la calificación de la deficiencia por afasia o disfasia.					
Alteración en la comprensión y producción de símbolos del lenguaje.	Sin alteración	Falta de fluidez en la articulación, y presenta una dificultad para encadenar distintas articulaciones en un orden gramático correcto, aunque el proceso en sí no se ve afectado.	Las personas tienen dificultad en establecer el significado de una frase de acuerdo con las posiciones de las distintas palabras dentro de la estructura gramatical.	Presenta dificultades para organizar las ideas y transformarlas en verbalizaciones. Generalmente presenta déficit en la iniciativa de expresarse espontáneamente, siendo las expresiones estereotipadas.	El lenguaje oral está prácticamente abolido en todos sus aspectos: sensoriales, prácticos y motores. Generalmente este trastorno va asociado a una hemiplejia

12.4.1.2. Criterios para la calificación de deficiencia por disfunción de la médula espinal y trastornos del movimiento.

Disfunción de la médula espinal: Las deficiencias causadas por lesiones en la médula espinal incluyen las relacionadas con la postura y marcha, el empleo de las extremidades superiores, la respiración, la función urinaria, la función anorrectal, la función sexual y el dolor.

La deficiencia se determina de acuerdo con la severidad del deterioro funcional de la extremidad y los órganos comprometidos y el nivel de la lesión. Para los casos de las extremidades no son aplicables la graduación de la fuerza muscular dados en los criterios del Medical Research Council (Concejo de Investigación Médica) del Reino Unido de la Tabla 12.11.

Para la calificación de la persona con una lesión de médula espinal con alteraciones en varios sistemas o funciones (ej. extremidades superiores, extremidades inferiores, vejiga, intestinos, desempeño sexual o alteraciones respiratorias de origen neurológicos), se utilizarán las Tablas 12.2 a 12.8 y se aplica la suma de valores combinados por cada una de las deficiencias calificadas..

El dolor disestésico causado por un deterioro de médula espinal se califica utilizando la Tabla 12.9. Cuando estén presentes otros trastornos tales como, lesiones tróficas, cálculos urinarios, osteoporosis, desórdenes nutricionales, infecciones y estados psicológicos reactivos, deberán ser calificados con los criterios del capítulo correspondiente y proceder a la combinación respectiva.

Trastornos del movimiento: Los trastornos del movimiento causados por disfunciones cerebrales (tics, temblores en reposo, posturales e intencionales, corea, atetosis, hemibalismo y distonía, dificultad para la coordinación de los movimientos finos) se evalúan a través de su interferencia en el uso de las extremidades superiores e inferiores (Tablas 12.2 y 12.3).

12.4.1.3. Criterios para la calificación de deficiencia de las extremidades superiores por disfunción del sistema nervioso central.

El valor de la deficiencia del miembro superior dominante representa una deficiencia mayor de lo que sería en el caso del miembro no dominante.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

En aquellos casos que presente más de una deficiencia en la misma extremidad, al aplicar la suma de valores combinados, el valor final de la deficiencia no debe superar el valor correspondiente al dado por amputación en el mismo nivel.

La Tabla 12.2. contiene los criterios para calificación de las deficiencias de las extremidades superiores por cualquier lesión en el cerebro o en la médula espinal.

Cuando el trastorno de médula espinal afecta ambas extremidades superiores y la severidad de la deficiencia de cada extremidad, cumple con los criterios de las clases 0, 1 y 2 se deben combinar los valores. Para ello se debe calcular el valor de la deficiencia de la extremidad dominante y combinarlo con el de la no dominante. Las consideraciones de este aparte se aplican cuando la severidad de la deficiencia de una de las extremidades corresponde a las clases 0, 1 y 2 y la otra extremidad a las clases 3 y 4.

Para aquellos eventos en los cuales la severidad del compromiso de ambas extremidades superiores corresponde a las clases 3 y 4, se asignará un valor de deficiencia global del ochenta por ciento (80%) sin aplicar las tablas.

Tabla 12.2. Criterios para la calificación de la deficiencia por disfunción de una extremidad superior por alteración del SNC (cerebro o médula).

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0%	20%	40%	50%	60%
		No dominante	No dominante	No dominante	No dominante
		25%	45%	55%	65%
		Dominante	Dominante	Dominante	Dominante
Descripción	La persona no sufre ninguna alteración de las funciones de las extremidades superiores	Alguna dificultad en la destreza de mano y dedos	No tiene destreza en mano y dedos	Le sirve como extremidad auxiliar	No tiene ninguna funcionalidad

12.4.1.4. Criterios para la calificación de deficiencia por trastornos de la postura, la marcha y el movimiento.

La incapacidad para mantener el equilibrio y una marcha estable puede deberse a una alteración del SNC o del sistema nervioso periférico - SNP.

La calificación de la deficiencia para los trastornos de postura y marcha se determina de acuerdo con su impacto en la deambulación (Tabla 12.3).

Si se presentan cambios anatómicos o funcionales de otros sistemas corporales, como el sistema osteomuscular, estos deben combinarse con los valores calificados para postura y marcha.

En aquellos casos que presente más de una deficiencia en la misma extremidad, al aplicar la suma de valores combinados, el valor final de la deficiencia no debe superar el valor correspondiente al dado por amputación en el mismo nivel.

Tabla 12.3. Criterios para la calificación de la deficiencia por trastornos de postura y marcha (por compromiso de una extremidad inferior)

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0%	10%	20%	35%	50%

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Trastorno de postura o marcha	Ningún trastorno de postura o marcha	Se levanta y se pone de pie; camina, pero, lo hace con dificultad en subida, con gradas, en escaleras y/o grandes distancias	Se levanta, puede sostenerse de pie y camina limitado a superficies planas	Puede ponerse de pie pero no puede caminar.	No se puede poner en pie ni caminar.
-------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------

12.4.1.5. Criterios para la calificación de deficiencia por disfunción del intestino, de la vejiga, sexual y respiratoria por causa neurogénica (Tabla 12.4).

Intestinal: La capacidad para controlar las deposiciones proporciona el criterio para la evaluación de la deficiencia por la disfunción del ano y recto causado por alteraciones en la médula espinal y el SNC.

Urinaria: La capacidad para controlar la micción proporciona el criterio para la evaluación de la deficiencia por disfunción de la vejiga a causa de trastornos de la médula espinal y el SNC. Al evaluar la deficiencia se debe considerar el estado del tracto urinario superior, si se encuentra alguna deficiencia, esta debe ser evaluada con los criterios del Capítulo V, Sistema Urinario y Reproductor y combinar los valores utilizando la tabla del Apéndice para su ponderación.

Sexual: La capacidad de sentir y experimentar un orgasmo es el criterio para evaluar la deficiencia por alteración neurogénica de la función sexual por trastornos de la médula espinal u otros desórdenes neurológicos. En la evaluación se debe considerar el desempeño sexual previo de la persona; la edad es solo uno de los criterios para la evaluación del desempeño sexual previo. El ajuste por la edad deberá realizarse de acuerdo con los criterios señalados en el Capítulo V del Sistema Urinario y Reproductor.

Respiratoria: La deficiencia por disfunción neurogénica respiratoria señalada en la Tabla 12.4. se refiere a las limitaciones neurológicas. Los demás aspectos de la función respiratoria se establecen en el Capítulo III del Sistema Respiratorio.

Tabla 12.4. Criterios para la calificación de deficiencia por disfunción del intestino, de la vejiga, sexual y respiratoria por causa neurogénica.

Disfunción neurogénica del intestino.						
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	10%	15%	20%	25%	
Descripción	Controla completamente los esfínteres sin un tratamiento especial	Control de los esfínteres mediante tratamiento intestinal	Incontinente más o menos una vez a la semana a pesar de un tratamiento intestinal bien llevado	Incontinente más o menos una vez al día a pesar de un tratamiento intestinal bien llevado	Completamente incontinente	
Disfunción neurogénica de la vejiga.						
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	5%	10%	15%	20%	
Descripción	Controla completamente los esfínteres sin un catéter o mecanismo externo	Control voluntario menor de lo normal pero no hay incontinencia con un programa de control urinario	Requiere de un catéter interno o externo para mantener la continencia	Incontinente más o menos una vez al día a pesar de un programa de control urinario bien llevado	Incontinencia total	

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Disfunción sexual neurogénica.						
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	5%	10%	15%	NA	
Descripción	No existe un Deterioro en la función Sexual	La persona posee cierta función sexual pero con dificultades de erección o eyaculación en los hombres, o ausencia de percepción, excitación o lubricación en uno u otro sexo	Funció sexual refleja, pero sin percepción	No existe función sexual		
Disfunción respiratoria neurogénica.						
CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	CLASE 5
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	10%	20%	40%	60%	80%
Descripción	No existe un deterioro neurogénico de la respiración	La persona puede respirar espontáneamente pero tiene dificultad respiratoria, en ejercicios extenuantes ó actividades que requieren un esfuerzo intenso, tales como correr	La persona es capaz de respirar espontáneamente pero tiene restricción para el ejercicio, tales como escalar o ejercicio prolongado ó Tiene que caminar más lento o debe detenerse en caminatas en terreno plano.	La persona no puede caminar más de 100 metros sin detenerse por disnea ó es capaz de realizar solamente actividades sedentarias	Traqueostomía permanente	La persona no tiene la capacidad para respirar espontáneamente es dependiente de respiración artificial

12.4.1.6. Criterios para la calificación de deficiencia por neuropatía periférica, trastornos neuromusculares articulares, miopatías y dolor crónico somático.

En la evaluación del sistema nervioso periférico, se debe documentar la magnitud de la pérdida de las funciones causada por el déficit sensorial, dolor o malestar; la pérdida de fuerza muscular y el control de los músculos o los grupos musculares específicos y la alteración del sistema nervioso autónomo - SNA.

El valor de la Deficiencia Global por Dolor se obtiene de la Tabla 12.5 y se combina con los valores de deficiencia de los demás capítulos.

Trastornos articulares neuromusculares: El deterioro neuromuscular por miastenia grave o síndromes miasténicos se acompaña con debilidad proximal. La deficiencia se califica de acuerdo con los criterios de las Tablas 12.2 y 12.3.

Miopatías: Las miopatías representan un grupo variado de trastornos que incluyen distrofia muscular, miopatía metabólica, metabolismo de potasio anormal y enfermedad muscular, miopatías endocrinas y enfermedad muscular inflamatoria. La característica clínica común es una debilidad proximal que, en algunos casos, puede incluir el cuello y el rostro. La debilidad proximal se califica de acuerdo con los criterios de las Tablas 12.2 y 12.3 y para los nervios craneales, las tablas del capítulo sobre oído, nariz, garganta y vías respiratorias superiores.

12.4.1.7. Criterios para la calificación de deficiencia por neuropatía periférica y dolor disestésico: Se debe documentar que la persona sufre de una neuropatía periférica o de una lesión de la médula espinal consistente con el dolor disestésico. El déficit causado por neuropatías periféricas puede afectar las funciones motoras, sensoriales y autónomas del sistema nervioso.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Sistema Nervioso Autónomo - SNA: La función del SNA puede originar dificultades con el ortostatismo al igual que con las funciones gastrointestinal, urológica y sexual. Los trastornos de disfunción digestiva (ej. gastroparesis) se deberán clasificar con los criterios del Capítulo de las deficiencias del Sistema Digestivo. Las disfunciones urológicas, anorrectales y sexuales causadas por neuropatía periférica, deben calificarse con los criterios contenidos en la Tabla 12.4.

Funciones motoras, sensoriales: Muchas neuropatías periféricas se presentan con disfunción sensorial con poca o nula evidencia de disfunción motora autonómica. Las complicaciones relacionadas con las neuropatías periféricas (ej. úlceras tróficas y artropatía neurogénica, o la articulación de Charcot) se califican con los criterios de los capítulos respectivos.

Igualmente muchas neuropatías periféricas solo presentan disfunción motora, sin comprometer lo sensorial o el compromiso puede ser mixto.

En aquellos casos que hay un compromiso motor evidente severo o muy severo según la Tabla 12.11 solo se debe aplicar la Tabla 12.2 o 12.3.

Dolor crónico somático: Se refiere a un dolor que persiste por largo tiempo. La IASP lo define como aquel cuyo curso sea mayor de tres meses y que persista aún después del tiempo esperado de recuperación de la enfermedad que lo causó (por ejemplo, el tiempo razonable para que sane una herida). También se puede definir como aquel dolor asociado con un proceso patológico crónico que causa dolor continuo o recurrente. Para ello se aplica la Tabla 12.5 siempre y cuando presente pérdida de masa y coordinación muscular, osteoporosis, fibrosis y rigidez articular, cuando la menor fuerza muscular puede llevar a una alteración respiratoria restrictiva o en el sistema digestivo, se observa una reducción de la motilidad y la secreción, además de constipación y desnutrición. No incluye el síndrome doloroso crónico de columna y en aquellas otras deficiencias que involucran dolor en los criterios, según tabla correspondiente.

Con frecuencia ocurre retención urinaria e infección. También suele haber depresión, confusión, alteraciones del sueño y disfunción sexual. La respuesta inmunitaria está alterada por el estrés y la desnutrición.

En su sentido estricto, incluye el dolor originado en cualquier parte del cuerpo que no sean nervios (SNP) o del sistema nervioso central; sin embargo, frecuentemente se habla de “dolor somático” cuando los receptores están en la piel, músculos o articulaciones y de “dolor visceral” cuando los receptores activados por el estímulo están en una víscera. El dolor somático es habitualmente bien localizado y la persona no tiene grandes dificultades en describirlo. El dolor visceral, en cambio, es menos localizado y puede ser referido a un área cutánea que tiene la misma inervación.

Tabla 12.5. Deficiencia por dolor crónico somático y visceral .

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	5%	10%	15%	20%
Descripción	No existe dolor (0 puntos- EVA)	(1-2 puntos según EVA)	(3-5 puntos según EVA)	(6-8 puntos según EVA)	(9-10 puntos según EVA)

* Escala Visual Análoga de Dolor (EVA):

Procedimiento para Calificar la Deficiencia por Alteraciones Causadas por Dolor Contemplada en la Tabla 12.5.

- Establecer el diagnóstico de la patología que origina el dolor. Se califica solo la patología que genere mayor dolor, independiente que tenga una o más patologías que lo generen.
- Establecer si la persona ha alcanzado la Mejoría Médica Máxima – MMM, o ha terminado el proceso de rehabilitación integral, no obstante, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.
- Si la persona no cumple con lo señalado en el literal “b”, se procede a determinar si satisface los criterios de elegibilidad para la calificación:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- 1. Se ha determinado que el dolor tiene una causa médica explicable, es decir, está descrito como un síndrome médico.
- 2. El dolor ha sido identificado por el médico tratante y la persona como un problema grave.
- 3. La condición de la persona no puede ser calificada de acuerdo con los principios descritos en los capítulos de deficiencia diferentes a éste.
- 4. Para apoyar este punto, el caso debe ser evaluado, si así lo amerita, por el o los médicos que manejan el dolor, que debe incluir una valoración por psiquiatría.
- d. Aplicar la Tabla 12.5. que determina el grado de dolor relacionado con la deficiencia (que lo clasifica en ninguno, leve, moderado, severo o máximo) para definir la Deficiencia Global correspondiente.
- e. La valoración de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, por evento, se hará en forma integral, independientemente que tenga uno o varios segmentos, estructuras, órganos o sistemas afectados. El valor de la deficiencia global por dolor se combina con los valores obtenidos en las demás deficiencias dadas en otros capítulos.

El dolor agudo no se puede calificar por este aparte.

12.4.1.8. Criterios para la calificación de deficiencia relacionada con el Síndrome Doloroso Regional Complejo.

El Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC), también conocido como Reflex Sympathetic Dystrophy (Distrofia Simpática Refleja) (RSD) Tipo I se califica de acuerdo con las Tablas 12.18 (MMSS) y 12.19 (MMII) y el SDRC tipo II se califica con base en las tablas contenidas para calificar la deficiencia neurológica en extremidades superiores (Tabla 12.14) e inferiores (Tablas 12.16) de este capítulo.

12.4.1.9. Criterios para la calificación de deficiencia relacionada con cefalea y migrañas.

Los criterios de gravedad descritos en el Capítulo **Metodología para la calificación de las deficiencias (Título Primero)**

describen la severidad funcional en la Tabla 4 y la frecuencia en el tiempo en la Tabla 3. En este aparte se incluyen las cefaleas postraumáticas. El valor obtenido se debe combinar con las demás deficiencias de este capítulo.

Tabla 12.6. Calificación de las deficiencias por Cefaleas - migraña.

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
Deficiencia global (%)	0%	2%	3%	4%	5%
Descripción de la sintomatología	Severidad	Nunca hay migrañas	Leve y ocasionalmente	Moderado y frecuente	Severo y continuo

12.4.1.10. Criterios para la calificación de deficiencia relacionada con neuralgia del trigémino y glosofaríngea.

Debido a que generalmente no existe deterioro neurológico evidente, excepto por el punto gatillo en la neuralgia del trigémino o la alodinia en la neuralgia post herpética, el dolor típico severo e incontrolable puede ser la deficiencia. Ocasionalmente los especialistas pueden observar personas con dolor similar debido a una neuralgia glosofaríngea. Tanto el dolor facial atípico episódico como el dolor típico neurálgico, se califican con los parámetros de la Tabla 12.7. No se deben considerar otras tablas que se relacionen con deficiencias por disestesias o dolor relacionadas con estos nervios.

Tabla 12.7. Criterios para la calificación de la deficiencia por neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo unilateral o bilateral.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 3
Deficiencia global (%)	0%	1%	5%	10%	20%
Descripción	No existe neuralgia	Dolor neurálgico facial leve incontrolable.	Dolor neurálgico facial moderado incontrolable	Dolor neurálgico facial severo incontrolable	Dolor neurálgico facial muy severo incontrolable

12.4.1.11. Criterios para la calificación de deficiencia de nervios periféricos misceláneos de cabeza tronco.

Los criterios para la mayoría de neuropatías craneales (centrales o periféricas) están descritos en los capítulos de alteraciones visuales y alteraciones de oído, nariz, garganta y vías aéreas superiores. Los criterios para la calificación de la mayoría de neuropatías focales están en los capítulos de calificación de las deficiencias de extremidades superiores e inferiores.

El propósito de la Tabla 12.8. es brindar criterios para calificar los nervios periféricos misceláneos que no se encuentran en otras secciones del Manual. En caso de presentar el compromiso de varios nervios de los calificables, por medio de esta tabla se deben calificar cada uno y combinar los valores. Esta regla no aplica en el caso de los nervios intercostales.

Tabla 12.8. Criterios para la calificación de nervios periféricos misceláneos

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0%	1%	5%	10%
Nervios occipital mayor, occipital menor, auricular mayor, intercostal, genitofemoral, ilioinguinal, iliohipogástrico, pudendo	No existe neuralgia	Pérdida sensorial únicamente en una distribución anatómica	Dolor neurogénico de leve a moderado en una distribución anatómica	Dolor neurogénico severo en una distribución anatómica

12.4.2. Principios de Evaluación para SNP por Alteración de los Nervios Periféricos de las Extremidades Superiores.

Es la metodología para valorar las deficiencias por alteraciones de los nervios de la mano y los dedos, del plexo braquial, de los nervios periféricos y síndromes por atrapamiento.

En aquellos casos que presente más de una deficiencia en la misma extremidad, al aplicar la suma de valores combinados, el valor final de la deficiencia no debe superar el valor correspondiente al dado por amputación en el mismo nivel. Es de precisar que las pruebas correspondientes a las Tablas 12.9, 12.11 y 12.14 deben ser realizadas por profesionales en Neurología, Fisiatría y Terapia Ocupacional, al ser estas las disciplinas que tienen que ver con la aplicación y estudio de estas pruebas.

Dominancia: Esta se calcula únicamente al obtener la deficiencia final sin ponderar para los daños del miembro superior dominante, de manera tal que se combina primero el valor de la deficiencia del Sistema Nervioso Periférico con las obtenidas del miembro superior dominante, Capítulo XIV y se aplica la metodología establecida en el numeral 14.4, (Pasos para obtener el valor final de la deficiencia global de la estructura o extremidad corporal dominante)

12.4.2.1. Metodología para calificar la deficiencia del SNP debida a alteraciones de los nervios periféricos de los dedos.

Esta aparte evalúa la deficiencia de los dedos por trastornos del sistema nervioso periférico.

Las manifestaciones ocasionadas por lesiones nerviosas periféricas tales como dolor, restricción del movimiento, atrofia, cambios vasomotores, tróficos y reflejos, están incluidos en los valores de la deficiencia

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

consignados en las tablas de esta sección “ALTERACIÓN DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES”; por lo tanto, cuando la deficiencia se deba estrictamente a un disturbio nervioso periférico, no se debe aplicar ninguna otra tabla o metodología de calificación del Capítulo de Extremidades Superiores.

Metodología para la calificación de la deficiencia por déficit de los nervios de los dedos.

Criterio Único: Nivel de afectación por longitud: diagnóstico topográfico del nivel de la lesión.

Graduación de la severidad (Tabla 12.9) mediante la valoración de las funciones del nervio:

Déficit sensorial: La *sensación* es la percepción de estímulos mientras que la *sensibilidad* es la apreciación e interpretación consciente del estímulo producido por la sensación. Para la evaluación de la función sensorial de la mano se toman en consideración todas las modalidades de sensibilidad, es decir, sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, el estiramiento y el tacto desplazado: mediante las pruebas de: monofilamentos (Gramos de fuerza: GF), Discriminación de 2 puntos, que deben ser aplicadas por disciplinas competentes(fisiatría, neurología y terapia ocupacional)

Déficit motor: La evaluación del déficit motor se basa en las pruebas de fuerza muscular (dinamómetro y pinzómetro), la atrofia muscular ayuda a objetivar la disfunción motora y los estudios electromiográficos pueden confirmar la función motora de músculos específicos o grupos musculares.

Procedimientos Generales.

Metodología de Calificación: Para determinar la deficiencia por deterioro de los nervios de los dedos se deben seguir los siguientes pasos:

1. Evaluar la severidad de la lesión por el déficit sensorial (Tabla12.9).
 - a. **Sensorial:** Para ello clasifique los resultados de la prueba de discriminación de 2 puntos; para identificar la calidad sensorial o el tipo de pérdida sensorial para el pulgar y cada uno de los dedos.
 - b. **Déficit motor:** Gradúe de 0 a 5 la fuerza muscular, según los criterios del Medical Research Council (Concejo de Investigación Médica) del Reino Unido (Tabla 12.11).
2. Determine el *nivel de afectación (longitud digital)* mediante la escala inferior para la afectación de los nervios (lado radial y lado cubital) de la Figura 12.2. para el pulgar y meñique o la Figura 12.3. para los dedos anular, medio e índice.
3. Identificar el tipo de *Nivel de afectación por longitud*:
 - a. Pérdida sensorial longitudinal (1 nervio) y/o
 - b. Pérdida transversal (ambos nervios) para el pulgar y cada uno de los dedos.
 - c. De acuerdo con el(s) dedo(s) afectado(s), utilice la Tabla 12.10. Deficiencia de los dedos por pérdida de la sensibilidad longitudinal y transversal en todos los dedos según la longitud comprometida, con el fin de determinar la deficiencia del dedo por la pérdida sensorial total o parcial, transversal o longitudinal (nervio de la cara cubital o radial), de acuerdo al porcentaje de la longitud digital afectada.
4. Si ambos nervios digitales del mismo dedo están afectados, pero a niveles muy diferentes (longitud digital) o con diferentes severidades sensoriales (una posee pérdida parcial y la otra pérdida total), las deficiencias sensoriales relacionadas con los nervios cubital o radial de los dedos se determinan individualmente y los resultados se suman aritméticamente.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

5. En caso de que un dedo tenga más de una deficiencia (restricción de movimiento no neurológica o amputación por ejemplo), obtenga el valor de la deficiencia del dedo y combine (mediante la fórmula de valores combinados) con otras deficiencias.

Deterioro de la calidad sensorial: La deficiencia de calidad sensorial se clasifica de acuerdo con la Tabla 12.9.

Tabla 12.9. Clasificación del deterioro de la calidad sensorial.

Pérdida Sensorial ^{*1}	Discriminación de dos puntos (mm)	Monofilamentos (gramos de fuerza para responder al estímulo sensorial)	Pérdida sensitiva
Sensibilidad normal	≤ 6	≤ 2.83 g	Ninguna
Pérdida sensorial parcial	7 a 15 mm	$>2.83 - \leq 6.65$ g	Parcial (localización pobre y respuesta anormal a los estímulos sensoriales)
Pérdida sensorial total	> 15 mm	> 6.65 g	Total (la respuesta al tacto, pinchazo, presión y estímulos vibratorios están ausentes)

*1Para asignar el grado de severidad sensitivo (parcial o total), se clasificará con las tres variables (discriminación de dos puntos, prueba de monofilamentos y pérdida sensitiva) si dos de ellas se encuentran en el mismo grado de severidad sensitiva, este será el asignado y si se encuentran en grados diferentes se tomara el intermedio.

12.4.2.2. Deficiencia del nervio digital.

Las lesiones nerviosas pueden ocurrir a cualquier nivel, desde los pulpejos hasta la articulación MCF. El pulgar tiene un valor diferente respecto de la mano, que los dedos índice y medio, los cuales poseen también valores diferentes al del anular y al meñique. Los nervios de los dedos de la región cubital (ulnar) poseen valores más altos que los nervios de la región radial en el pulgar y el meñique, y menor en los dedos restantes (ver Figura 12.1).




Figura 12.1. Deficiencia de la mano por pérdida sensorial total transversal (números en las puntas de los dedos) y pérdida sensorial longitudinal total en cara radial y cubital (ulnar) (números a los lados de los dedos) que involucra el 100% de la longitud de los dedos.

Consideraciones especiales de calificación: Los defectos de sensibilidad en las superficies dorsales del pulgar y los dedos no se consideran como deficiencia.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Esta clasificación se utiliza sólo para los deterioros causados por lesiones de los nervios del pulgar y de los dedos.

No sustituye la selección del grado de severidad de los déficits sensoriales o del dolor ocasionado por un trastorno nervioso periférico proximal.

Porcentaje de longitud del dedo comprometida.

La distribución o área de la pérdida sensorial se determina mediante el nivel de afectación (porcentaje de longitud afectada del dedo) de ambos nervios digitales (pérdida sensorial transversal) o de un nervio digital, sea en el lado radial o cubital del dedo (pérdida sensorial longitudinal).

El porcentaje de la longitud afectada del dedo se obtiene de la escala superior de la Figura 12.2 para el pulgar y de la Figura 12.3 para el resto de los dedos. En la mayoría de los casos, el punto donde comienza la pérdida sensorial de un dedo, es el nivel en el cual se encuentra la cicatriz de la herida que causó la pérdida sensorial.

Figura 12.2. Pérdida sensorial transversal total para el pulgar (escala inferior). La pérdida sensorial transversal total corresponde a 50%.





Figura 12.3. Pérdida sensorial transversal total para el resto de los dedos (escala inferior). La pérdida sensorial transversal total corresponde a 50%



Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tablas de calificación para deficiencias Global de todos los dedos (a nivel sensitivo).

Tabla 12.10. Deficiencia Global de los dedos por pérdida de la sensibilidad longitudinal y transversal en todos los dedos según la longitud comprometida.

Pulgar						
Porcentaje de longitud del dedo comprometida	Deficiencia Global (DG%)					
	Pérdida sensorial transversal		Pérdida sensorial longitudinal			
	Ambos nervios digitales		Nervio cubital digital		Nervio radial digital	
	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial
100	11	5,5	6,5	3,5	4,5	2,5
90	10,5	5	5,5	3	4,5	2
80	10	4,5	5	2,5	3,5	2
70	8	4	4,5	2	3	1,5
60	7	3,5	4	2,5	2,5	1
50	5	3	3,5	2	2	1
40	4,5	2,5	3	1,5	2	1
30	3,5	2	2,5	1	1,5	1
20	2	1,5	1,5	1	1	1
10	1	1	1	0,5	0,5	1

Índice y medio						
Porcentaje de longitud del dedo comprometida	Deficiencia Global (DG%)					
	Pérdida sensorial transversal		Pérdida sensorial longitudinal			
	Ambos nervios digitales		Nervio cubital digital		Nervio radial digital	
	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial
100	5,5	2,5	2,5	1,3	4	2
90	5	2,5	2,5	1,3	3,5	1,8
80	4,5	2	2	1	3,5	1,8
70	4,5	2	2	1	3	1,5
60	4	2	2	1	3	1,5
50	3,5	1,5	1,5	0,8	2,5	1,3
40	3	1,5	1,5	0,8	2	1
30	2,5	1	1	0,5	2	1
20	1,5	1	1	0,5	1	0,5
10	1	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3

Anular y meñique						
Porcentaje de longitud del dedo comprometida	Deficiencia Global (DG%)					
	Pérdida sensorial transversal		Pérdida sensorial longitudinal			
	Ambos nervios digitales		Nervio cubital digital		Nervio radial digital	
	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial
100	2,5	1,5	1,5	1	1	0,5
90	2,5	1,5	1,5	1	1	0,5
80	2	1,5	1,5	1	1	0,5
70	2	1,5	1,5	1	1	0,5
60	1,5	1	1	1	1	0,5
50	1,5	1	1	0,5	0,5	0,25
40	1	1	1	0,5	0,5	0,25

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

30	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

12.4.2.3. Calificación de la deficiencia por neuromas digitales.

La severidad del dolor y la disminución de la función relacionada con neuromas de los nervios de los dedos se clasifican como una pérdida nerviosa total o parcial:

- a. El término *pérdida nerviosa total* se utiliza para describir un neuroma con anestesia y síntomas distales severos suficientes para impedir el funcionamiento del dedo y se le asigna el 100% del valor correspondiente al nervio afectado, de acuerdo con la T-tabla 12.10.
- b. El término *pérdida nerviosa parcial* describe un neuroma con anestesia distal que causa una disminución significativa en el funcionamiento del dedo y se le asigna el 50% del valor, de acuerdo con las Tablas 12.10.

La deficiencia total del dedo o su segmento no puede exceder el 100% del valor de deficiencia global asignado por la amputación de los mismos mediante cualquiera de los métodos.

12.4.2.4. Deficiencia por alteraciones del nervio periférico y plexo braquial.

Los criterios para la calificación de la deficiencia derivada de patologías que afectan los nervios periféricos y el plexo braquial de las extremidades superiores (excepto los generados por atrapamiento) son:

Criterio 1. El diagnóstico topográfico de la lesión (Factor principal): La deficiencia por una lesión de los nervios periféricos está definida por los nervios específicos involucrados mediante dos indicadores denominados: déficit sensorial-síndrome regional complejo II (SDRC II) y el déficit motor Tabla 12.1 que expresa elementos clínicos sintomáticos.

Criterio 2. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. (Factor Modulador). Estudios de conducción nerviosa.

Procedimientos Generales.

Metodología de calificación.

- a. Identificar el nervio lesionado (ver la tabla de lesión neurológica que corresponda) (Figura 12.4)
- b. Para las lesiones del plexo braquial utilice la Tabla 12.12 (“Deficiencias de las extremidades superiores por deterioros del plexo braquial unilateral”); para las lesiones de los nervios periféricos, utilice la Tabla 12.13 (Deficiencia de las extremidades superiores por deterioro de los nervios periféricos) y para lesiones por atrapamiento utilice Tabla 12.14. (“Graduación de la Severidad de la Neuropatía compresiva o por atrapamiento”).
- c. Identifique el factor principal y clasifíquelo de acuerdo con el grado de severidad por el déficit sensorial y motor, tal como se señala en los principios de evaluación de esta sección, mediante la tabla 12.11; el déficit puede ser: ninguno, leve, moderado, severo o muy severo.
- d. Una vez determinada la gravedad del factor principal, identifique la clase y aplique el factor modulador para cada uno de los elementos del criterio 1 (déficit sensorial y el déficit motor)
- e. Seguir los pasos descritos en el numeral 5° del Título Preliminar, al utilizar la metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia.
- f. Para obtener el valor final de la deficiencia global por tronco del plexo braquial, se deben sumar aritméticamente las deficiencias globales obtenidas por cada uno de los elementos: déficit sensorial y el déficit motor del criterio 1: diagnóstico topográfico.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- g. En caso de existir compromiso de varios troncos y nervios periféricos, se debe seguir el paso anterior (f) para cada uno de ellos y combinar los valores. (En el caso del Plexo braquial (C5 hasta C8, T1).

Clasificación neurológica y determinación de la severidad. Los resultados del examen sensorial y motor se utilizan para definir la severidad de los déficits (Tabla 12.11).

Tabla 12.11. Grado de Severidad por déficit sensorial y motor.

Grado de severidad		Severidad 0	Severidad 1	Severidad 2	Severidad 3	Severidad 4
		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo o pérdida total
Sensitivo ¹	Sensación y sensibilidad	Normal.	Sensibilidad táctil superficial distorsionada.	Sensibilidad táctil superficial distorsionada con sensación anormal.	Sensibilidad superficial táctil y dolorosa disminuida	Sensibilidad superficial, táctil y dolorosa ausentes
	Prueba de monofilamentos: interpretación y Gramos de fuerza (GF)	1.65 a 2.83	2.84 a 3.61	3.62 a 4.31	4.32 a 6.65	> 6.65
	Discriminación de 2 puntos en milímetros	Normal (< o igual 6)	> 6 ≤ 9	> 9 ≤ 12	> 12 ≤ 14	> 14
Motor		Grado 5	Grado 4/5	Grado 3/5	Grado 2/5	Grado 0-1/5
		Normal	Contra gravedad con alguna resistencia.	Contra gravedad solo sin resistencia.	Movimiento con gravedad eliminada.	Sin evidencia de contracción o sin movimiento articular.

¹Para asignar el grado de severidad sensitivo (de leve a muy severo), se clasificará con las tres variables (sensación y sensibilidad, prueba de monofilamentos y discriminación de dos puntos) y si dos de ellas se encuentran en el mismo grado de severidad, este será el asignado y si se encuentran en grados diferentes se tomará el intermedio.

Consideraciones especiales de la metodología de calificación. Cuando estén comprometidos los dos plexos braquiales (C5 hasta C8, T1) de manera total (muy severa), el valor final de la deficiencia global será del 80% y no se dará aplicación a la Tabla 12.12.

Los criterios de esta sección **no se deben usar** para calificar atrapamientos nerviosos, para ello existe una tabla específica.

La deficiencia por deterioro de nervios periféricos de miembros superiores, puede combinarse con la deficiencia debida a disminución de los arcos de movimiento, siempre y cuando esta disminución no sea generada por patologías del SNP.

Las alteraciones de la motivación y el comportamiento relacionadas con esta sección deberán calificarse con los criterios establecidos en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento.

El Síndrome Doloroso Regional Complejo – Tipo II (SDR-II, también conocido como causalgia) se califica con base en los criterios descritos en las tablas 12.12. Deficiencias de las Extremidades Superiores por Deterioros del Plexo Braquial y la Tabla 12.13. Deficiencias de las Extremidades Superiores por Deterioros del Nervio Periférico.

Deben considerarse las causas subyacentes de las disfunciones neuromusculares con alteraciones regionales específicas, tales como diabetes mellitus, abuso crónico del alcohol, trastornos neurológicos sistémicos, hipotiroidismo y otras enfermedades sistémicas; por lo tanto, la calificación se debe hacer por los criterios a los que pertenezca la patología de base y se combinan con las deficiencias globales generadas por sus complicaciones sobre el SNP.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Las secuelas resultantes de las lesiones del nervio periférico tales como restricción del movimiento, la atrofia y los cambios vasomotores, tróficos y en los reflejos, están incluidos dentro de los valores de la deficiencia registrada en las tablas de esta sección. Por lo tanto, si la deficiencia es el resultado estricto de una lesión del nervio periférico, no se debe aplicar ningún otro método de calificación.




Figura 12.4. Inervación motora de las extremidades superiores.

Tabla 12.12. Deficiencias de las extremidades superiores por deterioros del plexo braquial (unilateral).

CLASE DE LA DEFICIENCIA	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
GRADO SEVERIDAD %		A B C	A B C	A B C	A B C
Diagnóstico Topográfico déficit sensorial y déficit motor (Factor Principal)	0%	5 - al 14 % 2 5 7 Déficit sensorial o SDRC II leves 3 5 7 Déficit motor leve	15 - al 24% 7 10 12 Déficit sensorial o SDRC II moderados 8 10 12 Déficit motor moderado	25 al 44% 12 17 22 Déficit sensorial o SDRC II severos 13 17 22 Déficit motor severo	45 al 60% 22 28 30 Déficit sensorial o SDRC II muy severos 23 28 30 Déficit motor muy severo
	0%	2 al 15% 1 3 5 Déficit sensorial o SDRC II leves 1 6 10 Déficit motor leve	16 al 25% 5 7 9 Déficit sensorial o SDRC II moderados 11 13 16 Déficit motor moderado	26 al 40% 10 12 14 Déficit sensorial o SDRC II severos 16 21 26 Déficit motor severo	41 al 53%* 15 17 20 Déficit sensorial o SDRC II muy severos 28 31 33 Déficit motor muy severo
	0%	1 - al 2% 0 1 1 Déficit sensorial o SDRC II leves 1 1 1	3 al 10% 1 2 3 Déficit sensorial o SDRC II moderados 2 4 7	11 al 20% 3 4 5 Déficit sensorial o SDRC II severos 8 10 15	21 al 25% 5 6 7 Déficit sensorial o SDRC II muy severos 16 17 18

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

				Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Rangos de la deficiencia global por Tronco inferior (C8 T1, Dejerine-Klumpke)	0%			2 al 15%	16 al 25%	26 al 40%	41 al 53%*
				1 3 5	5 7 9	10 12 14	15 17 20
				Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
				1 6 10	11 13 16	16 21 26	28 31 33
				Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. (Factor Modulador)*	Test de conducción nerviosa (latencia o amplitud sensitiva y/o motora) y electromiografía EMG de aguja (comparativas)	Normales		Latencia sensitiva prolongada	Amplitud sensitiva disminuida	Latencia sensitiva prolongada y Amplitud sensitiva disminuida	Respuesta sensitiva ausente
				Latencia motora prolongada	Amplitud motora disminuida	Latencia motora prolongada y Amplitud motora disminuida	Respuesta motora ausente o denervación en la electromiografía

SDRC: Síndrome de Dolor Regional Complejo, el cual debe calificarse con pruebas objetivas.

El grado de severidad del déficit sensorial y motor por parámetros objetivos se describe en la Tabla 12.11.

* Tabla actualizada por Díaz, J; Rodríguez, F y Suárez, H. (2018)

Tabla 12.13. Deficiencias de las extremidades superiores por deterioros de nervio periférico.

CLASE DE LA DEFICIENCIA	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
GRADO SEVERIDAD %		A B C	A B C	A B C	A B C
Diagnóstico Topográfico déficit sensorial y déficit motor (Factor Principal)	Rangos de la deficiencia global por nervio Pectoral (medial y lateral) o por nervio axilar	0%	1% al 5%	6% al 10%	11% al 15%
			1 2 3	4 5 6	7 8 9
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos
			0 1 2	2 3 4	4 5 6
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo
Rangos de la deficiencia global del nervio Escapular dorsal o Torácico largo o Braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo	0%	0%	0%	1% al 3%	4% al 6%
		0	0	0,5 1 1,5	
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	
		0	0	0,5 1 1,5	
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

		Nervio Mediano					
		2% al 10%		11% al 20%		21 al 35%	
Rangos de la deficiencia global del nervio mediano por encima de antebrazo	0%	1 2 4	4 6 8	7 10 12	13 14 16		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
		1 3 6	7 10 12	14 19 23	23 26 29		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
	0%	1% al 2%	3 al 4%	5% al 7%	8 al 10%		
		1 1,5 2	3 3,5 4	5 6 7	8 9 10		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
		0	0	0	0		
	0%	Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		2% al 10%	11 al 20%	21 al 30%	31 al 40%		
		1 3 5	6 8 10	11 13 15	16 18 20		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
Rangos de la deficiencia global de la Rama Interósea anterior	0%	1 3 5	5 8 10	10 13 15	15 18 20		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		0% al 1%	1 al 2%	2 al- 3%	3 - 5%		
		0 0,5 1	1 1,5 2	2 2,5 3	2,5 3 3,5		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
	0%	0	0	0 0,5 0,5	0,5 1 1,5		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		0%	0% al 1%	1% al 2%	2% al 3%		
		0	0 0,5 1	1 1,5 2	1,5 2 2,5		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
Rangos de la deficiencia global del nervio mediano por debajo del antebrazo - rama cubital del pulgar	0%	0	0	0	0,5 0,5 0,5		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		0%	0% al 1%	1% al 2%	2% al 3%		
		0	0 0,5 1	1 1,5 2	1,5 2 2,5		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
Rangos de la deficiencia global del nervio mediano por debajo del antebrazo - rama radial del pulgar	0%	0	0	0	0,5 0,5 0,5		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		0%	0% al 1%	1% al 2%	2% al 3%		
		0	0 0,5 1	1 1,5 2	2 2,5 3		
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos		
Rangos de la deficiencia global de la rama del lado radial o cubital del dedo índice	0%	0	0	0	0,5 0,5 0,5		
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
		0%	0% al 1%	1% al 2%	2% al 3%		

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	0	0	0	0
			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
			0%	0% al 1%	1% al 1,5%	1,5% al 2,5%
			0	0 0,5 1	1 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0	0	0,5 0,5 0,5
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			0%	0 % al 1%	1% al 1,5%	1,5% al 2%
			0	0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	0%	0% al 1%	1% al 1,5%	1,5% al 2%
			0	0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0	0	0
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			0%	0% al 1%	0,5% al 1,5%	1% al 2%
			0	0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0	0	0
			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	1% al 4%	5% al- 8%	9 % al 12%	13% al 18%
			1 2 4	5 6,5 7,5	8,5 10 10,5	12 14 16
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0 0,5 0,5	0,5 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	1% al 10%	11% al 20%	21% al 30%	31% al 40%
			0 1 2	1 2 3	2 3 4	3 4 5
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			1 5 8	10 14 17	19 23 26	28 31 35
B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D O P R E	B O R R A D <span style="font-size: 100px; opacity: 0.5; transform	

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Diagnóstico Topográfico sensorial y motor Principal)	Estudios clínicos o Resultados de pruebas objetivas. (Factor Modulador)*	0%	Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			1% al 5%	6% al 15%	16% al 24%	25% al 30%
			0 0,5 1	0,5 1 2	1 2 3	2 3 4
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			1 2,5 4	5,5 8 13	15 18 21	23 25 26
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			0%	0% al 1%	1% al 2%	2% al 3%
			0	0	0	0,5 0,5 0,5
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0 0,5 1	1 1,5 2	1,5 2 2,5
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			1% al 2%	3% al 4%	5% al 7%	8% al 10%
			0 0 0	0 0 0	0 0,5 1	0,5 1 1,5
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			1 1,5 2	3 3,5 4	5 5,5 6	7,5 8 8,5
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			0%	0%	1% al 3%	4% al 6%
			0	0	0 0,5 0,5	0,5 0,5 1
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0	1 2 2,5	3,5 4 5
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			Nervio Ulnar – cubital			
			1% al 4%	5% al 8%	9% al 12%	13% al 18%
			0	0 1 1,5	1 2 3	2 3 4
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			1 2 4	5 6 6,5	8 8,5 9	11 13 14
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
			0%	0% al 1%	0,5% al 1,5%	1% al 2%
			0	0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
			0	0	0	0
			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
			Latencia sensitiva prolongada	Amplitud sensitiva disminuida	Latencia sensitiva prolongada y Amplitud sensitiva disminuida	Respuesta sensitiva ausente
			Latencia motora prolongada	Amplitud motora disminuida	Latencia motora prolongada y Amplitud	Respuesta motora ausente o denervación en la electromiografía
		Normales	Test de conducción nerviosa (latencia o amplitud sensitiva y/o motora) y electromiografía EMG de aguja (comparativas)			

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

					motora disminuida	
<p>El grado de severidad del déficit sensorial y motor por parámetros subjetivos se describe en la Tabla 12.11. Las neuropatías por atrapamiento se califican según la tabla 12.14. El factor modulador se aplica para regular los valores dados en cada CLASE por el déficit sensorial y el déficit motor (elementos del factor principal) cuyos resultados se suman aritméticamente para obtener la deficiencia global final.</p>						

*Actualizada por: Díaz, J; Rodríguez, F y Suárez, H. (2018)

12.4.3. Neuropatías por atrapamiento.

Esta sección se utiliza para calificar el atrapamiento de los nervios periféricos, por cualquier causa.

Los criterios para la calificación de la deficiencia derivada de neuropatías por atrapamiento o la compresión local de los nervios mediano, cubital y radial son:

Criterio 1. Los estudios de electrodiagnóstico (factor principal) que documentan la neuropatía y miden: retrasos en la conducción, bloqueo en la conducción y pérdida de axones. El examen por electrodiagnóstico incluye estudios de neuroconducción (NC) y electromiografía de aguja (EMG). La EMG (aguja) evalúa la actividad de la membrana muscular celular confirmando la presencia de una causa neurológica de disfunción muscular.

Criterio 2. Los hallazgos físicos (factor modulador) relacionados con la sensibilidad, atrofia y discriminación de 2 puntos (ver criterios de la tabla 12.11 “ “Grado de Severidad por déficit sensorial y motor”).

Procedimientos Generales.

Metodología de Calificación.

- Identificar el nervio lesionado (ver la tabla de lesión neurológica que corresponda).
- Identificar el factor principal y el modulador, haciendo uso de la Tabla 12.14.
- Para factor principal y modulador, seguir los pasos descritos en los numerales 5° y 6° del Título Preliminar, para utilizar la “metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia”.
- Determinar el valor de la deficiencia global: Se calcula, tomando el mayor valor deficiencia global de la tabla correspondiente al nervio afectado (literal a); al valor obtenido, se le aplica el porcentaje alcanzado en la Tabla 12.14 de acuerdo con el literal c. (ejemplo: el valor del nervio peroneo en la Tabla 12.15 corresponde a un 3% de deficiencia global; y el valor obtenido en la Tabla 12.14 es del 50% de severidad (valor “A” clase 3) por lo tanto el valor final es $3\% \times 50\% = 1,5\%$ de deficiencia global).

Tabla 12.14. Graduación de la Severidad de la Neuropatía por atrapamiento.

Clase de Severidad	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
GRADO		A B C	A B C	A B C	A B C
Valor porcentual de la deficiencia global del nervio comprometido (DG%)	0	Leve	Moderado	Severo	Muy severo
		10 al 24%	25 al 49 %	50 al 74 %	75 al 100%
		10 17 24	25 37 49	50 64 74	75 88 100

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Hallazgos* en pruebas diagnósticas (Factor Principal)	Test de conducción nerviosa (latencia sensitiva y/o motora) y Electromiografía de Aguja	Normales	Sensitiva anormal (latencia o amplitud) o Motora anormal (latencia o amplitud)	Sensitiva anormal (latencia o amplitud) y Motora anormal (latencia o amplitud)	Sensitiva ausente o Motora ausente	Sensitiva ausente y Motora ausente
Hallazgos* físicos (Factor Modulador)	Sensibilidad	Normal.	Sensibilidad táctil superficial distorsionada con sensación anormal.	Sensibilidad táctil superficial distorsionada con sensación anormal.	Sensibilidad superficial táctil y dolorosa disminuida	Sensibilidad superficial, táctil y dolorosa ausentes
	Discriminación de 2 puntos	Normal (< o igual 6)	> 6 ≤ 9	> 9 ≤ 12	> 12 ≤ 14	> 14

Latencia normal de acuerdo con los valores de referencia para Colombia consignados en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional. 11(5): 794-801, 2009.
 *Díaz, J. Adaptada por: Díaz, J.; Rodríguez, F y Suárez, H. (2018)

Consideraciones especiales de la metodología de calificación. EL SDRC tipo II (causalgia) generado por neuropatía focal o por tratamiento quirúrgico, será calificado con los criterios definidos en la sección *Deficiencia por alteraciones del nervio periférico superior y plexo braquial*.

Deben considerarse las causas subyacentes de las disfunciones neuromusculares con alteraciones regionales específicas, tales como diabetes mellitus, abuso crónico del alcohol, trastornos neurológicos sistémicos, hipotiroidismo y otras enfermedades sistémicas; por lo tanto la calificación se debe hacer por los criterios a los que pertenezca la patología de base.

Las secuelas resultantes de las lesiones del nervio periférico, tales como restricción del movimiento, la atrofia y los cambios vasomotores, tróficos y en los reflejos, están incluidos dentro de los valores de la deficiencia registrada en las tablas de esta sección. Por lo tanto, si la deficiencia es el resultado estricto de una lesión del nervio periférico, no se debe aplicar ningún otro método de calificación.

En caso de presentar neuropatías simultáneas múltiples en el mismo miembro o en diferentes partes del cuerpo, se deben calificar cada una de las deficiencias y se suman mediante la fórmula de valores combinados.

12.4.4. Deficiencias por alteraciones del plexo lumbosacro y los nervios periféricos de las extremidades inferiores.

Procedimientos Generales

Metodología de calificación.

- a. Identificar el nervio lesionado (ver la tabla de lesión neurológica que corresponda), Figura 12.5
- b. Para las lesiones de nervios periféricos de las extremidades inferiores utilice la Tabla 12.15 (“Deficiencias de las extremidades inferiores por deterioros del plexo lumbosacro -unilateral”); para las lesiones de los nervios periféricos utilice la Tabla 12.16 (Deficiencia por alteraciones de nervio periférico extremidades inferiores -unilateral).
- c. Identifique el factor principal y clasifíquelo de acuerdo con el grado de severidad por el déficit sensorial y motor, tal como se señala en los principios de evaluación de esta sección, mediante la Tabla 12.11: Grado de severidad por déficit sensorial y motor. El déficit puede ser ninguno, leve, moderado, severo o muy severo.
- d. Una vez determinada la gravedad del factor principal, identifique la clase y aplique el factor modulador para cada uno de los elementos del criterio 1 (déficit sensorial y el déficit motor)
- e. Seguir los pasos descritos en los numerales 5° y 6° del Título Preliminar, para utilizar la metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- f. Para obtener el valor final de la deficiencia global del plexo lumbosacro o de los nervios periféricos, se deben sumar aritméticamente las deficiencias globales obtenidas por cada uno de los elementos: déficit sensorial y el déficit motor del Criterio 1: diagnóstico topográfico. Siendo esta la deficiencia global definitiva del plexo o de los nervios.
- g. En caso de existir al momento de calificar, compromiso del plexo lumbosacro y de nervios periféricos, se debe seguir el paso anterior (literal f) para cada uno de ellos y combinar los valores, **con excepción de la deficiencia global obtenida por daño total del plexo lumbosacro, donde se deja el valor de esta deficiencia como definitivo.**

Consideraciones especiales de la metodología de calificación. Al igual que en las extremidades superiores, la deficiencia por deterioro de nervios periféricos de miembros inferiores puede combinarse con la deficiencia debida a disminución de los arcos de movimiento, no generados por causa diferente a lesión del Sistema Nervioso Periférico – SNP.

Otras deficiencias encontradas, se identifican en el capítulo que les corresponda, se califican y sus resultados se combinan con los obtenidos en este capítulo, con las excepciones ya expuestas.

El Síndrome Doloroso Regional Complejo – Tipo II (SDR-II, también conocido como causalgia) se califica con base en los criterios descritos en la Tabla 12.15. Deficiencia por alteraciones de nervio periférico de extremidades miembros inferiores.

Deben considerarse las causas subyacentes de las disfunciones neuromusculares con alteraciones regionales específicas, tales como diabetes mellitus, abuso crónico del alcohol, trastornos neurológicos sistémicos, hipotiroidismo y otras enfermedades sistémicas, por lo tanto la calificación se debe hacer por los criterios a los que pertenezca la patología de base.

Las secuelas resultantes de las lesiones del nervio periférico tales como restricción del movimiento, la atrofia, y los cambios vasomotores, tróficos y en los reflejos, están incluidos dentro de los valores de la deficiencia registrada en las tablas de esta sección. Por lo tanto, si la deficiencia es el resultado estricto de una lesión del nervio periférico, no se debe aplicar ningún otro método de calificación.

Tabla 12.15 Deficiencias de las extremidades inferiores por deterioros del plexo lumbosacro –unilateral.

CLASE DE LA DEFICIENCIA	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
GRADO SEVERIDAD %		A B C	A B C	A B C	A B C
Diagnóstico Topográfico déficit sensorial y déficit motor (Factor Principal)	Rangos de la deficiencia global por Plexo lumbosacro	0%	5% al 15 %	16% al 30%	31% al 40%
			3 5 8	8 13 15	16 18 20
			Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos
			2 5 7	8 12 15	15 17 20
			Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. (Factor Modulador)*	Test de conducción nerviosa (latencia o amplitud sensitiva y/o motora) y electromiografía EMG de aguja (comparativas)	Normales	Latencia sensitiva prolongada	Amplitud sensitiva disminuida	Latencia sensitiva prolongada y Amplitud sensitiva disminuida
			Latencia motora prolongada	Amplitud motora disminuida	Latencia motora prolongada y Amplitud motora disminuida

El grado de severidad del déficit sensorial y motor por parámetros objetivos se describe en la Tabla 12.12.

* actualizada por Díaz, J; Rodríguez, F y Suárez, H. (2018)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 12.16. Deficiencia por alteraciones de nervio periférico de miembros inferiores

CLASE DE LA DEFICIENCIA	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
GRADO SEVERIDAD %		A B C	A B C	A B C	A B C
Nervios sensitivos	No hay déficit sensorial objetivo	Déficit sensorial o SDRC II			
Valor único por deficiencia global para nervio cutáneo femoral lateral o Peronéo superficial o Sural ó Safeno	0%	3%			
Nervios motores	No hay déficit motor objetivo	Con déficit motor			
Valor único por deficiencia global para nervio cutáneo femoral lateral o Sural o Safeno u obturador	0%	Leve	Moderado	Severo	Muy severo
Valor único por deficiencia global del nervio Glúteo superior	0%	0%	1%	2%	3%
Valor único por deficiencia global del nervio Glúteo inferior	0%	5%	10%	20%	25%
Nervios mixtos					
Rangos de la deficiencia global del nervio Femoral	0%	0 al 1%	2 al 4%	5 al 9%	10 -al 15%
		0	0	0	0,5 1 1,5
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
		0 0,5 1	2 3 4	5 7 9	9,5 12 13,5
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Rangos de la deficiencia global del nervio Ciático	0%	2 al 10%	11 -al 20%	21 al 30%	31 al 40%
		1 2 3	3 5 6	6 7 8	8 9 10
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
		1 4 7	8 5 14	15 19 22	23 26 30
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Rangos de la deficiencia global del nervio Peronéo común	0%	0 al 1%	2 al 4%	5 -al 9%	10 al 15%
		0	0	0	0,5 1 1,5
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
		0 0,5 1	2 3 4	5 7 9	9,5 12 13,5
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Rangos de la deficiencia global del nervio Tibial	0%	0 al 1%	2 al 4%	5 al 9%	10 -al 15%
		0	0	0	0,5 1 1,5

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
0 0,5 1	2 3 4	5 7 9	9,5 12 13,5		
Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo		
Rangos de la deficiencia global del nervio Plantar medial o Plantar lateral	0%	0 -al 2%	1 -al 3%	2 al 4%	3 al 5%
		0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2	1,5 2 2,5
		Déficit sensorial o SDRC II leves	Déficit sensorial o SDRC II moderados	Déficit sensorial o SDRC II severos	Déficit sensorial o SDRC II muy severos
		0 0,5 1	0,5 1 1,5	1 1,5 2	1,5 2 2,5
		Déficit motor leve	Déficit motor moderado	Déficit motor severo	Déficit motor muy severo
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. (Factor Modulador)*	Test de conducción nerviosa (latencia o amplitud sensitiva y/o motora) y electromiografía EMG de aguja (comparativas)	Latencia sensitiva prolongada	Amplitud sensitiva disminuida	Latencia sensitiva prolongada y Amplitud sensitiva disminuida	Respuesta sensitiva ausente
		Latencia motora prolongada	Amplitud motora disminuida	Latencia motora prolongada y Amplitud motora disminuida	Respuesta motora ausente o denervación en la electromiografía

* Actualizada por Díaz, J; Rodríguez, F y Suárez, H. (2018)




Figura 12.5. Nervios motores de la extremidad inferior.

Procedimiento específico para el Síndrome de Dolor Regional Complejo – SDRC. El Síndrome de Dolor Regional Complejo – SDRC describe una serie de condiciones dolorosas que se caracterizan por dolor regional continuo (espontáneo y/o evocado), aparentemente desproporcionado en el tiempo o grado, respecto al curso habitual de cualquier trauma conocido u otra lesión. El dolor es regional y no corresponde

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

con un territorio nervioso específico o dermatoma; por lo general, tiene un predominio distal con alteraciones sensoriales, motoras, sudomotoras, vasomotoras y/o tróficas. El SDRC incluye otros diagnósticos médicos como: causalgia, atrofia de Sudeck, síndrome hombro-mano, distrofia neurovascular refleja, algodistrofia y distrofia simpático-refleja.

Según la International Association for the Study of Pain (IASP), este síndrome se clasifica en SDRC tipo I o distrofia simpático-refleja y SDRC tipo II o causalgia. Ambos tipos comparten el mismo conjunto de síntomas, pero en el tipo I no hay lesión en los nervios, mientras que el tipo II sí existe. Por lo anterior, para efectos de la calificación, se asumen por aparte los dos tipos:

SDRC tipo I: Se califica con base en la Tabla 12.17. (“Criterios diagnósticos objetivos para el SDRC tipo I”); Tabla 12.18. (“Calificación del Síndrome de Dolor Regional Complejo Tipo I - miembro superior –unilateral”) y Tabla 12.19. (“Calificación del Síndrome de Dolor Regional Complejo Tipo I -miembro inferior – unilateral”).

SDRC tipo II: Se califica la deficiencia de acuerdo con la estructura nerviosa involucrada y según la extremidad comprometida en la Tabla 12.13. (“Deficiencias de las extremidades superiores por deterioros de nervio periférico”) y en la Tabla 12.15 (“Deficiencias de las extremidades inferiores por deterioros del plexo lumbosacro –unilateral”). En ambas tablas se determina el grado de severidad de SDRC con base en la Tabla 12.11; los grados se clasifican en leves, moderados, severos y muy severos.

Criterio 1. Criterios diagnósticos objetivos para SDRC tipo I Tabla 12.17 – Factor Principal

Criterio 2. Los estudios de electrodiagnóstico (factor modulador) que documentan la neuropatía que miden: retrasos en la conducción, bloqueo en la conducción y pérdida de axones. El examen por electrodiagnóstico incluye estudios de neuroconducción – NC, con o sin EMG (aguja). La EMG (aguja) evalúa la actividad de la membrana muscular celular confirmando la presencia de una causa neurológica de disfunción muscular. Déficit sensorial-Síndrome regional complejo II - SDRC II y el déficit motor.

Criterio 3. Los hallazgos físicos (factor modulador) relacionados con la sensibilidad, atrofia y discriminación de dos puntos ver criterios de la Tabla 12.11.

Procedimiento para la calificación de SDRC Tipo I.

- a. Comprobar que exista un diagnóstico de SDRC realizado por el médico especialista tratante con base en los criterios expuestos en la Tabla 12.17 (“Criterios diagnósticos objetivos para SDRC tipo I”) con diagnósticos diferenciales descartados; así mismo, debe evaluar un año posterior al diagnóstico.
- b. Asignar el puntaje correspondiente de acuerdo con la Tabla 12.17 (“Criterios diagnósticos objetivos para SDRC tipo I”) y clasificar de la siguiente manera: leve, 4 ó 5 puntos; moderada, 6 ó 7 puntos; severa, 8 puntos; y muy severa, 9 o más puntos.
- c. Identificar la “Clase funcional” del factor principal en las Tablas 12.18 para miembros superiores o Tabla 12.19 para miembros inferiores, según el miembro comprometido y a calificar.
- d. Identificar los factores moduladores y para cada uno de estos se debe asignar el grado de severidad del SDRC de leve, moderado, severo o muy severo dado en la Tabla 12.11 – (“Grado de Severidad por déficit sensorial y motor”) y ubicar el resultado de los Hallazgos en las pruebas diagnósticas (Test de conducción nerviosa (latencia sensitiva y/o motora y electromiografía de aguja –EMG-)
- e. Seguir los pasos descritos en el numeral 5° del Título Preliminar para utilizar la metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia.

En caso de asignar deficiencia por SDRC, no se debe calificar otra deficiencia por dolor en este capítulo. Así mismo, si presenta otras deficiencias de los miembros superiores e inferiores, se combinarán las deficiencias

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

con el valor de deficiencia del SDRC. En caso de presentar SDRC en otros miembros, se hará el mismo procedimiento para cada uno de ellos y luego combinar.

Tabla 12.17. Criterios diagnósticos objetivos para SDRC tipo I

SIGNOS LOCALES		PUNTAJE
Cambios vasomotores		
Color de la piel: piel manchada o cianótica		1
Temperatura de la piel, cambio > de 1°C		1
Edema		1
Cambios sudomotores		
Piel seca o humedad excesiva		1
Cambios tróficos		
Textura de la piel: suave no elástica		1
Atrofia de tejidos blandos		1
Rigidez articular y disminución de la movilidad pasiva		1
Cambios ungueales: manchas, ondulaciones		1
Cambios en cabello: Pérdida de pelo*, fino		1
Signos radiográficos		
RX: cambios óseos tróficos		1
Escáner óseo: hallazgos consistentes con SDRC		1

* No incluye alopecia por edad ni androgénica o aquellas diferentes al SDRC.

Tabla 12.18. Calificación del Síndrome de Dolor Regional Complejo Tipo I - miembro superior (unilateral).

Clase funcional	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Deficiencia Global	0&%	1% al 7%	8% al 15%	16% al 29%	30% al 60%
Grado de severidad (%)		A B C	A B C	A B C	A B C
	1 4 7		8 12 15	16 23 29	30 45 60
Criterios diagnósticos objetivos Tabla 12.17 (Factor Principal)	El diagnóstico no está soportado o < 4 puntos	4 o 5 puntos	6 o 7 puntos	8 puntos	9 o más puntos
Grado de Severidad por déficit sensorial y motor - tabla 12.11 (Factor modulador)	Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo

Tabla 12.19. Calificación del Síndrome de Dolor Regional Complejo Tipo I -miembro inferior (unilateral).

Clase funcional	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Deficiencia Global	0%	1% al 7%	8% al 15%	16% al 30%	31% al 50%
Grado de severidad (%)		A B C	A B C	A B C	A B C
	El diagnóstico no está soportado o < 4 puntos	1 4 7	8 12 15	16 23 30	31 42 50
Criterios diagnósticos objetivos Tabla 12.17 (Factor Principal)		4 o 5 puntos	6 o 7 puntos	8 puntos	9 o más puntos
Grado de Severidad por déficit sensorial y motor Tabla 12.11 (Factor modulador)	Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo

Tabla 12.20. Calificación de las Deficiencias por Pares Craneanos

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

	Alteración	Deterioro global
I	Olfatorio	
	Pérdida completa unilateral	1%
	Pérdida completa bilateral	3%
II	Óptico	
III	Motor ocular común	Calificar según el capítulo XI
IV	Patético	
V	Trigémino	Tabla 12.7
	Anestesia unilateral	10%
	Anestesia bilateral	35%
	Dolor neurálgico facial	Tabla 12.7
	Pérdida Motora completa unilateral	5%
	Pérdida Motora completa bilateral	45%
VI	Motor ocular externo	Calificar según el capítulo XI
VII	Facial	
	Pérdida completa del gusto (parte anterior de la lengua)	Calificar según el capítulo XI
	Parálisis facial completa unilateral	15%
	Parálisis facial completa bilateral	45%
VIII	Estate-acústico	Calificar según el capítulo IX
IX	Glosofaríngeo	Tabla 12.7
X	Vago o neumogástrico	Calificar según los capítulos III, X y Tabla 4.5.
XI	Espinal Unilateral	5%
	Espinal Bilateral	7%
XII	Hipogloso Mayor	Calificar según los capítulos IV y X

Capítulo XIII Deficiencias por Trastornos Mentales y del Comportamiento

13.1. Objetivo. Ofrecer una metodología para cuantificar las deficiencias derivadas de los trastornos mentales y de los comportamientos más significativos. Para tal propósito se utilizan los códigos y la nomenclatura diagnóstica de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10^a versión correspondiente a la versión en español CIE -10- OMS.

Adicionalmente se emplean los criterios diagnósticos y la clasificación multiaxial propuesta por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos (American Psychiatric Association) -DSM – IV, así como la Clasificación Psicopedagógica de la Discapacidad Intelectual propuesta por la Organización Mundial de la Salud -OMS- 2004.

13.2. Alcance. Este capítulo valora las siguientes patologías o grupos de patologías: Trastornos de humor incluyendo el trastorno depresivo mayor y el trastorno afectivo bipolar; trastorno por ansiedad incluyendo el trastorno por ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo; trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia y los trastornos de la personalidad.

También contiene criterios para cuantificar las deficiencias derivadas de otros cuadros clínicos tales como los trastornos por estrés, trastornos somatomorfos y trastornos por abuso de sustancias.

Además, se exponen los criterios para la calificación de los trastornos de inicio temprano en la niñez y adolescencia, reconocidos actualmente como discapacidades intelectuales que se relacionan con: trastorno

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

del desarrollo psicológico y el retraso mental. Como otros trastornos a valorar, se incluyen los trastornos del aprendizaje.

Es de precisar que la calificación de estas discapacidades incluye todos los síndromes de etiología genética cuyas principales manifestaciones se relacionan con repercusiones a nivel intelectual y los trastornos generalizados del desarrollo como por ejemplo: autismo y Síndrome de Asperger, entre otros.

El capítulo excluye las siguientes deficiencias:

- a. Deficiencias por alteraciones de la conciencia, por pérdidas de conciencia episódicas, por trastornos del sueño y vigilia, debidas a alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora y por afasia o disfasia.
- b. Calificación de las deficiencias por cefaleas - migraña.

Las anteriores deficiencias (literales a y b), se califican en el Capítulo XII. “Deficiencias por Alteraciones del Sistema Nervioso Central y Periférico”

13.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

13.3.1. Aspectos Clínicos.

Para la evaluación de las deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento se tendrá en cuenta:

Criterio 1. Diagnósticos clínicos: Este capítulo utiliza la nomenclatura y los códigos correspondientes a la CIE-10. No obstante, aunque se utilizan los códigos de la CIE-10, los criterios diagnósticos a utilizar son los del DSM IV.

Criterio 2. Historial clínico: relacionado con los antecedentes clínicos y su evolución en el año anterior a la calificación.

Criterio 3. Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos determinados mediante examen mental.

Criterio 4. Evolución total del trastorno: Es el tiempo comprendido entre la primera aparición de las alteraciones propias del cuadro clínico y el momento de la calificación.

Criterio 5. Coeficiente intelectual.

Para efectos de calificar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional por enfermedad mental o trastorno del comportamiento, se tendrán en cuenta los ejes I y II acorde a la Tabla 13.1 de la calificación.

Tabla 13.1 Sistema multiaxial del DSM-IV

Eje	Condición
I	Trastornos clínicos Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica
II	Trastornos de personalidad
III	Enfermedades médicas (con código CIE10)
IV	Problemas psicosociales y ambientales
V	Evaluación de la actividad global

Cada uno de los 5 ejes (en una escala de I a V) hace referencia a un tipo diferente de información. Los tres primeros constituyen las categorías de diagnóstico principales e incluyen los cuadros clínicos y las condiciones que son el foco del tratamiento (eje I), la personalidad y los trastornos del desarrollo (eje II) y los

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

trastornos y condiciones físicas que puedan ser relevantes para la compresión y manejo del cuidado de la persona(Eje III). El eje IV hace referencia a factores estresantes psicosociales y el Eje V a la capacidad funcional global que refleja los efectos de los trastornos mentales de manera integral.

13.3.2. Procedimientos para la Calificación de las Deficiencias por Trastornos Mentales y del Comportamiento.

Consideraciones preliminares. Además de la historia clínica, las pruebas diagnósticas tales como: pruebas de personalidad, test de inteligencia, afrontamiento del estrés, de vulnerabilidad al estrés, evaluación de factores psicosociales, escalas de depresión y ansiedad que varían según la etapa del ciclo vital en que se encuentre la persona.

13.3.3 Metodología de calificación.

Determinado el diagnóstico, se califica de la siguiente manera:

1. Identificar el trastorno mental a calificar según lo definido en el DSM-IV y su sistema de clasificación multiaxial, de acuerdo con el diagnóstico emitido por el médico psiquiatra.
2. Verificar que se haya alcanzado la Mejoría Médica Máxima, un año después de iniciado el tratamiento, o se haya terminado el proceso de rehabilitación integral; no obstante, se deberá calificar antes de cumplir los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.
3. Aplicar la tabla correspondiente, ya sea que se trate de un cuadro clínico o de un trastorno de personalidad y determinar la clase de acuerdo con los criterios de cada tabla, según la gravedad de la deficiencia.
4. Calificar solamente el cuadro o síndrome clínico con mayor valor porcentual de deficiencia (Eje I); igualmente se tendrá en cuenta, un sólo trastorno de personalidad o discapacidad intelectual (Eje II), el de mayor valor porcentual, cuando existan varios.
5. El valor de la deficiencia global por trastornos mentales y del comportamiento será la suma aritmética de las deficiencias derivadas de un cuadro clínico (Eje I) y un trastorno de personalidad o discapacidad intelectual (Eje II). El valor del trastorno de personalidad depende de si existe o no un trastorno en el eje I o de la característica de ese trastorno, cuando es pertinente, de acuerdo con la Tabla 13.9).
6. La deficiencia resultante de los trastornos mentales y de comportamiento se combina mediante la fórmula de combinación de valores con las deficiencias en otros órganos o sistemas diferentes.

13.4. Calificación de la deficiencia producida por diferentes cuadros clínicos (Eje I).

13.4.1. Trastornos psicóticos.

Los trastornos psicóticos están caracterizados por la presencia de ideas delirantes. Las ideas delirantes son contenidos de pensamiento que tienen fuerza de convicción para el paciente, frecuentemente relacionados con la percepción de sí mismo y los demás. Estas ideas usualmente se acompañan de alteraciones afectivas y sensoriomotoras.

Se diferencian dos tipos de ideas delirantes: aquellas en las cuales se conserva la organización lógica del pensamiento (no extrañas para el DSM-IV) que caracterizan al trastorno delirante y las otras en las cuales se altera la organización lógica del pensamiento y son caracterizadas por una estructura paralógica o mágica (ideas extrañas para el DSM-IV) y que caracterizan el grupo de trastornos psicóticos “esquizoides”.

El delirio no extraño está caracterizado por contenidos de pensamiento que hace referencias a situaciones cotidianas tales como ideas de persecución, celotipia y erotomanía. Mientras que los delirios prelógicos se refieren a situaciones no cotidianas tales como trasmisión y difusión del pensamiento, posesión y se asocian frecuentemente con alucinaciones.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Los trastornos esquizoides, además de la presencia de ideas delirantes (que pueden ser no extrañas) están complementados por la aparición de los siguientes síntomas “positivos”: alucinaciones, desorganización en el curso del lenguaje (disgregación, incoherencia) y comportamiento gravemente desorganizado o catatónico. Además, se encuentra la presencia de síntomas “negativos” tales como: disociación ideoafectiva, aplanamiento afectivo, abulia e indiferencia.

Estos trastornos evolucionan por episodios o estados persistentes. Se diferencian dos tipos de trastornos esquizoides: el esquizofreniforme cuyo episodio dura por lo menos un mes (incluyendo las fases prodrómica, activa y residual) pero menos de seis meses. Y el trastorno esquizofreniforme de por lo menos seis meses de duración. Para los fines del presente Manual no se tendrá en cuenta el trastorno psicótico breve (menor a un mes), en la medida que dicho trastorno no deja secuelas.

13.4.2 Trastornos del humor.

Los trastornos del humor o del afecto son de dos tipos, clasificados como trastornos mayores y menores del humor.

Los trastornos mayores del humor están caracterizados por la presencia de episodios de depresión (trastorno depresivo) y exaltación (manía o hipomanía) o presencia de ambos tipos de episodios (trastorno bipolar del humor). El trastorno depresivo mayor está caracterizado por la presencia de un episodio único o la presencia de episodios depresivos recurrentes y el trastorno bipolar del humor está caracterizado por la presencia de episodios maníacos, alternando con episodios depresivos. La recurrencia se da por un período de remisión de dos meses entre los dos episodios o el cambio de polaridad de estos.

El episodio depresivo mayor está caracterizado por la presencia de por lo menos cinco de los siguientes síntomas durante un período mínimo de dos semanas, comprometiendo seriamente las actividades cotidianas durante la gran mayoría de los días:

1. Humor depresivo durante la mayor parte del día.
2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en casi todas las actividades del día.
3. Insomnio o hipersomnio.
4. Agitación o lentificación psicomotora.
5. Fatiga o pérdida de energía.
6. Sentimiento de inutilidad o culpa excesivas.
7. Disminución de la capacidad de pensar, concentrarse y tomar decisiones.
8. Pensamiento de muerte o ideación suicida recurrente.
9. Pérdida importante de peso durante el episodio.

El episodio maníaco está caracterizado por un estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable, con una duración de por lo menos una semana, asociado con la presencia de por lo menos tres de los siguientes síntomas:

1. Autoestima exagerada o sentimiento de grandiosidad.
2. Disminución de la necesidad del sueño
3. Más hablador de lo habitual o verborreico.
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de pensamiento acelerado.
5. Atención dispersa.
6. Aumento de la actividad voluntaria.
7. Agitación psicomotora.
8. Compromiso en actividades placenteras con alto potencial de riesgo (negocios, compras, hipersexualidad).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Al contrario, los trastornos menores del humor evolucionan por estados persistentes: distimia (estado de depresión) y ciclotimia (alternancia de depresión y exaltación) y están caracterizados por síntomas depresivos o de exaltación de menor intensidad y comprometen en menor grado la actividad diaria.

Las deficiencias por trastornos psicóticos y del humor se califican con base en la -tabla que se muestra a continuación.

Tabla 13.2 Trastornos psicóticos y del humor

Clase	Trastornos psicóticos	Trastornos del humor	% Deficiencia
Clase I	Antecedente de por lo menos un episodio psicótico con una duración mayor de un mes. y Hallazgo actual: insomnio, labilidad emocional, inquietud y otros síntomas inespecíficos.	Antecedente de episodios mayores del humor en remisión completa. y Hallazgo actual: presencia de algunos síntomas menores del humor.	20%
Clase II	Antecedente de episodios psicóticos y/o episodio actual hasta de seis meses incluyendo el período intercrítico. y Hallazgo actual: Ausencia de síntomas negativos. No clara conciencia de enfermedad y tendencia a pérdida de juicio de la realidad.	Antecedentes de episodios mayores del humor. Remisión parcial de los episodios mayores del humor. y Hallazgo actual: En la fase de remisión persisten algunos síntomas que no configuran el cuadro clínico completo o la intensidad de los mismos ha disminuido, o se ha instaurado un estado menor del humor o existe grado leve de deterioro en la actividad o funcionamiento	40%
Clase III	Antecedente o no de episodios psicóticos previos. Tiempo de duración del episodio actual (o estado persistente) mayor a 6 meses, incluyendo fase con síntomas residuales o prodrómicos. y Hallazgo actual: Presencia de ideas delirantes de uno u otro tipo que producen deterioro en la actividad o funcionamiento mental.	El episodio depresivo mayor dura más de dos años. y Hallazgo actual: Persistencia del cuadro clínico característico de un episodio mayor del humor en cualquiera de los diferentes niveles de gravedad y existe un grado moderado de deterioro en la actividad o funcionamiento	60%
Clase IV	Tiempo de duración del estado persistente mayor a 6 meses (sin incluir fase prodrómica y residual). y Hallazgo actual: Ideas delirantes sistematizadas y presencia de síntomas negativos. Deterioro de la actividad o funcionamiento mental.	El episodio depresivo mayor dura más de dos años. y Hallazgo actual: Persistencia del cuadro clínico característico de un episodio mayor del humor en cualquiera de los diferentes niveles de gravedad y existe un grado severo o muy severo (profundo) de deterioro en la actividad o funcionamiento	80%
Clase V	Tiempo de duración del estado persistente mayor a 6 meses. y Hallazgo actual: Predominio de síntomas negativos y desorganización de la actividad consciente y voluntaria. Es decir gran compromiso en la actividad o funcionamiento mental.		100%

13.4.3. Trastornos de ansiedad.

Los trastornos de ansiedad se presentan en forma de crisis o estados persistentes. La crisis de angustia se caracteriza por la aparición temporal súbita de miedo o malestar intensos que se acompaña de 4 o más de los siguientes síntomas durante un período de aproximadamente 10 minutos:

1. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardiaca.
2. Sudoración.
3. Temblores o sacudidas.
4. Sensación de ahogo o falta de aliento.
5. Sensación de atragantarse.
6. Opresión o malestar torácico.
7. Náuseas o molestias abdominales.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- 8. Inestabilidad, mareo o desmayo.
- 9. Desrealización o despersonalización.
- 10. Miedo a perder el control o volverse loco.
- 11. Miedo a morir.
- 12. Parestesias.
- 13. Escalofríos o sofocaciones.

La crisis de angustia puede presentarse en ausencia de algún factor desencadenante (trastorno de pánico) o en relación con algunas situaciones específicas (trastorno fóbico) o con el antecedente de una situación traumática (trastorno por estrés post-traumático). También acompaña la presencia de pensamientos u otros contenidos mentales intrusivos (trastorno obsesivo-compulsivo).

Estas crisis dan lugar a una gran preocupación ante una eventual repetición, acompañada de sentimientos de angustia anticipatoria o conductas de evitación de los factores desencadenantes.

De especial importancia es la “agorafobia”, asociada o no con el trastorno de pánico, en el cual la angustia aparece cuando la persona se encuentra en lugares o situaciones donde le resultaría difícil escapar o recibir ayuda (estar solo fuera de la casa, mezclarse con la gente, hacer cola, pasar por un puente, viajar solo). Esta situación da lugar a su vez a conductas de evitación de las situaciones enumeradas anteriormente.

En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, o imágenes recurrentes, elaborando una serie de comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo (compulsiones) para prevenir o reducir el malestar producido por las obsesiones, sin que haya una conexión realística entre una y otra.

El trastorno de la ansiedad generalizada está caracterizado por un estado persistente de ansiedad y preocupación excesivas en relación con una amplia gama de situaciones, acontecimientos o actividades, con una duración de por lo menos seis meses.

Esta ansiedad o preocupación se asocia con la presencia de por lo menos tres de los siguientes síntomas:

- 1. Inquietud o impaciencia.
- 2. Fatigabilidad fácil.
- 3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco.
- 4. Irritabilidad.
- 5. Tensión muscular.
- 6. Alteraciones del sueño.

Lo que determina la gravedad de la deficiencia producida por las diferentes formas de crisis de angustia, es la frecuencia e intensidad de las mismas, así como el hecho de que el factor desencadenante de estas forme parte de la vida habitual y cotidiana de la persona. Adicionalmente, la gravedad está dada por la intensidad o persistencia de las conductas de evitación que en los casos más graves puede llevar al aislamiento del individuo y hasta el confinamiento en su propia casa. Estos trastornos en ningún caso dan lugar a deterioro de la actividad mental.

13.4.4. Trastornos Somatomorfos.

Comprenden dos tipos de trastorno: el primero caracterizado por la existencia de síntomas físicos, cuyo estudio ha excluido una etiología orgánica. Incluye el trastorno por somatización (dolor somático, síntomas gastrointestinales, disfunción sexual y síntomas somatosensoriales), el trastorno conversivo (síntomas sensoriomotores que simulan enfermedad neurológica), dolor psicógeno (dolor en una o más zonas del cuerpo que amerita atención médica).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

El segundo, caracterizado por preocupación exagerada por su estado de salud (hipocondría) o por la apariencia física (trastorno dismórfico corporal).

La gravedad de la deficiencia está dada por la limitación propia del síntoma o la persistencia del mismo, en la medida que afecta la actividad habitual de la persona. En ningún momento dan lugar a deterioros de la actividad mental.

Tabla 13.3 Trastornos de ansiedad y somatomorfos

Clases	Trastornos de ansiedad	Trastornos somatomorfos	% Deficiencia
Clase I	Antecedentes de cuadros clínicos propios de estos trastornos en el último año. Tiempo de evolución total del cuadro clínico no mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de ansiedad y/o conductas de evitación o compulsiones con tal intensidad que da lugar a alteraciones de la conducta habitual.	Antecedentes de cuadros clínicos propios de estos trastornos en el último año. Tiempo de evolución total del cuadro clínico no mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de estos trastornos hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona.	20%
Clase II	Antecedentes de cuadros clínicos propios de estos trastornos en el último año. Tiempo de evolución total del cuadro clínico mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de ansiedad y/o conductas de evitación o compulsiones con tal intensidad que da lugar a alteraciones de la conducta habitual.	Antecedentes de cuadros clínicos propios de estos trastornos en el último año. Tiempo de evolución total del cuadro clínico mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de estos trastornos hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona.	40%

13.4.5 Trastornos por estrés.

Los trastornos por estrés comprenden dos categorías; el trastorno por estrés post-traumático, relacionado con un trauma de especial gravedad y el trastorno adaptativo relacionado con cambios en las circunstancias cotidianas, incluyendo enfermedades orgánicas, o las consecuencias físicas derivadas de un accidente.

Las manifestaciones del estrés postraumático se prolongan por más de un mes y en algunos casos aparecen después de seis meses del hecho traumático. Su principal característica es la re-experimentación del evento traumático mediante:

1. Recuerdos recurrentes e intrusivos del hecho traumático que incluyen imágenes, pensamientos o percepciones.
2. Sueños de carácter recurrente del acontecimiento.
3. El individuo tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (incluye sensación de revivencia de la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios de flashback).

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- 4. Malestar emocional intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático, acompañado de las respuestas fisiológicas propias de la ansiedad.
- 5. Adicionalmente, aparecen conductas de evitación que incluyen pérdida de memoria de algún aspecto importante del trauma, disminución del interés o la participación de las actividades significativas y sensación de desapego y enajenación frente a los demás.
- 6. Finalmente, alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse e hiperactividad.

El trastorno adaptativo aparece dentro de los tres meses siguientes al cambio de las circunstancias vitales y en principio, tiene una duración hasta de seis meses, excepto cuando el cambio en las circunstancias vitales es persistente o da lugar a consecuencias negativas de larga duración. Se manifiesta por la presencia de alteraciones del humor de tipo ansioso o depresivo, sin llegar a constituir un cuadro clínico específico de los trastornos de ansiedad o trastornos del humor; en ocasiones está asociado con alteraciones conductuales.

Aunque el DSM-IV codifica el trastorno adaptativo con humor ansioso, el trastorno adaptativo con humor depresivo, el trastorno adaptativo con humor mixto, el trastorno adaptativo con trastorno de comportamiento y trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento, la CIE-10 solamente codifica una categoría: trastorno adaptativo. Tanto el DSM-IV como la CIE-10 codifican la categoría de trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno que no es producido por el estrés. Para su calificación se utiliza la Tabla 13.3 Trastornos de ansiedad y somatomorfos. Aunque las manifestaciones del trastorno adaptativo con humor ansioso o con humor depresivo solamente incluyen algunos elementos de los correspondientes cuadros completos de los trastornos del humor o de los trastornos de ansiedad.

Tabla 13.4 Trastornos por estrés

Clase Clases	Trastornos adaptativos	Trastornos por Estrés post traumático	% Deficiencia
Clase I	Las alteraciones del humor o del comportamiento se han presentado en el transcurso del último año hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona. La evolución total del trastorno es hasta de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas ansiosos, depresivos o alteraciones de comportamiento.	Presencia de manifestaciones de re experimentación del trauma y conducta de evitación durante el transcurso del último año hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona. La evolución total del trastorno es hasta de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de ansiedad.	20%
Clase II	Las alteraciones del humor o del comportamiento se han presentado en el transcurso del último año hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona. La evolución total del trastorno es mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas ansiosos, depresivos o alteraciones de comportamiento.	Presencia de manifestaciones de re experimentación del trauma y conducta de evitación durante el transcurso del último año hasta el punto de alterar la actividad habitual de la persona. La evolución total del trastorno es mayor de 5 años. y Hallazgo actual: Presencia de síntomas y signos de ansiedad.	40%

13.4.6. Trastornos por abuso de sustancias.

Estos trastornos incluyen diferentes componentes: la intoxicación, el uso nocivo (o abuso) y la dependencia. También incluyen las complicaciones derivadas del consumo (generalmente prolongado) de estas

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

sustancias, en particular aquellas caracterizadas por daño de las formaciones o estructuras cerebrales. Para los fines de la calificación de la deficiencia se tendrá en cuenta el síndrome de dependencia, el cual será valorado en los casos en los que el último período de dependencia tenga una duración de, por lo menos, dos años.

En caso de que coexista deficiencia derivada del síndrome de dependencia con deficiencia resultante de daño cerebral secundario al uso de sustancias psicodilílicas, se tomará la deficiencia mayor, de acuerdo con lo planteado en el numeral 6° del Título Preliminar.

Se hará la suma combinada de la deficiencia correspondiente a cada patología.

La deficiencia propia del síndrome de dependencia está dada por la alteración en la organización consciente y voluntaria de los diferentes tipos de actividad; en este caso, por dificultad en el manejo del impulso que lleva al consumo, lo cual se manifiesta por diversos tipos de conducta. Para calificar los trastornos por abuso de sustancias, se utiliza la Tabla 13.8, escogiendo un valor único de acuerdo con los criterios descritos por categorías.

Tabla 13.5 Trastorno de Dependencia debido al uso de Sustancias Psicoactivas.

Clase	Descripción de Criterios		% Deficiencia
	Severidad de la Alteración	Tiempo de Evolución del Trastorno	
Clase I (leve)	Pérdida del control en el uso de las sustancias. Aumento en la cantidad o frecuencia del consumo. Persistencia del uso a pesar de consecuencias dañinas. Abandono de responsabilidades laborales, familiares y sociales. Gran consumo de tiempo en la adquisición y el consumo de la sustancia. En ocasiones, dependencia fisiológica (síndrome de abstinencia)	Hasta 10 años y/o menos de cuatro períodos de dependencia. La duración del último período de dependencia es hasta de dos años, incluyendo el período de remisión parcial.	20%
Clase II (Moderada)	Pérdida del control en el uso de las sustancias. Aumento en la cantidad o frecuencia del consumo. Persistencia del uso a pesar de consecuencias dañinas. Abandono de responsabilidades laborales, familiares y sociales. Gran consumo de tiempo en la adquisición y el consumo de la sustancia. En ocasiones, dependencia fisiológica (síndrome de abstinencia).	Más de diez años y/o más de cuatro períodos de dependencia. La duración del último período de dependencia es de más de dos años, incluyendo período de remisión parcial.	40%

13.5. Deficiencias producidas por trastorno de inicio de la infancia, niñez y adolescencia.

13.5.1. Discapacidad Intelectual.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Se trata de un estado de desarrollo intelectual incompleto o detenido caracterizado por deficiencia en la organización de las capacidades que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognitivas, el lenguaje y las habilidades motrices o sociales. Puede estar asociada con otras alteraciones mentales o físicas.

Estas discapacidades intelectuales se caracterizan por el compromiso en cinco áreas:

1. Habilidades intelectuales, que incluyen diferentes capacidades cognitivas como el razonamiento, la planificación, la solución de problemas, pensar de manera abstracta, aprender con rapidez, entre otros. Esta dimensión considera al Coeficiente Intelectual como la mejor representación del funcionamiento intelectual. Esta es valorada en el presente capítulo.
2. Conducta adaptativa, conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que son aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria.
3. Participación, interacción y roles sociales.
4. Salud física, mental y factores etiológicos que se basan principalmente en las categorías de factores de riesgo: biomédico, social, comportamental y educativo.

Contexto (ambientes y cultura) y se refiere a las condiciones interrelacionales en las que cada persona vive diariamente.

La Clasificación Psicopedagógica de la Discapacidad Intelectual propuesta por la Organización Mundial de la Salud - OMS, se basa en cinco tipos, las cuales poseen características referidas a funciones y capacidades que poseen las personas con cualquiera de los diagnósticos referidos arriba (Stefanini, 2004). Para efectos de la calificación, se utiliza la Tabla 13.6. Discapacidad Intelectual, escogiendo un porcentaje de calificación o valor único según la categoría y la descripción de criterios.

Tabla 13.6 Discapacidad Intelectual

Clase	Descripción de criterios (Intensidad del trastorno)	% Deficiencia
Clase I Discapacidad Intelectual límite	Presentan muchas posibilidades, manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna dificultad concreta de aprendizaje.	20%
Clase II Discapacidad Intelectual ligera	Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación y, tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras.	40%
Clase III Discapacidad Intelectual moderada o media	Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la comprensión de los convencionalismos sociales.	70%
Clase IV Discapacidad Intelectual severa	Generalmente necesitan protección o ayuda ya que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro psicomotor.	90%
Clase V Discapacidad Intelectual profunda	Presentan un grave deterioro en los aspectos sensorio-motrices y de comunicación con el medio.	100%

Nota: Para efectos de calificación se tienen en cuenta pruebas neuropsicológicas completas, no tipo tamiz y las mismas deben ser coherentes con edad y condición a evaluar. Es de anotar que aquí NO se debe aplicar el Mini Mental o MEC dado que se trata de un test de cribado de demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas.

13.5.2. Trastornos generalizados del desarrollo.

Para efectos del presente Manual, se incluyen estos trastornos que comienzan durante la infancia o niñez con deterioro o retardo del desarrollo en las funciones estrechamente relacionadas con la maduración

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

biológica del Sistema Nervioso Central, siendo de curso progresivo, sin remisiones, ni recaídas. El grupo de los trastornos generalizados del desarrollo abarca el autismo infantil, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y otros trastornos generalizados poco definidos. Para que estos trastornos se consideren como tales y se califiquen, se requiere que se hayan iniciado antes de los tres años de edad.

Tabla 13.7. Puntaje de deficiencia por trastornos generalizados del desarrollo.

Clase	Criterios de severidad de la alteración	% Deficiencia
Clase I. Leve	Poco interés en el establecimiento de relaciones interpersonales; dificultad en el establecimiento de la comunicación; poco desarrollo de intereses y actividades.	20%
Clase II. Moderado	Defecto en el establecimiento de relaciones interpersonales; deficiente comunicación con los demás; deficiente comunicación en la conducta.	40%
Clase III. Grave	Evidente deficiencia para el establecimiento de las relaciones interpersonales; escaso desarrollo de la comunicación con los demás; pobre organización de la conducta.	60%
Clase IV. Severo	Carencia notoria para el establecimiento de las relaciones interpersonales; evidente deficiencia en la comunicación (es inteligible); no organización consciente y voluntaria de la conducta.	70%

13.5.3. Trastornos del aprendizaje.

También llamados trastornos de las habilidades académicas, hacen referencia a dificultades en la adquisición de los elementos básicos para el desarrollo de un proceso educativo, tales como trastornos de la lectura, trastornos de la escritura y trastornos del cálculo. Este se califica exclusivamente, **si no presenta** una discapacidad intelectual, con la Tabla 13.8., aplicando su valor único según criterios expuestos.

Tabla 13.8 Trastornos del Aprendizaje.

Clase	Criterios de severidad de la alteración	% Deficiencia
Única	Alteración en la adquisición de los procesos de lectura, escritura y cálculo, hasta el punto de interferir significativamente con el desempeño académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren de estas habilidades.	20%

13.5.4 Trastornos de la personalidad. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones **emocionales**, afectivas, motivacionales y de relación social de los individuos. Este grupo comprende una diversidad de afecciones y de rasgos conductuales clínicamente significativos (es decir, producen malestar individual o dificultad en la adaptación social -para el DSM-IV), que tienden a ser persistentes y que parecen ser la expresión del estilo de vida característico de la persona y de su modo de relacionarse con los demás. Para los fines de la calificación de la deficiencia se consideran los trastornos específicos de la personalidad, trastornos mixtos de la personalidad y los cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o enfermedad cerebral.

Para que sean considerados como tales y para fines de la calificación, los trastornos de personalidad deben haber surgido por lo menos desde la adolescencia y los cambios perdurables de la personalidad deben tener

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

más de dos años como tiempo de evolución total. Igualmente, para que se califiquen estos trastornos deben hacerse evidentes en las diferentes situaciones vitales y en las diversas etapas de la vida.

Estos patrones están relacionados con dos o más de las siguientes áreas:

1. Cognición (forma de percibir e interpretarse uno mismo, a los demás y a los acontecimientos).
2. Afectividad (Reactividad, intensidad, labilidad e inadecuación de la respuesta emocional).
3. Relaciones interpersonales
4. Control de impulsos.

Estos patrones son persistentes e inflexibles y se extienden a las diferentes áreas de las personas (familiar, social, laboral), provocando malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Los rasgos de personalidad por su parte, están conformados por patrones más o menos persistentes de percibir, pensar y relacionarse sobre o con el entorno y sobre uno mismo. Pero dichos patrones no tienen la rigidez propia del trastorno de personalidad y aseguran una adecuada adaptación. Existiría un **continuum** entre los rasgos y los trastornos de personalidad a través del cual se aseguraría una mayor o menor adaptación.

Para los fines aquí perseguidos, solamente se calificarán los trastornos de personalidad.

Con base en el DSM-IV los trastornos específicos de la personalidad se clasifican en tres grupos:

1. Grupo A (extraños, excéntricos): Comprende los trastornos esquizoide, paranoide y esquizotípico de personalidad.
2. Grupo B (dramáticos, emotivos): Comprende los trastornos histriónico, asocial (o psicopático), emocionalmente inestable (borderline o límitrofe) y narcisista de personalidad.
3. Grupo C (ansiosos, temerosos): Comprende los trastornos ansioso (o evasivo), dependiente y anancástico (u obsesivo compulsivo).

Los cambios perdurables de la personalidad (de acuerdo con el CIE-10), no atribuibles a lesión o enfermedad cerebral, en cambio aparecen, no en relación con el proceso de desarrollo, sino “después de la exposición a estrés prolongado, catastrófico o excesivo” (a veces, posterior a un cuadro de trastorno de estrés postraumático) o después de una enfermedad mental grave. El cambio perdurable de personalidad, aunque asociado con los factores descritos, en ningún momento es causado por el estrés; este concepto sugeriría una acentuación de rasgos previos con la consiguiente desadaptación. Es importante la consideración de los trastornos del comportamiento en la evaluación de la deficiencia de los diferentes trastornos de la personalidad.

Para calificar las deficiencias por trastornos de la personalidad se utiliza la Tabla 13.9 trastornos de Personalidad y Cambios Perdurables de personalidad (Eje II)

Tabla 13.9 Trastornos de Personalidad y Cambios Perdurables de Personalidad (Eje II)

Clase	Descripción de criterios		% Deficiencia
	Diagnóstico	Severidad o Intensidad del Trastorno	
I. Clase Única	GRUPO A (extraños, excéntricos) – Trastorno paranoide – Trastorno esquizoide – Trastorno esquizotípico	Pobreza en los vínculos interpersonales; fantasías importantes de desconfianza, amenaza, o de carácter mágico.	0% Cuando coexiste con un cuadro clínico (eje I) que da lugar a un deterioro de la actividad o funcionamiento mental. (Clases III, IV y V)
	GRUPO B (dramáticos, emotivos): – Trastorno histriónico – Trastorno asocial (psicopatía)	Impulsividad, o emotividad marcada o especialmente lábil, poca tolerancia a la frustración, deficiente organización del sistema de intereses y valores e interés notorio en la propia persona y	20% Cuando coexiste con un cuadro clínico del eje I que no da lugar

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

	<ul style="list-style-type: none"> – Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable (fronterizo o borderline) – Trastorno narcisista 	desconsideración de los demás, expresado en fantasías, actitudes y conductas.	a deterioro de la actividad o funcionamiento mental (Clase I y II) 40% Cuando no existe trastorno en el eje I.
	GRUPO C (ansiosos, temerosos) <ul style="list-style-type: none"> – Trastorno de personalidad ansioso (evitación) – Trastorno por dependencia – Trastorno anancástico (obsesivo compulsivo) 	Marcada preocupación por las relaciones interpersonales, asociadas con ansiedad y actitudes y/o conductas de evitación, sumisión y control.	
	Cambios perdurables de la personalidad	Marcada hostilidad y desconfianza, aislamiento notorio, ansiedad y depresión, o marcada dependencia y demanda hacia las demás personas incapacidad para mantener relaciones interpersonales, notoria pasividad y disminución de los intereses, actitud y conducta enfermiza acentuada.	

Capítulo XIV
Deficiencia por Alteración de las Extremidades Superiores e Inferiores

14.1. Objetivo. Proveer los criterios para la evaluación de la deficiencia anatómica y funcional permanente de las extremidades superiores e inferiores.

14.2. Alcance. Este capítulo valora las deficiencias a nivel articular dejadas como resultado por patologías o grupos de patologías que afectan las extremidades superiores e inferiores, tejidos blandos, músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas y articulaciones. En las cuales se incluye las amputaciones y las enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular. Las patologías vasculares de las extremidades superiores e inferiores se califican en el capítulo de las deficiencias por alteraciones cardiovasculares. Así mismo, las patologías de los nervios periféricos se califican en el capítulo de las deficiencias de las alteraciones del Sistema Nervioso Central y Periférico.

14.3. Definiciones y Principios de Evaluación.

Los siguientes son los criterios para la evaluación de las extremidades superiores e inferiores:

El rango de movimiento articular es el factor único para determinar los valores de deficiencia global.

Rango de movimiento articular:

Se define como la cantidad de flexibilidad permitida por una articulación y se mide en grados de un ángulo desde el punto inicial al punto final del posible movimiento. Se refiere a los ejes de movimiento articulares. La pérdida de función puede deberse a la limitación de la movilidad ocasionada por lesión, dolor, anquilosis, deformidades, amputaciones o coexistencia de dos o más de estas condiciones de salud.

Cuando hay daño de varios ejes, articulaciones o segmentos se deben tener en cuenta los criterios de valoración que a continuación se describen:

14.3.1. Deficiencia por pérdida de los rangos de movimiento.

Para la determinación de los rangos de movimiento de la estructura o de la extremidad se utiliza la goniometría de superficies (medición de los grados del ángulo de movimiento de una articulación); este examen puede llevarse a cabo de manera fiable y efectiva en las articulaciones de las extremidades, de manera que el rango de movimiento se puede definir objetivamente.

14.3.2. Mediciones clínicas del movimiento.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

El rango de movimiento pasivo se debe medir para obtener la calificación de la deficiencia. Previa corroboración con la anatomo-patología o fisiopatología. En el caso de no evidenciarse daño, la deficiencia será de 0%.

Si la extremidad contralateral no se encuentra afectada ni fue lesionada previamente, ésta debe emplearse para determinar el estado normal de dicha persona.

Las mediciones del rango de movimiento articular se aproximan al número entero más cercano terminado en 0: de esta forma, el grado de movimiento articular no se registra como 32° o como 48° sino como 30° y 50°, respectivamente.

En el caso de que el valor de la deficiencia global por cualquier daño de la extremidad, sobrepase el valor de la deficiencia global por amputación del segmento o estructura comprometida, esta debe ser igual al que corresponda a la deficiencia por amputación de dicho segmento.

14.3.3. Definiciones de sistema de referencia cero neutral y posición funcional.

El sistema de referencia goniométrico **cero neutral** se utiliza para todas las mediciones articulares; se basa en la premisa de que a la posición neutral de una articulación se le asignan cero grados (0°), tal como se ilustra a manera de ejemplo en la Figura 14.1. En efecto, la “posición anatómica extendida” se asume como 0° en vez de 180°, y los grados del movimiento articular aumentan en la dirección en que la articulación se desplaza desde el punto de inicio 0°.

El término extensión describe el movimiento opuesto a la flexión. La extensión incompleta desde una posición flexionada al punto de inicio neutral se define como el **déficit de extensión**. La extensión que excede la posición inicial de cero, tal como se puede observar en una articulación MCF normal, el codo y las articulaciones de la rodilla, se denomina hiperextensión. La anquilosis se refiere a la ausencia total de movimiento articular.

El **arco de movimiento** representa el número total de grados trazados entre las dos posiciones de los extremos del desplazamiento en un eje específico del movimiento (flexo-extensión); por ejemplo, desde la flexión máxima hasta la extensión máxima de la articulación IFP. Cuando una articulación cuenta con más de un eje de movimiento, cada tipo de movimiento se denomina una **unidad de movimiento**. Por ejemplo, la muñeca tiene dos unidades de movimiento: flexión/extensión (AP o plano sagital) y desviación cubital/radial (plano lateral o coronal).

El término **posición funcional** articular denota el ángulo o ángulos de deficiencia óptimo(s) o mínimo(s) recomendados para la fusión articular quirúrgica. Cuando una articulación tiene más de un eje de movimiento, se le asigna a cada eje por separado una posición funcional. Por ejemplo, la posición funcional del codo se considera como 80° flexión.

14.3.4. Evaluación del movimiento.

“Los profesionales idóneos para realizar la evaluación de movilidad articular, aplicando la técnica de goniometría o haciendo uso de pruebas funcionales basadas en la biomecánica son el médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación, el especialista en traumatología y ortopedia, el medico laboral dentro de la valoración en el proceso de calificación, el o la Terapeuta Física y el terapeuta ocupacional quienes deben evaluar, tanto el movimiento activo como el movimiento pasivo, con el fin de determinar el rango de movimiento de las articulaciones.

El movimiento activo o voluntario es un movimiento que se realiza por la contracción activa de los músculos y es el primero en evaluarse. Para efectos de calificación, este No es aplicable por la subjetividad.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para efectos de calificación, el que se utiliza es el movimiento pasivo, producido por una fuerza externa que estima la libertad y el rango de movimiento de una articulación en un momento de relajación muscular.

El examinador comparará los resultados observados con otros resultados documentados, con el fin de establecer la fiabilidad de las mediciones. Se toma en consideración que las personas pueden no demostrar sus plenas capacidades.

14.3.5. Calificación del rango de movimiento articular. Con el fin de facilitar la reproducibilidad, se establece la pérdida del movimiento mediante los criterios proporcionados en las tablas para rango de movimiento de este capítulo que corresponden al pulgar, los dedos, la muñeca, el codo, el hombro para el caso de miembros superiores y de cadera, la rodilla, el tobillo, el metatarso y de dedos para miembros inferiores. Cada tabla provee una pérdida de rango de movimiento en grados que sitúan a la persona dentro de una clase de grado de deficiencia, el cual, a su vez, suministra un porcentaje. Las deficiencias para la anquilosis prevén deficiencias específicas basadas en la posición articular permanente

Cuando hay compromiso de restricción de movimiento de más de una unidad articular, la suma de estas **no debe superar** el valor de la deficiencia por anquilosis en posición funcional. El valor final es la suma real de las deficiencias por restricción de la movilidad articular pasiva y si se supera el valor de la anquilosis se toma el valor correspondiente a la anquilosis en posición funcional. Es de precisar que el valor asignado en caso de una anquilosis, NO DEBE superar el valor por amputación correspondiente al mismo segmento corporal.

14.4. Deficiencias por Alteraciones de las Extremidades Superiores. Para efectos de esta sección del capítulo actual se contemplan las siguientes regiones o estructuras:

Mano y dedos: que incluye las articulaciones carpo metacarpianas (CMC), metacarpo falángicas (MCF) e interfalángicas (IF).

Muñeca: incluye las articulaciones radio cubitales, radio carpianas y cúbito carpianas distales.

Codo: incluye las articulaciones húmero-cubitales y radio-cubitales proximales.

Hombro: incluye las articulaciones escápulo-torácicas, escápulo-claviculares, esterno-claviculares y glenohumerales.

En todos los casos es importante tener presente el hemisferio dominante del individuo, dado que las funciones de la vida cotidiana son más dependientes de la extremidad superior dominante (diestro o zurdo). La disfunción de la extremidad superior no dominante se traduce en una menor deficiencia que la disfunción de la extremidad dominante. Para la valoración de la extremidad superior dominante, una vez se obtenga el valor de la deficiencia global resultante de dicha estructura o extremidad corporal, debe agregarse proporcionalmente un 20% de dicho valor a esta deficiencia mediante fórmula combinada de valores.

Pasos para obtener el valor final de la deficiencia global de la estructura o extremidad corporal dominante:

1. **Deficiencia global de la estructura o extremidad x 0.2** = Valor para sumar en forma combinada a la deficiencia global del segmento.
2. **Deficiencia global final** = Suma combinada de la deficiencia global de la estructura o extremidad + valor para agregar obtenido mediante la fórmula del numeral anterior.

14.4.1. Deficiencia global por pérdida de arcos de movilidad del pulgar.

El pulgar cuenta con tres unidades articulares: la articulación interfalángica (IF), la articulación metacarpofalángica (MCF) y la articulación carpometacarpiana (CMC). Debido a que estos se expresan con el mismo valor relativo del denominador, los porcentajes de deficiencia global aportados por cada unidad se suman aritméticamente. A las cinco unidades de movimiento funcionales del pulgar se les ha asignado un valor relativo para el pulgar completo en una escala del 100%, de la siguiente forma (fFguras 14.1 a 14.6)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”




Figura 14.1 Movimientos articulación Carpometacarpiana. *Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis (AO) y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)



Figura 14.2 Oposición de Pulgar




Figura 14.3 Movimiento Flexión articulación Metacarpofalángica







Figura 14.4 Movimiento extensión articulación Metacarpofalángica



Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Figura 14.5 Movimiento Flexión interfalángica del pulgar a partir de la posición 0°

Figura 14.6 Movimiento de extensión interfalángica del pulgar a partir de la posición 0°.

Tabla 14.1. Deficiencias por disminución de los rangos de movilidad del pulgar.

Clase Funcional		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4		
Grado		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo (Anquilosis)		
Articulación	INTERFALÁNGICA (IF) – representa el 15% de la deficiencia del pulgar							
Flexión (F)	° grados encontrados	> o igual 80°	<80° ≥60°	<60° ≥20°	< 20° > 0°	20° F	10° F a 10° E	≥ a 10° E
	% de deficiencia	0%	0,50%	1,00%	2%	3%	4%	5%
Extensión (E)	° grados encontrados	≥ 30°	< 30° >20°	<20° ≥10°	<10° > 0°			
	% de deficiencia	0%	0,50%	1,00%	2%			
Articulación	METACARPOFALÁNGICA (MCF) representa el 10% de la deficiencia del pulgar							
Flexión (F)	Movilidad en grados encontrados	≥ 60°	<60°≥40°	<40° a ≥20°	< 20° ≥ 10°	≤ 30°	>30° < 60°	≥ 60°
	% de deficiencia	0%	1%	3%	5%	6%	7%	8%
Extensión	La articulación MCF del pulgar no tiene movimiento de extensión. Taboadela, C (2007) Goniometría*							
Articulación	CARPOMETACARPIANA (CMC) representa el 75% de la deficiencia del pulgar							
Aducción	Además la aducción no puede efectuarse porque el pulgar en este movimiento choca contra la mano. Taboadela, C (2007) Goniometría*							
Abducción	Movilidad en grados encontrados	> a 70°	<70° >50°	<50° ≥20°	< a 20° >0°		30° a 40°	≤ 20°
	% de deficiencia	0%	2%	2,5%	3%		8%	≥ 50°
Oposición	Movilidad en cm encontrados	> 7cm	<7 ≥5 cm	<5 ≥2 cm	< 2 cm > 0 cm		4 cm o ≥ 6 cm	< 4cm
	% de deficiencia global	0%	3%	3,5%	4%		8%	15%

*La flexión y la extensión carpometacarpiana son movimientos difíciles de cuantificar debido a la dificultad que existe para la identificación de los reparos óseos y para la alineación del goniómetro. Por eso, no son mediciones que se utilicen de rutina. En caso de necesitarlas, es preferible realizarlas con radioscopia. Para efectos de calificar deficiencia no se considera. Taboadela, C (2007) Goniometría

La aducción no puede efectuarse porque el pulgar en este movimiento choca contra la mano. Taboadela, C (2007) Goniometría

14.4.2. Deficiencia por pérdida de arcos de movilidad de los dedos 2º a 5º: El dedo cuenta con tres unidades articulares: articulación interfalángica distal (IFD), articulación interfalángica proximal (IFP) y articulación metacarpofalángica (MCF) (Figuras 14.7 y 14.8). Estas tres unidades de movimiento poseen el mismo valor funcional relativo que el relacionado en la deficiencia por amputación así:




Figura 14.7. Posición neutral y flexión de la articulación interfalángica distal de los dedos.




Figura 14.8. Posición neutral y flexión de la articulación interfalángica proximal de los dedos.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

A diferencia del pulgar, estas unidades no se expresan mediante el mismo valor relativo para el denominador; consecuentemente, las deficiencias globales aportadas respectivamente por cada unidad se combinan mediante la fórmula de valores combinados de deficiencias. La deficiencia global obtenida por cada unidad o unidades, no debe sobrepasar el valor total de la deficiencia global obtenido por amputación del o los segmentos o del dedo completo.

Tabla 14.2. Deficiencias globales por disminución de los rangos de movilidad de los dedos índice, medio, anular y pequeño (excepto el pulgar):

Clase Funcional		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4		
Grado		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo (Anquilosis)		
Articulación:	INTERFALÁNGICA DISTAL (IFD) - representa el 45% de la deficiencia del dedo							
Flexión (F)	° grados de movilidad encontrados	≥ 70°	<70° ≥ 40°	< 40° ≥ 20°	< 20° > 0°	≤ 20°	<70° ≥ 20°	≥ 70°
	% Deficiencia índice o medio	0%	1,5%	2,5%	5,0%	3%	4,0%	5,0%
	% Deficiencia anular o el meñique	0%	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
Extensión (E)	Las articulaciones IFD de los dedos de la mano no tienen movimiento de extensión. Taboadela, C (2007) Goniometría							
Articulación	INTERFALÁNGICA PROXIMAL (IFP) - representa el 80% de la deficiencia del dedo							
Flexión (F)	° grados de movilidad	≥ 90°	<90° ≥ 60°	<60° ≥ 30°	< 30° > 0°	≤ 20°	<70° ≥ 20°	≥ 70°
	% Deficiencia índice o el medio	0%	2%	3%	4%	5%	7%	8%
	% Deficiencia anular o el meñique	0%	1%	1,5%	2%	3%	3,5%	4%
Extensión (E)	Las articulaciones IFP de los dedos de la mano no tienen movimiento de extensión. Taboadela, C (2007) Goniometría							
Articulación	METACARPOFALÁNGICA (MCF) - representa el 100% de la deficiencia del dedo							
Flexión (F)	° grados de movilidad	≥ 70°	40° a 60°	20° a 30°	≤ 10° F	30°F	20°F a 10° E	≥ 10° E
	% Deficiencia índice o el medio	0%	2%	4%	5%	5,5%	7,0%	10%
	% Deficiencia anular o el meñique	0%	1%	2%	2,5%	2,5%	3,5%	5,0%
Extensión (E)	° grados de movilidad	≥ 50°	40° a 30°	20° a 10°	< 10°			
	% Deficiencia índice o el medio	0%	1%	4%	10%			
	% Deficiencia anular O el meñique	0%	0,5%	2%	5%			

14.4.3. Deficiencia por pérdida de arcos de movilidad de la muñeca. La unidad articular de la muñeca representa el 60% de la función de la extremidad superior. Esta posee dos unidades de movimiento funcionales (Figuras 14.9 y 14.10). Para estas unidades, las deficiencias globales aportadas por cada unidad se suman aritméticamente. Tratándose de las anquilosis, se debe tomar el valor de la unidad que está más comprometida, como valor único de la deficiencia para la muñeca. De igual manera, cuando hay compromiso de restricción del movimiento en las dos unidades, la suma de estas no debe superar el valor de la deficiencia global por anquilosis.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”




Figura 14.9 Flexión-extensión de la muñeca a partir de la posición 0° (antebrazo en pronación). Taboadela, C (2007) Goniometría




Figura 14.10 Desviación radial y cubital de la muñeca a partir de la posición 0°. Taboadela, C (2007) Goniometría

Tabla 14.3. Deficiencias por disminución de los rangos de movilidad de la muñeca.

Clase Funcional	Grado	Clase 0		Clase 1		Clase 2		Clase 3		Clase 4		
		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo (Anquilosis)						
Articulación: Muñeca – flexo extensión : representa el 15% de la deficiencia de la muñeca												
Flexión (F)	° grados de movilidad encontrado	≥ 60°	<60°≥50°	<50°≥20°	<20°>0°	10°F a 10°E	20°E a 40° E	≥ 50° E	20°F a 40° F	≥ 50°F		
	% Deficiencia	0%	2%	4%	5%	18%	30%	50%				
Extensión (E)	° grados de movilidad encontrado	≥ 60°	<60°≥50°	<50°≥20°	<20°>0°							
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%							
Articulación: Muñeca: desviaciones - representa el 10% de la deficiencia de la muñeca												
Desviación radial (DR)	° grados de movilidad encontrado	>20°	≤20°	<20°≥10°	0°	0° a 10° de desviación cubital	10° de DR	≥ 20° de DR	20° de DC	≥ 30° de DC		
	% Deficiencia	0	1%	3%	4%	18%	30%	50%				
Desviación cubital (DC)	° grados de movilidad encontrado	>30°	<30°>20°	<20°>10°	<10° a 0°							
	% Deficiencia	0%	1%	3%	4%							

14.4.4. Deficiencia por pérdida de arcos de movilidad del antebrazo/codo. La unidad articular del antebrazo/codo representa el 70% de la función de la extremidad superior. El codo posee dos unidades de movimiento funcionales: la flexión/extensión y la pronación/supinación (Figuras 14.11 y 14.12). Para estas unidades las deficiencias globales aportadas por cada unidad se **suman** aritméticamente.




Figura 14.11 Flexión y extensión de codo




Figura 14.12 Pronación y supinación de antebrazo


Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

14.4.5. Pronación y supinación del antebrazo. Las deficiencias de pronación y supinación del antebrazo son atribuibles al codo, debido a que los músculos principales que controlan estas funciones se encuentran adheridos alrededor del codo. Esto aplica incluso si la pérdida de rotación del antebrazo es ocasionada principalmente por una afectación de la muñeca en presencia de un codo intacto. Tratándose de las anquilosis, se debe tomar el valor de la unidad que está más comprometida como valor único de la deficiencia para codo. De igual manera, cuando hay compromiso de restricción del movimiento en las dos unidades, la **suma** de estas no debe superar el valor de la deficiencia global por anquilosis.

Tabla 14.4. Deficiencias por disminución de los rangos de movilidad del codo/antebrazo.

Clase Funcional		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4		
Grado		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo (Anquilosis)		
Articulación:		CODO: Flexo extensión -representa el 60% de la deficiencia del codo						
Flexión	° grados de movilidad	≥ 140°	<140° ≥ a 100°	<100° ≥ 60°	< 60° > 0°	80°	40° a 70°	< ó = a 30°
	% Deficiencia Global	0%	10%	15%	20%	40%	45%	55%
Extensión	° grados de movilidad	0%	10° a 40°	50° a 60°	70° a 90°	> ó = a 90°		
	% Deficiencia Global	0%	2%	6%	12%	18%		
Articulación:		ANTEBRAZO – Pronación supinación- representa el 40% de la deficiencia del codo						
Pronación	° grados de movilidad	> ó igual a 80°	70° a 50°	40° a 20°	< ó = a 10°	20° de pronación	30 a 60° de pronación	> ó = a 70° pronación
	% Deficiencia Global	0%	1%	2%	6%	40%	45%	55%
Supinación	° grados de movilidad	> ó = a 70°	60° a 50°	40° a 20°	< ó = a 10°		10° a 20° pronación a 20° de supinación.	> ó = a 30° supinación.
	% Deficiencia Global	0%	2%	6%	12%			

14.4.6. Deficiencia por pérdida de arcos de movilidad del hombro: La unidad articular del hombro representa el 60% de la función de las extremidades superiores. El hombro posee tres unidades de movimiento funcionales: flexión y extensión, abducción y aducción y rotación interna o externa (Figuras 14.13, 14.14 y 14.15): Tratándose de las anquilosis, se debe tomar el valor de la unidad que está más comprometida como valor único de la deficiencia para el hombro. De igual manera, cuando hay compromiso de restricción del movimiento en más de dos unidades, la **suma** de estas no debe superar el valor de la deficiencia global por anquilosis.



Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Extensión: 0-40° (AO) y 0-60° (AAOS).




Figura 14.13 Flexión y extensión de hombro

Valores normales:

Abducción: 0-160°/180° (AO) y 0-180° (AAOS)




Figura 14.14 Abducción y aducción de hombro

Valores normales:

Rotación externa: 0-70° (AO) y 0-90° (AAOS).

Rotación interna: 0-70° (AO) y 0-70° (AAOS).




Figura 14.15 Rotación interna y externa de hombro


Tabla 14.5. Deficiencias por disminución de los rangos de movilidad del hombro.

Clase Funcional		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Grado		Normal	Leve	Moderado	Severo	Muy severo (Anquilosis)
Articulación: HOMBRO- Flexión- extensión- representa el 50% de la deficiencia del hombro						
Flexión (F)	° grados de movilidad encontrado	≥ 180°	<180° ≥ 80°	<80° ≥ 30°	<30° a 0°	20° F a 40° F
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	20% ≤ 20° F a 50° E ≥ 40° F a 180° F
Extensión(E)	° grados de movilidad encontrado	≥ 50°	<50° ≥ 30°	<30° ≥ 10°	< 10° a 0°	
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	
Articulación: HOMBRO: Abducción- Aducción-representa el 30% de la deficiencia del hombro						
Abducción (ABD)	° grados de movilidad encontrado	≥ 170°	<170° ≥ 90°	<90° ≥ 20°	< 20° a 0°	20° a 50° de ABD < 20° de ABD a 50° de ADD ≥ 50°
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	20% 30%
Aducción (ADD)	° grados de movilidad encontrado	≥ 40°	<40° ≥ 20°	<20° ≥ 10°	< 10° a 0°	
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	
Articulación: Hombro: Rotaciones-representa el 20% de la deficiencia del hombro						
Rotación interna (RI)	° grados de movilidad encontrado	≥ 80°	<80° ≥ 40°	<40° ≥ 20°	< 20° a 0°	20° a 50° RI ≥ 50° RI ≤ 20° RI a 70° RE
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	20% 30%
Rotación externa (RE)	° grados de movilidad encontrado	≥ 60°	<60° ≥ 20°	<20° ≥ 10°	< 10° a 0°	
	% Deficiencia	0%	1%	2%	3%	

14.4.7. Amputaciones de estructuras o extremidades superiores.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Figura 14.16. Estimados de deficiencia para amputación de



14.4.7.1. Deficiencia por amputación.

La deficiencia por amputación se realiza con base en el nivel de la amputación.

Las deficiencias globales por amputación se deben combinar mediante la fórmula de valores combinados con las deficiencias globales obtenidas por pérdida del movimiento de las articulaciones y con las pérdidas neurológicas en la parte conservada de la estructura o extremidad (no de la parte amputada o del muñón por considerarse incluida en el valor de la amputación) y las propias al diagnóstico (ej: cáncer o problemas vasculares) que las ocasionó.

14.4.7.2. Amputación de pulgar y dedos.

Los dedos representan cinco unidades coordinadas que contribuyen desigualmente a la función de la mano. Con el fin de evitar confusiones, a los dedos se les designa por su nombre, en vez de un número: pulgar, índice, medio, anular y meñique. A cada dedo se le asigna un valor relativo para la mano entera, así (Figura 14.17):




Figura 14.17. Valores de deficiencia de amputación de dedos y mano.

- Pulgar: 40%.
- Índice y medio: 20% cada uno.
- Anular y meñique: 10% cada uno.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para efectos de este Manual, se entiende que hay amputación cuando la pérdida compromete el tejido óseo. A aquellas amputaciones que sean menores del 50% del tamaño de la falange, se les asignará el valor del 50% de la deficiencia global correspondiente. Si son mayores o iguales al 50% del tamaño de la falange, se les asignará el valor total de la deficiencia global correspondiente a ella. La deficiencia se determina individualmente para cada amputación del pulgar, dedos, mano; las deficiencias globales de estos **se suman aritméticamente**; sin embargo, estos valores no puede exceder el 100% de la deficiencia global asignada a cada unidad anatómica.

Tabla 14.6. Calificación de deficiencias por amputación de la extremidad o de un miembro superior

Nivel	% Deficiencia global
Pulgar a:	
Articulación interfalángica	16 %
Articulación metacarpofalángica (MCF)	18 %
A mitad del metacarpiano	20 %
A nivel de la articulación carpometacarpiana (CMC)	22 %
Dedos índice y medio:	
Articulación interfalángica distal (IFD)	6 %
Articulación Interfalángica Proximal (IFP)	10 %
Articulación metacarpofalángica (MCF)	11 %
A mitad del metacarpiano	12 %
A nivel de la articulación carpometacarpiana (CMC)	14 %
Dedos anular y pequeño a nivel:	
Articulación interfalángica distal (IFD)	3 %
Articulación interfalángica proximal (IFP)	4 %
Articulación metacarpofalángica (MCF)	5 %
A mitad del metacarpiano	7 %
A nivel de la articulación carpometacarpiana (CMC)	7 %
Mano - antebrazo:	
Todos los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica (excepto el pulgar)	32 %
Todos los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica	54 %
Pérdida de todos los dedos, ó la mano ó el antebrazo a nivel de la inserción distal del bíceps hasta nivel transmetacarpofalángico.	56 %
Brazo:	
Distal a la inserción del deltoides a la inserción bicipital.	58 %
Inserción deltoidea y proximal	60 %
Hombro	
Desarticulación del hombro	60 %
Desarticulación escapulotorácica	70 %

14.4.7.3. Condiciones especiales relacionadas con la amputación.

La evaluación del muñón residual debe incluir una valoración del estado del cubrimiento del tejido blando, del nervio periférico y de los sistemas vasculares y del hueso mismo.

Neuromas digitales y lesiones del nervio digital: Las amputaciones que comprometen los dedos pueden conllevar a una pérdida sensorial residual derivada de la lesión nerviosa y pueden presentar un neuroma o dolor fantasma en la parte conservada del dedo. El valor de deficiencia asignado por amputación incluye el dolor y el malestar, los contornos anormales del tejido blando del muñón y los cambios vasculares, como la intolerancia al frío. Por lo anterior, se deberá sumar a esta deficiencia global el diez por ciento (10%) de la misma obtenida por la amputación.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Ejemplo: Si se obtiene por amputación a nivel de la articulación interfalángica distal (IFD) del dedo índice, un 5% de deficiencia global, se debe agregar o sumar el 10% de esta deficiencia, es decir el 0,5%; así, el valor final obtenido será de 5,5%. Este método de cálculo de la deficiencia debe repetirse para cada radio (pulgar y dedos).

La metodología de este numeral se aplica para cualquier neuroma debidamente diagnosticado en los demás segmentos corporales amputados. De igual manera y con el mismo procedimiento se aplica para los miembros fantasma medicamente diagnosticados.

14.4.7.4. Amputaciones con pérdida del rango de movimiento.

La deficiencia ocasionada por la pérdida o la restricción del movimiento de las articulaciones proximales se evalúa según los criterios del numeral y las tablas respectivas. Para cada unidad funcional la calificación de la deficiencia no puede exceder el 100% de la unidad. En este orden de ideas, la deficiencia final para el dedo no puede exceder el 100% del dedo e igualmente, las deficiencias de la mano determinadas por la amputación, la pérdida del movimiento y la pérdida neurológica, no pueden exceder el 100% de la mano. Esta regla aplica para toda la estructura o extremidad superior.

14.5. Deficiencias por Alteraciones de las Extremidades Inferiores.

Para efectos de este capítulo se contemplan las siguientes regiones o estructuras de distal a proximal, en tres segmentos:

- a. **Pie y tobillo:** Desde la diáfisis de la tibia hasta las yemas de los dedos.
- b. **Rodilla:** Desde la diáfisis del fémur hasta la diáfisis de la tibia.
- c. **Cadera:** Desde el cartílago articular del acetábulo hasta la diáfisis del fémur.

Para el rango de movimiento se deberán tener en cuenta las consideraciones del numeral 14.3 de este capítulo. Igualmente, para la deficiencia por pérdida de los rangos de movimiento, se deberán tener en cuenta las consideraciones del numeral 14.3.1. Para el Sistema de referencia Cero Neutral y posición funcional se tendrán en cuenta los mismos criterios del numeral 14.3.3.

14.5.1 Metodología de cálculo de la deficiencia por pérdida de los rangos de movimiento:

Criterio. Deficiencia de articulación (factor único o principal): Disminución de los rangos de movilidad articular de los diferentes segmentos del miembro inferior. Su severidad se clasifica en tres grados: **leve, moderado y severo**, de acuerdo con el porcentaje de la deficiencia.

Los valores de deficiencia para el miembro inferior se expresan en términos de deficiencia global.

Los pasos para la valoración de la deficiencia por pérdida de los rangos de movimiento son:

1. Realizar la medición de los arcos de movimiento de cada articulación (bilateral) y para cada articulación de todas las unidades de movimiento (flexión, extensión, rotación interna y externa, inversión eversión, abducción y aducción).
2. Comparar los resultados obtenidos en la medición con las Tablas 14.7 a 14.13. Clasificar la deficiencia de cada componente de movimiento y asignar el valor de deficiencia global.
3. Sumar todos los valores de deficiencia de cada articulación para obtener la deficiencia de la articulación evaluada.
4. Si más de una articulación de cualquiera de los miembros (el mismo o contralateral) se encuentra comprometida, se califica cada una de acuerdo con el punto anterior (numeral 3) y los valores obtenidos de cada articulación se combinan entre sí.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Anquilosis: Cuando en una misma articulación se encuentren afectados varios ejes (flexo - extensión e inversión - eversión) se elige el de mayor valor, como el valor de la deficiencia por anquilosis. Los grados de amplitud articular que no aparecen en las tablas de este aparte, tienen un valor de 0%.

Tabla 14.7 Deficiencia de los dedos 2 al 5 del pie (por cada dedo)

Severidad		
Deficiencia	1%	
Extensión metatarsofalángica	Movimiento (Restricción en más del 50% o anquilosis)	

Tabla 14.8. Deficiencias primer dedo

Severidad	% de deficiencia por restricción	
Deficiencia Global	1%	2%
Movimiento		
Extensión metatarsofalángica	15° - 30°	0°- 9°
Flexión interfalángica	< 20°	No aplica

Tabla 14.9. Deficiencia en el movimiento de la articulación subastragalina

Severidad	% de deficiencia por restricción	
Deficiencia	1%	2%
Movimiento		
Inversión	10° - 20°	0°-9°
Eversión	0° - 10°	No aplica

Tabla 14.10. Deficiencia por anquilosis de la articulación subastragalina

Severidad	Leve	Moderada	Severa
Deficiencia Global	6%	12%	20%
Posición Anquilosada en Inversión	0° - 9°	10° - 20°	Inversión completa
Posición Anquilosada en Eversión	0° - 9°	10°	Eversión completa



Figura 14.18 Inversión y eversión de articulación subastragalina


Tabla 14.11. Deficiencias en el movimiento del tobillo (tibioperoneastragalina).

Severidad	Leve	Moderada	Severa
-----------	------	----------	--------

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Deficiencia	6%	12%	20%
Movimiento			
Capacidad de flexión plantar	11° - 20°	1°-10°	No aplica
Posición Anquilosada en flexión (Deformidad en equino)	No aplica	10° - 19°	>19°
Extensión (Dorsiflexión)	10° - 0° (Neutro)	No aplica	No aplica
Posición Anquilosada en flexión plantar	Posición neutra 0° - 9°	10° a 39°	40° flexión plantar completa
Dorsiflexión	Posición neutra 0° - 9°	10° -19°	20° Dorsiflexión completa

Flexión 0-50° (AO) y 0-50° (AAOS).



Extensión: 0-30° (AO) y 0-20° (AAOS).




Figura 14.19 Flexo extensión de tobillo (tibioperoneoastragalina).

Tabla 14.12. Deficiencias en el movimiento de la rodilla.

Severidad	Leve	Moderada	Severa
Deficiencia de movilidad	5%	10%	12%
Grados de movilidad encontrados			
Flexión	80° - 109°	60°-79°	<60°
Extensión	10° - 30°	31° - 40°	50° - 150°
Deficiencia de anquilosis	15%	22%	28%
Posición Anquilosada en Flexión (F)	Posición neutra o hiper extensión 0° - 19° F	20°-39° F	40 - 50°F

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”




Figura 14.20 flexo extensión de rodilla

Tabla 14.13. Deficiencias en el movimiento de cadera.

Severidad	Leve	Moderada	Severa
Deficiencia	2%	5%	7%
Grados de movilidad encontrados			
Flexión	80° - 100°	50°-79°	<50°
Extensión	30°- 25°	25°- 16°	15°
Abducción	15° - 25°	5°-14°	<5°
Aducción	0° - 15°		
Rotación Interna	10° - 30°	9° - 0°	
Rotación Externa	20° - 30°	0° - 19°	
Anquilosis en posición encontrada			
Deficiencia Global	30 %	40%	50%
Posición Anquilosada en flexión	0° - 49°	50° - 69° 0 81° - 100°	70° - 80°
Posición Anquilosada en extensión	0° - 19°	20° - 30°	
Deficiencia Global	30 %	40%	50%
Posición Anquilosada en Abducción	0° - 19°	20°-39°	40°

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”




Figura 14.21 movimiento de cadera

14.5.2. Deficiencia por amputación.

La Tabla 14.14 permite la calificación por amputación del miembro inferior; la definición de la clase se realiza con base en el nivel de la amputación y se puede incrementar por problemas del muñón. Las deficiencias que pueden ser calificadas y combinadas con la deficiencia por amputación incluyen las pérdidas del movimiento en las articulaciones, las pérdidas neurológicas en la parte conservada del miembro y las atinentes al diagnóstico que la ocasionó. El valor de deficiencia por amputación se puede combinar con el obtenido en la valoración de Deficiencia por Disminución de los Rangos de Movilidad; no obstante lo anterior, el valor final de las combinaciones no podrá exceder en ningún caso el 100% del valor del segmento comprometido en la extremidad inferior.

Tabla 14.14. Deficiencia por amputación en miembro inferior.

Nivel	% Deficiencia global
Primer dedo a:	
Articulación metatarsiano (MTT)	8 %
Articulación metatarsofalángica (MTF)	5 %
Todos los dedos (excepto el primero)	
Por cada dedo a nivel interfalángica (IF)	1 %
Por cada dedo a nivel metatarsiano (MTT)	2 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Todos los dedos en la articulación metatarsofalángica (excepto el primero)	6 %
Por cada dedo a nivel Interfalangico (IF)	0 %
Medio pie	14 %
Syme (retropié)	20 %
Debajo de la rodilla, mayor o igual a 10 centímetros	28 %
Debajo de la rodilla, menor a 10 centímetros - Desarticulación de rodilla - Por encima de la rodilla - muslo distal	36 %
Por encima de la rodilla – proximal ó mitad del muslo	40 %
Desarticulación de cadera	50 %

14.6. Deficiencia por enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular.

Los criterios para la calificación de la deficiencia derivada de patologías tales como: articulares inflamatorias de etiología conocida como la artritis séptica y traumática; de etiología idiopática, como la artritis reumatoidea, artritis reumatoidea juvenil, espondilo artritis anquilosante, enfermedades del colágeno, **Lupus eritematoso sistémico (LES)**, esclerosis sistémica progresiva, dermatomiositis, vasculitis: degenerativas como artrosis de manos columna cervical, lumbar (sin embargo su uso no es para compromiso articular de columna vertebral para este se usa el capítulo 15), cadera y rodillas, metabólicas como gota, condrocalcinosis, osteoporosis y, extraarticulares como la bursitis, tendinitis, periartritis, síndromes de atrapamiento neural y fibrositis, son:

Criterio 1. Historial clínico (Factor principal): Signos y síntomas y medidas terapéuticas.

Criterio 2. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. (Factor modulador). Certeza diagnóstica de enfermedad articular e Imagenología diagnóstica (Rx gamagrafía).

Procedimientos Generales.

Metodología de calificación:

- Determine el tipo de patología.
- Identifique el factor principal y el factor modulador en la Tabla 14.15.
- Siga los pasos descritos en el numeral 5° del Título Preliminar a fin de determinar el valor de la deficiencia.

Tabla 14.15 Deficiencia por enfermedades del tejido conectivo que involucran el sistema osteomuscular a nivel del eje apendicular

CLASE		Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
DEFICIENCIA GLOBAL (%)	0 %		1% al 10%	11% al 36%	37% al 60%	61% al 90%
			(A B C)	(A B C)	(A B C)	(A B C)
		1 5 10	12 24 36	37 49 60	61 75 90	
Historial clínico (Factor principal) ²	Signos y Síntomas	No aplica o asintomático	Rigidez matinal < a una hora y dolor articular o artralgias migratorias (> o igual a 3 meses)	Además de lo anterior, la rigidez matinal es > o igual a 1 hora) y Sinovitis	Además de lo anterior, existe Poliartritis simétrica o migratoria, deformaciones desviaciones articulares	Además de lo anterior, existe manifestaciones extra - articulares ¹
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetiva. (Factor modulador).	Imagenología diagnóstica (Rx gamagrafía, otros)	Normales	Sin alteración significativa	Osteoporosis yuxtaarticular, pinzamiento articular,	Además de lo anterior, existe pequeñas erosiones articulares.	Además de lo anterior, existe Artrosis, subluxación, anquilosis fibrosa u ósea

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

*¹ las manifestaciones extra articulares presentes, se calificarán de acuerdo con el órgano afectado en el capítulo correspondiente y se combinaran los valores.

*² Para aplicar el numeral 14.6.2.6. Solo se tendrá en cuenta para el factor principal la presencia de sinovitis, deformaciones articulares, como criterios dados en las clase 2 y 3.

Tabla. 14.16 Acortamiento de la extremidad inferior

Acortamiento: (En centímetros)	% de Deficiencia
1 a 2	5 %
2,1 a 3	10 %
3,1 a 4	15 %
>4	20 %

La tabla se aplica para una extremidad inferior, en aquellos casos que presenten deficiencias adquiridas por acortamiento en ambas extremidades inferiores, la tabla se aplica para cada extremidad y los valores finales se combinan.

Si adicional al acortamiento, se genera compromiso de los arcos de movilidad articular, se califica en el capítulo respectivo y se combina.

14.6.1. Evaluación de la deficiencia por afecciones reumáticas degenerativas de columna vertebral.

La artrosis por sí sola es dolorosa en períodos agudos y por las reacciones inflamatorias de vecindad que provoca, o bien por los procesos neurológicos compresivos que se observan a nivel de la columna vertebral.

De tal manera que la ponderación de las deficiencias por artrosis, no debe basarse en la existencia propia de la enfermedad, sino en las limitaciones funcionales de las articulaciones que provoca la misma y los procesos neurológicos compresivos neurales de vecindad.

Por lo anterior, hay que remitirse a las tablas de evaluación de los rangos de movimiento articulares y al compromiso de los Nervios Espinales Periféricos, señalados en los capítulos correspondientes.

14.6.2. Evaluación de la deficiencia por enfermedades reumáticas metabólicas.

14.6.2.1. Gota

Cuando se producen crisis inflamatorias articulares a repetición, que provocan severas deformaciones, osteolisis y formación de tofos periarticulares, se califica con el valor C de la clase 3; si presenta, adicional al cuadro anterior, daño renal, se califica en el valor B de la clase 4 y se combina con el valor correspondiente al daño renal evaluado con los criterios del capítulo respectivo.

14.6.2.2 Condrocalcinosis

Cuando se ven comprometidas las articulaciones de las rodillas, hombros, muñecas y tobillos y se genera una artrosis secundaria, si esta es monoarticular, se evaluará según los rangos de movimiento articulares y capacidad funcional, es decir con las tablas de este capítulo. Cuando compromete dos o más articulaciones se califica con la Tabla 14.15.

14.6.2.3. Osteoporosis Generalizada

Es una patología de etiología primaria o secundaria, que se caracteriza por la pérdida de masa ósea, especialmente en la columna dorsolumbar, la pelvis, las caderas y las muñecas, que cuando son asintomáticas no producen deficiencia. Cuando existe dolor o espasmo muscular sin deformidad del esqueleto y se consigue una completa remisión de estos síntomas mediante una terapia continua a base de hormonas y minerales, se puede considerar una deficiencia global del 10%.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Cuando se necesita terapia continua para aliviar el dolor sin conseguir su remisión total, se considerará una deficiencia global del 20%. Cuando se producen fracturas patológicas por esta causa, se califica por las secuelas derivadas de las mismas en el capítulo correspondiente.

14.6.2.4. Evaluación de la deficiencia por reumatismos extra-articulares

Las alteraciones por reumatismos extraarticulares corresponden a bursitis, tendinitis o periartritis de origen microtraumático repetitivo. Las localizaciones más comunes son: Hombros (bursitis, tendinitis del supraespinoso, bicipital, etc.), epicondilitis, tendinitis del extensor del pulgar, tendinitis de los flexores de los dedos de las manos (dedo en resorte), bursitis peritrocantérica, bursitis de la pata de ganso.

En general se trata de patologías que responden muy bien al tratamiento médico y ocasionalmente quirúrgico, de tal manera que no provocan deficiencia. Sin embargo, si ocasionan secuelas, estas se evaluarán en las tablas que correspondan a la deficiencia por disminución de los rangos de movimiento articulares.

Cuando se habla de fibrosis, se incluye a aquellos pacientes que presentan mialgias, artralgias, parestesias, contracturas musculares, etc. sin una base orgánica evidente y que habitualmente corresponden a trastornos funcionales no psicóticos. Su evaluación se ubica dentro del campo de la psiquiatría, dado que siempre el examen físico osteoarticular y de laboratorio resultan normales y si existieran alteraciones radiográficas, estas no serían de significación clínica.

14.6.2.5. Fibromialgia

Diagnosticada de acuerdo con los criterios de la American College of Rheumatology, se califica de acuerdo con la clasificación así:

- **Primaria:** No presenta otras afecciones que permitan explicar los síntomas, por lo cual se califica en el capítulo de deficiencias por enfermedad mental y trastornos del comportamiento.
- **Concomitante y secundaria:** Se asocia a otra afección que puede explicar solo parcialmente los síntomas, o cuando ocurre por una afección subyacente que es su causa; en los dos casos, adicional a la consideración de la fibromialgia primaria, se califica de acuerdo con la patología de base o concomitante en los capítulos y se combinan los valores de deficiencia de acuerdo con la fórmula de valores combinados.

14.6.2.6. Artrosis de cadera, rodillas y tobillos

Si esta es monoarticular, se evaluará según los rangos de movimiento articulares y capacidad funcional; es decir, con las tablas de este capítulo. Cuando compromete dos o más articulaciones, se califica con la Tabla 14.15. En los casos en que se requirió reemplazo articular, se evalúa por la movilidad articular residual.


Capítulo XV

Deficiencia por Alteraciones de la Columna Vertebral y la Pelvis

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

15.1. Objetivo. Proveer los criterios para la evaluación de la deficiencia anatómica y funcional permanente de la columna vertebral y la pelvis, para lo cual se reconocen cuatro zonas:

1. Columna cervical (incluye: C1 a C7),
2. Columna torácica (incluye: T1 a T12),
3. Columna lumbar (incluye: T12-L1, L5- S1),
4. Pelvis (incluye los huesos ilion o iliaco, sacro y pubis).



15.2. Alcance. Este capítulo incluye los criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias permanentes de las enfermedades que afectan la columna vertebral y las estructuras óseas, tendones, ligamentos, discos intervertebrales y las raíces nerviosas.

15.3. Definiciones y Principios de Evaluación. En este capítulo, entre otros, se contemplan los siguientes criterios:

1. Presencia de daños conexos a la columna vertebral y pelvis: Se refiere a las enfermedades de la columna vertebral y la pelvis que sean consecuencia de una enfermedad sistémica. Estas deficiencias se deben calificar en los respectivos capítulos y combinar (Sistema Nervioso Periférico, Sistema Nervioso Central, entre otros).
2. La calificación de ese capítulo debe incluir la revisión exhaustiva de la historia clínica, la descripción de los síntomas actuales, entre otros el dolor, el examen físico, la imagenología diagnóstica y los exámenes de laboratorio.
3. La calificación de la deficiencia de los segmentos de la columna y pelvis, se realiza con fundamento en el sistema de calificación de Deficiencia con Base en el Diagnóstico - DBD.
4. En caso de que una persona presente dos o más diagnósticos por región (cervical, dorsal o lumbar), se calificará únicamente la de mayor porcentaje de deficiencia.
5. Para cada uno de los segmentos, se asigna un valor diferente: para columna cervical, va desde 0% a 30%; para columna torácica, hasta el 22%; para columna lumbar, hasta el 33%, y para la pelvis, hasta el 16% de deficiencia global.
6. El método para calificar este capítulo es con base en el diagnóstico (**factor principal**) para la elección de la clase y para el ajuste del grado de esta clase (**factores moduladores**: historial clínico, hallazgos físicos y estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas) según el Título I “Metodología para la calificación de las deficiencias
7. La evolución de un paciente para ser valorado, debe calificarse luego de un año calendario de tratamiento, o apenas alcance la Mejoría Médica Máxima (MMM) o termine el proceso de rehabilitación integral, o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

15.3.1. Factores a considerar para la evaluación y ponderación de la deficiencia derivada de las enfermedades de la columna vertebral y la pelvis.

Se establecen los siguientes criterios para la evaluación de la deficiencia:

Criterio 1. Deficiencia con Base en el Diagnóstico – DBD, (Factor principal): La deficiencia se calcula con base en este método y está determinada por el diagnóstico. Se reconocen cinco categorías mayores de diagnóstico partiendo del dolor o manifestación clínica. En caso tal de encontrarse hallazgos o cambios radiológicos asintomáticos NO SON CALIFICABLES.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

- 1. Dolor de columna recurrente crónico o crónico no específico.
- 2. Lesiones de disco intervertebral y patología de segmentos móviles en uno o múltiples niveles.(ciática)
- 3. Estenosis cervical y lumbar.
- 4. Fracturas y luxaciones vertebrales.
- 5. Fracturas y luxaciones pélvicasEspondilolistesis
- 6. Espondilólisis

Cuando la patología no se encuentre contemplada en los diagnósticos a evaluar por este capítulo, se debe aplicar la tabla que corresponda a la deficiencia que esté más correlacionada con el diagnóstico; para ello se tomarán en cuenta las generalidades de evaluación explicadas en los numerales 5° y 6° del Título Preliminar. Esta deberá estar documentada.

Este diagnóstico debe ser corroborado con hallazgos imagenológicos - RMN y TAC, entre otros, correspondientes al tipo de lesión.

En caso de presentar compromiso de dos o más regiones de la columna vertebral, se deberá combinar la deficiencia global de cada región.

Criterio 2. Historia funcional (Factor modulador): Se determina con base en los criterios establecidos en cada tabla regional (cervical, torácica, lumbar o pélvica).

Criterio 3. Examen físico (alteración anatómica) (Factor modulador): Se refiere a los signos encontrados en el examen físico que comprende rangos de movilidad articular y fuerza muscular, y sirve como indicador de la gravedad de clase establecida por el factor principal. (Signos, atrofia, acortamiento, radiculopatía, entre otros)

Criterio 4. Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (Factor modulador): Se refieren a los estudios diagnósticos y exámenes de laboratorio:

RX, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, medicina nuclear, ultrasonido, electro diagnóstico, electromiografía y velocidades de conducción; estos reportes deben estar correlacionados con los síntomas, signos y hallazgos en las personas.

15.3.2. Calificación de la deficiencia con base en el diagnóstico.

En cada tabla, los diagnósticos se dividen en categorías que incluyen, entre otras condiciones, las siguientes: Lesiones de tejidos blandos, esguince o luxación, herniaciones de disco, estenosis de columna, fracturas y dislocaciones.

Si existe más de un diagnóstico calificable en la misma región, se debe seleccionar aquel que provea la clase que muestre de manera más apropiada el estado clínico; usualmente es el más específico, es decir, el que provee el porcentaje de deficiencia más alto.

Cuando el diagnóstico no ha sido contemplado en las tablas, se debe identificar una condición similar a los diagnósticos consignados en las mismas dentro de la región afectada de este capítulo, para utilizarla en el cálculo; las razones para esta decisión deben ser consignadas en el formato de calificación.

La calificación se realiza con base en el estado de la persona en el momento de la evaluación sin sujeción a que puedan existir manejos médicos o quirúrgicos futuros o exista necesidad de hacerlos.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Las anomalías congénitas, como la espina bífida oculta, la segmentación anormal y las raíces nerviosas unidas que no generan secuelas, no son calificables como deficiencia.

15.4. Procedimientos para calificar deficiencia en columna cervical, torácica y lumbar y pelvis.

1. Determine el diagnóstico y la región de la columna vertebral o de la pelvis a la cual corresponde la deficiencia. Use la tabla apropiada según el diagnóstico regional.
 - a. Tabla 15.1 Calificación de deficiencias de la columna cervical.
 - b. Tabla 15.2 Calificación de deficiencias de la columna torácica.
 - c. Tabla 15.3 Calificación de deficiencias de la columna lumbar.
 - d. Tabla 15.4. Calificación de deficiencias de la pelvis.
2. Identifique el factor principal y los factores moduladores.
3. Siga los pasos descritos en el numeral 6° del Título Preliminar y el numeral correspondiente a “Metodología para la calificación de las deficiencias”. (Incluye aplicación de la fórmula de cálculo para el ajuste total y la modificación del valor por defecto (C)).
4. Combine la deficiencia global de las diferentes regiones de columna, cuando se ha utilizado más de una de las tablas de calificación de las diferentes áreas.

Tabla 15.1 Calificación de deficiencias de la columna cervical.

CLASE FUNCIONAL	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA	0 ^(a)	1% al 10%	11% al 20%	21% al 30%	31% al 40%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		1 1 2 3 3 A B C D E			
Lesión de tejidos blandos y condiciones no específicas:					
	Cervicalgia crónica no específica o recurrente (o enfermedad degenerativa discal) o dolor por enfermedad facetaria, tendinitis o dolor muscular	Historia de tendinitis o dolor muscular en resolución o se queja de cervicalgia sin signos objetivos al examen físico.	Historia documentada de tendinitis o dolor muscular con quejas constantes, con signos radiculares, hallazgos similares en múltiples ocasiones.		
Lesión de segmentos móviles, luxaciones o listesis de la columna:					
Diagnóstico por Región (factor principal)	0 (a)	5 6 7 8 10 Sin signos ni síntomas axiales o radiculares.	11 13 15 18 20 Sin indicación de cirugía y Con radiculopatía resuelta sintomatología radicular	21 24 26 28 30 Sin indicación de cirugía y Con signos de radiculopatía de	31 33 35 37 40 Post quirúrgico y Con signos de radiculopatía (unilateral y de un solo nivel) Post quirúrgico y Con signos de radiculopatía bilateral o de múltiples niveles
	Hernia discal, inestabilidad, pseudoartrosis, artrodesis, artrodesis fallida, estabilización dinámica o artroplastia, estenosis espinal o combinación de ellas a múltiples niveles, a un solo nivel.				
Fracturas:					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto "Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional"

	0 (a)	5 6 7 8 10	11 13 15 18 20	21 24 26 28 30	31 33 35 37 40
Fracturas de uno o más cuerpos vertebrales, fractura de elementos posterior (pedículo, lamina, proceso articular, proceso transverso)	Fracturas de uno o múltiples niveles sin compresión o mínima compresión de cualquier cuerpo vertebral: con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento (menor de 5 mm de desplazamiento)	Fracturas de un nivel menor al 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retropulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento	Fracturas de un nivel con compresión igual o mayor del 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retropulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.	Fracturas de múltiples niveles menor del 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retropulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.	Fracturas de múltiples niveles con compresión mayor o igual al 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retropulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.
Fractura estallido por		Puede tener radiculopatía resuelta o se queja de sintomatología radicular verificables. no	Puede tener radiculopatía verificable al momento del examen clínico.	Puede tener radiculopatía en un solo nivel bilateral al momento del examen clínico.	Puede tener signos de radiculopatía en múltiples niveles al momento del examen clínico.
	0	5 6 7 8 10	11 13 15 18 20	21 24 26 28 30	31 33 35 37 40
Luxaciones y luxofracturas o listesis	Luxación o fractura con luxación con o sin compresión mínima de cualquier cuerpo vertebral; con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento (menor de 5 mm de desplazamiento)	Listesis a un sólo nivel con o sin fractura que no requiere cirugía.	Listesis a un sólo nivel con o sin fractura que requiere cirugía o ya se realizo.	Listesis en múltiples niveles que no requiere cirugía.	Listesis en múltiples niveles que requiere cirugía o ya se realizo, incluida la fusión.
Hallazgos Físicos (Factor Modulador)	Déficit sensorial	Sin pérdida de la sensibilidad, parestesias o dolor	Disminución de la sensibilidad leve (con o sin pérdida mínima de la sensibilidad, parestesias o dolor) en la distribución clínica apropiada que se olvida durante la actividad física.	Disminución de la sensibilidad leve (con alguna parestesia o dolores menores) en la distribución clínica apropiada que interfiere con algunas actividades.	Disminución mayor de la sensibilidad de protección (con algunas parestesias o dolor moderado en la distribución clínica apropiada) que podría impedir algunas actividades.
	Restricción arcos de movimiento articular - compromiso funcional (ver Tabla 4 del numeral 6 del título preliminar)	Movimientos activos normales sin restricción	Movimientos activos normales con restricción leve.	Movimientos activos normales con restricción moderada.	Movimientos activos normales con restricción severa.
Pruebas objetivas.(Factor modulador)	Electrodiagnóstico EMG	Normal	Radiculopatía resuelta.	Radiculopatía en una raíz nerviosa.	Signos de radiculopatía bilateral de un sólo nivel.
Notas: (a) La clase "0" corresponde a los hallazgos lógicos que no apoyan los síntomas, o diagnóstico estructural en límites normales, ó cambios normales para la edad ó cambios degenerativos clínicamente insignificantes.					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 15.2 Calificación de deficiencias de la columna torácica.

CLASE FUNCIONAL		Clase 0		Clase 1				Clase 2				Clase 3				Clase 4						
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0 ^(a)		1% al 10%				11% al 20%				21% al 30%				31% al 40%						
GRADO DE SEVERIDAD (%)		5	6	7	8	10	11	13	15	18	20	21	24	26	28	30	31	33	35	37	40	
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
Lesión de tejidos blandos y condiciones no específicas:																						
Diagnóstico por Región (factor principal)	Dolor de columna torácica crónico no específico o recurrente (esguince tendinitis o dolor muscular o lesión por sobreuso).	Historia de tendinitis o dolor muscular en resolución o se queja de dolor torácico sin signos objetivos al examen físico.	Historia documentada de tendinitis o dolor muscular con quejas constantes, con signos radiculares, hallazgos similares en múltiples ocasiones.				NA				NA				NA							
	Lesión de segmentos móviles:																					
		0 ^(a)	5	6	7	8	10	11	13	15	18	20	21	24	26	28	30	31	33	35	37	40
	Hernia discal, inestabilidad, pseudoartrosis, artrodesis, artrodesis fallida, estabilización dinámica o artroplastia, estenosis espinal o combinación de ellas a múltiples niveles. a un sólo nivel.	Sin signos ni síntomas axiales o radiculares.	Sin indicación de cirugía y con radiculopatía resuelta o sintomatología radicular				Sin indicación de cirugía y con signos de radiculopatía (unilateral y de un sólo nivel)				Post quirúrgico y con signos de radiculopatía bilateral o de múltiples niveles				Post quirúrgico y con signos de radiculopatía bilateral o de múltiples niveles							
	Fracturas:																					
		0 ^(a)	5	6	7	8	10	11	13	15	18	20	21	24	26	28	30	31	33	35	37	40
	Fracturas de uno o más cuerpos vertebrales, fractura de elementos posteriores (pedículo, lámina, proceso articular, proceso transverso), fractura por estallido. Vertebroplastia o cifoplastia con deformidad residual con signos de lesión en la médula espinal o mielopatía:	Fracturas de uno o múltiples niveles sin compresión o mínima compresión de cualquier cuerpo vertebral: con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento	Fracturas de un nivel con compresión menor al 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retroplulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento				Fracturas de un nivel con compresión igual o mayor del 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retroplulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.				Fracturas de múltiples niveles con compresión menor del 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retroplulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.				Fracturas de múltiples niveles con compresión mayor o igual al 25% de cualquier cuerpo vertebral; con o sin retroplulsión ósea, con o sin pedículo y/o fractura posterior del elemento.							
		0	5	6	7	8	10	11	13	15	18	20	21	24	26	28	30	31	33	35	37	40
	Luxaciones o listesis a un sólo nivel o múltiples y fracturas		Sin indicación de cirugía Radiculopatía resuelta o sintomatología radicular				Sin indicación de cirugía Signos de radiculopatía				Post quirúrgico Signos de radiculopatía				Post quirúrgico Signos de radiculopatía bilateral o de múltiples niveles							
		Complicaciones postoperatorias no neurológicas. *1																	Infección profunda de la herida de la columna que requiere antibióticos crónicos; u osteomielitis crónica.			
	Déficit sensorial		Disminución de la sensibilidad leve (con o sin)				Disminución de la sensibilidad leve (con				Disminución mayor de la				Dolor superficial y sensibilidad táctil							

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Hallazgos Físico (Factor Modulador)		Sin pérdida de la sensibilidad, parestesias o dolor	pérdida mínima de la sensibilidad, parestesias o dolor) en la distribución clínica apropiada que se olvida durante la actividad física.	algunas parestesias o dolores menores) en la distribución clínica apropiada que interfiere con algunas actividades.	sensibilidad de protección (con algunas parestesias o dolor moderado en la distribución clínica apropiada) que podría impedir algunas actividades.	ausentes o ausencia de sensibilidad de protección (parestesias o dolor severo) que impide todas las actividades.
	Restricción arcos de movimiento articular – compromiso funcional (ver Tabla 4 del numeral 6 del Título Preliminar)	Movimientos activos normales sin restricción	Movimientos activos normales con restricción leve.	Movimientos activos normales con restricción moderada.	Movimientos activos normales con restricción severa.	Movimientos activos normales con restricción muy severa.
Pruebas objetivas.(Factor modulador) puede ser EMG de MMSS en cervical y toracica y EMG de MMII en lumbar	Electrodiagnóstico EMG	Normal	Radiculopatía resuelta.	Radiculopatía en una raíz nerviosa.	Signos de radiculopatía bilateral de un sólo nivel.	Radiculopatía de múltiples raíces nerviosas.

Notas: (a) La clase "0" corresponde a los hallazgos imagenológicos que no apoyan los síntomas, o diagnóstico estructural en límites normales, o cambios normales para la edad ó cambios degenerativos clínicamente insignificantes.

Califique la radiculopatía en el capítulo SNP, cuando esté presente y combinar.

Nota: *1 las complicaciones neurológicas y/o las radiculopatías se califican en el capítulo SNC y SNP según el caso.

Tabla 15.3. Calificación de deficiencias de la columna lumbar.

CLASE FUNCIONAL	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
VALORACIÓN DEFICIENCIA	0 ^(a)	1% al 10%	11% al 20%	21% al 30%	31% al 40%
GRADO DE SEVERIDAD (%)		5 6 7 8 10 A B C D E			
Diagnóstico por Región (factor principal)	Lesión de tejidos blandos y condiciones no específicas:				
	Lumbalgia crónica no específica o recurrente (luxación severa crónica y por sobreuso) o enfermedad degenerativa discal o por enfermedad facetaria o disfunción articular.	Historia de lesión por luxación o por sobreuso (en resolución o se queja de lumbalgia ocasional, sin signos objetivos al examen físico.	Historia de lesión por luxación o sobreuso (tendinitis o dolor muscular), con lumbalgia constante y dolor radicular no verificable.		
Lesión de segmentos móviles, luxaciones o listesis de la columna:					
	0 (a)	5 6 7 8 10 11 13 15 18 20 21 24 26 28 30	31 33 35 37 40		

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

	Hemiarriete de disco, Pseudoartrosis, artrodesis, artrodesis fallida, estabilización dinámica o artroplastia. Estenosis lumbar. Listesis, espondilolistesis y espondilolistesis degenerativa con o sin estenosis de columna, combinaciones de las anteriores a múltiples niveles	Sin signos ni síntomas axiales o radiculares.	Sin indicación de cirugía o con claudicación neurogénica o radiculopatía resueltas	Sin indicación de cirugía y con claudicación neurogénica ocasional o con signos de radiculopatía o con signos de síndrome de cauda equina.	Post quirúrgico y con claudicación neurogénica a menos de 10 minutos o con signos de radiculopatía o con signos de síndrome de cauda equina.	Post quirúrgico y con claudicación neurogénica severa e inhabilidad para deambular sin aparatos de ayuda. o Con signos de radiculopatía bilateral o de múltiples niveles o con signos de síndrome de cauda equina.
Fractura y dislocaciones o listesis:						
	0 (a)	5 6 7 8 10	11 13 15 18 20	21 24 26 28 30	31 33 35 37 40	
	Fracturas de uno o más cuerpos vertebrales, incluyendo fracturas con compresión y por estallido. Fractura de elementos posterior (pedículo, lamina, proceso articular, proceso transverso). Incluye con o sin intervención quirúrgica (vertebroplastia o cioplastia entre otras)*1	Sin síntomas o signos residuales	Fracturas de uno o múltiples niveles con compresión menor al 25% de cualquier cuerpo vertebral. y Puede tener radiculopatía resueltas	Fracturas de uno o múltiples niveles con compresión de 25% - 50% de cualquier cuerpo vertebral. y claudicación neurogénica intermitente.	Fracturas de uno o múltiples niveles con compresión mayor del 50% de un cuerpo vertebral. y claudicación neurogénica intermitente a menos de 10 minutos	Fracturas de uno o múltiples niveles con compresión mayor del 50% de un cuerpo vertebral. y con claudicación neurogénica severa e inhabilidad para deambular.
	0	5 6 7 8 10	11 13 15 18 20	21 24 26 28 30	31 33 35 37 40	
	Complicaciones postoperatorias no neurológicas.					Infección profunda de la herida de la columna que requiere antibióticos crónicos; u osteomielitis crónica.
Hallazgos Físico (Factor Modulador)	Déficit sensorial	Sin pérdida de la sensibilidad, parestesias o dolor	Disminución de la sensibilidad leve (con o sin pérdida mínima de la sensibilidad, parestesias o dolor) en la distribución clínica apropiada que se olvida durante la actividad física.	Disminución de la sensibilidad leve (con alguna parestesia o dolores menores) en la distribución clínica apropiada que interfiere con algunas actividades.	Disminución mayor de la sensibilidad de protección (con algunas parestesias o dolor moderado en la distribución clínica apropiada) que podría impedir algunas actividades.	Dolor superficial y sensibilidad táctil ausentes o ausencia de sensibilidad de protección (parestesias o dolor severo) que impide todas las actividades.
	Restricción arcos de movimiento articular – compromiso funcional/ ver Tabla 4 del numeral 6 del Título Preliminar	Movimientos activos normales sin restricción	Movimientos activos normales con restricción leve	Movimientos activos normales con restricción moderada	Movimientos activos normales con restricción severa	Movimientos activos normales con restricción muy severa
Pruebas objetivas.(Factor modulador)	Electrodiagnóstico EMG	Normal	Radiculopatía resueltas.	Radiculopatía en una raíz nerviosa.	Signos de radiculopatía bilateral de un sólo nivel.	Radiculopatía de múltiples raíces nerviosas.

Notas: (a) La clase "0" corresponde a los hallazgos imagenológicos que no apoyan los síntomas, o diagnóstico estructural en límites normales, o cambios normales para la edad ó cambios degenerativos clínicamente insignificantes.

*1 Si presenta síndrome de cauda equina se califica en SNC y la radiculopatía se califica en el SNP. Luego se combinan con las deficiencias de este capítulo.

*2 si se documenta la radiculopatía, se califica por la Tabla 15.3 y no se combine con el SNP

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 15.4. Calificación de deficiencias de la pelvis

CLASE FUNCIONAL		Clase 0					Clase 1					Clase 2					Clase 3					Clase 4				
VALORACIÓN DEFICIENCIA		0 ^(a)					5% al 10%					11% al 25%					30% al 40%					41% al 50%				
GRADO DE SEVERIDAD (%)							5	6	7	9	10	11	14	18	22	25	30	33	35	38	40	41	43	45	48	50
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Diagnóstico por Región (factor principal)	Fractura y luxaciones:																									
	Fracturas de las ramas pélvicas, de ileón, isquion y/o sacro. Con o sin cirugía.	Fractura consolidada, con o sin cirugía, sin síntomas residuales relacionados con la fractura.	Fracturas mínimamente desplazada < de 1cm son o sin cirugía. Consolidada y estable y separación de la síntesis pélvica (>1cm y menor de 3cm)	Fracturas desplazadas (>1cm y < 2 cm) del ileón, isquion, sacro o coxis. Consolidada con o sin cirugía. o separación de la síntesis pélvica > o igual a 3 cm Sin inestabilidad.	Fracturas desplazadas > o igual a 2 cm del ileón, isquion, sacro o coxis. Consolidada con o sin cirugía. y Separación de la síntesis pélvica > o igual a 3 cm Con inestabilidad.	Luxación de la articulación sacroiliaca o fractura y luxación con ruptura de los ligamentos sacroiliacos; fractura sacra transversa con disociación pélvica espinal- o Complicaciones severas después de cirugía, incluida pseudoartrosis, osteomielitis o inestabilidad.																				
	Fractura de acetábulo.	Fractura consolidada, con o sin cirugía, sin síntomas residuales relacionados con la fractura.	Si tiene restricciones en los arcos de movilidad de cadera se califica con base en el capítulo de miembros inferiores.																							
Hallazgos Físico (Factor Modulador 1)	Marcha. Patrón: Fase de Apoyo: apoyo inicial o talón, apoyo medio y despegue de dedos.	No hay desordenes las fases del patrón de la marcha.	Camina con alteración leve de la fase de apoyo.	Camina alguna distancia, con alteración moderada en la fase de apoyo y de balanceo.	Camina, pero con severa alteración de la fase de apoyo y la fase de balanceo llega solo a la propulsión.	Camina, pero con severa alteración de la fase de apoyo y la fase de balanceo llega solo a la propulsión.	No puede caminar. Alteración completa de las fases del patrón de marcha.																			
Hallazgos Físico (Factor Modulador 2)	Diferencia en la longitud de los miembros inferiores postraumático.	Sin acortamiento	Menor o igual a 1 cm	> 1cm a < 3 cm	> o igual a 3 cm a 5 cm	> de 5 cm																				

(a) **La fractura del acetábulo:** Fractura consolidada no desplazada sin deformidad estructural residual y sin síntomas residuales corresponden a la clase 0. Si tiene restricciones de los arcos de movimiento se califica en el capítulo de miembros inferiores para luego combinarlos.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

TÍTULO SEGUNDO

VALORACIÓN DEL ROL LABORAL, ROL OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES

Capítulo I Generalidades

El Título Segundo complementa al primero denominado “Valoración de las Deficiencias” y asume el impacto generado sobre el rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria – AVD-, de acuerdo con la etapa del ciclo vital o curso de vida en que se encuentre la persona. Se incluye: la integralidad, intencionalidad, elección, determinación, autonomía, planificación y la resolución, para el inicio, desarrollo o finalización de la actividad laboral u ocupacional y de otras de la vida diaria propias del ser humano.

El rol laboral, rol ocupacional y limitación en otras áreas ocupacionales (Actividades de la Vida Diaria- AVD) se deberán evaluar con instrumentos que permitan medir el funcionamiento, habilidad ocupacional y desempeño laboral u ocupacional que están disponibles en la literatura científica y son aplicadas únicamente por los profesionales competentes, mientras el Gobierno Nacional, estandariza y define instrumentos a utilizarse. No podrá calificarse de manera subjetiva, sin pruebas de cuantificación, realizadas durante el proceso de atención y rehabilitación integral, las cuales están incluidas en el Sistema de Seguridad Social.

Para lo anterior, es importante reconocer las otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria como: adquisición de conocimiento, cuidado personal, movilidad, comunicación, vida doméstica, desde el marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud –CIF- y el Marco para la Práctica de Terapia Ocupacional; es decir, se analizan y valoran las consecuencias sobre los roles y otras áreas ocupacionales, dada la disminución o pérdida funcional-anatómica de un órgano o sistema.

Con base en lo señalado, se tienen en cuenta dos poblaciones de acuerdo con la etapa del ciclo vital o curso de vida y rol desempeñado para efectos de calificar la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. Estas poblaciones son:

- a. Personas en edad económicamente activa (conformada por las personas en edad de trabajar), incluye menores trabajadores, jubilados y pensionados que trabajan, así como aquellos adultos mayores que laboran o cumplen con la definición de trabajo habitual.
- b. Bebes, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores.

Las personas en edad económicamente activa, son las que cuentan con un rol laboral y el grupo de los bebés, niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores (que nunca han trabajado) tienen un rol ocupacional de juego, estudio (vida escolar) y uso del tiempo libre o de esparcimiento, respectivamente.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

1. Criterios para calificar a las personas en edad económicamente activa.

- a. Identificada la persona a calificar en este grupo, se procede a valorar el rol laboral, la autosuficiencia económica, la edad y las otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria AVD en las tablas respectivas.
- b. Para calificar el rol laboral, se selecciona uno de los seis criterios descritos asignando el valor correspondiente de acuerdo con la Tabla 1: Clasificación de las restricciones en el rol laboral, que tiene un valor máximo de 25%.
- c. Para calificar la autosuficiencia económica, se selecciona uno de los cinco criterios descritos, asignando el valor correspondiente de acuerdo con la Tabla 2: Clasificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica, que tiene un valor máximo de 2.5%.
- d. Para calificar la edad, se selecciona ésta en una de las seis categorías o intervalos descritos, asignando el valor correspondiente de acuerdo con la Tabla 3 - Clasificación de las restricciones en función de edad cronológica, que tiene un valor máximo de 2.5%.
- e. Para calificar las otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria AVD, se usan las Tablas 6, 7, 8, 9 y 10, asignando los valores según la clase dada en la Tabla 4 - Escala de calificación de otras áreas ocupacionales, que son sumados aritméticamente, llegando a un valor máximo total del 20%.
- f. Los valores obtenidos de esta segunda parte del MUCI (rol laboral, de la autosuficiencia económica, de la edad y de las otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria –AVD–) se suman aritméticamente, llegando a un valor máximo del 50%; este valor se suma al valor obtenido en el primer título del Manual, por deficiencia ponderada, dando como resultado la **pérdida de capacidad laboral**.

2. Criterios para calificar a los bebés, niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores.

En estos grupos, se califica la **pérdida de la capacidad ocupacional** y para efectos prácticos, se subdividen en tres grupos acorde a los estándares internacionales y políticas existentes:

- a. Niños y niñas de 0 a 3 años,
 - b. Niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes y
 - c. Adultos y adultos mayores.
- a. **Niños y niñas de 0 a 3 años:** Para calificar el rol ocupacional de este subgrupo, se utiliza la Tabla 11: Escala de calificación y la Tabla 12: Valoración para niños y niñas de 0 a 3 años (Actividad motriz y Adaptativa), asignando la clase y el valor correspondiente en esta tabla, cuyo valor máximo es de 50%. Para determinar la pérdida de capacidad ocupacional en este grupo, se deberá aplicar la metodología descrita al final de la Tabla 12: Valoración para niños y niñas de 0 a 3 años. El valor obtenido sobre este 50% se suma aritméticamente sin ponderar al valor obtenido en la primera parte del MANUAL por deficiencia ponderada.
 - b. **Niños y niñas mayores de 3 años y adolescentes:** Para calificar la restricción en los roles ocupacionales de juego-estudio y las limitaciones en otras áreas ocupacionales para niños y niñas mayores de tres (3) años así como para adolescentes, se aplica la Tabla 13: Valoración de los roles ocupacionales de juego-estudio y de las limitaciones en otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria –AVD– para niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes cuyo valor máximo es de 30%.
 - c. **Para calificar las limitaciones en otras áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria –AVD–**, se siguen las definiciones, los criterios de calificación, la escala de calificación y la clasificación de las otras áreas ocupacionales del capítulo III – Calificación de Otras Áreas Ocupacionales - cuyo valor máximo es de 20%. El valor obtenido de la aplicación de las Tablas 6,7,8,9 y 10 se suma con el valor obtenido de la Tabla 13 y da como resultado el valor final del

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Título II – Rol ocupacional.

- d. **Para obtener el valor final de la pérdida de la capacidad ocupacional** se suman los valores del Título Primero – deficiencia final ponderada con el valor obtenido del Título Segundo – Rol ocupacional y áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria –AVD- (sin ponderar)
- e. **Adultos y Adultos mayores:** Para calificar la restricción del rol ocupacional de este grupo, relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento, se utiliza la Tabla 14 - Valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y esparcimiento en adultos y adultos mayores, cuyo valor máximo es de 30%. Para calificar las limitaciones en otras áreas ocupacionales, se siguen las definiciones, los criterios de calificación, la escala de calificación, la clasificación de las otras áreas ocupacionales del capítulo III con sus respectivas tablas – Calificación de Otras Áreas Ocupacionales - cuyo valor máximo es de 20% (veinte por ciento). El valor obtenido de estas áreas ocupacionales con el valor obtenido del uso del tiempo libre y de esparcimiento se suman aritméticamente, dando el valor final del Título II – Rol ocupacional, sin que sobrepase el 50% (cincuenta por ciento). Para obtener el valor final de la pérdida de la capacidad ocupacional se suma aritméticamente el valor obtenido en el Título Primero – deficiencia final ponderada con el valor obtenido del Título Segundo – Rol ocupacional.

Capítulo II
Calificación del Rol Laboral

1. El rol laboral, rol ocupacional y limitación en otras áreas ocupacionales se deberán evaluar con instrumentos que permitan medir el funcionamiento, desempeño y capacidad de ejecución que están disponibles en la literatura científica respectiva según disciplinas y competencias, muchas de ellas aplicables en Colombia o mientras el Gobierno Nacional, estandariza y define instrumentos a utilizarse. No podrá calificarse de manera subjetiva, sin pruebas de cuantificación, realizadas durante el proceso de atención y rehabilitación integral, la cual está incluida en el sistema de seguridad social.

2. Definiciones.

- 2.1. **Rol laboral:** Se refiere a cómo llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para ejecutar las actividades de un trabajo o empleo. Lo anterior de acuerdo con las actitudes y aptitudes de orden psico-cognitivo y físico de las personas, desarrolladas y acumuladas por los aprendizajes, los conocimientos, las destrezas, y las habilidades operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas que se ponen en juego como capacidad productiva. Esta capacidad productiva se define y se mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral.
- 2.2. **Trabajo habitual:** se define como aquel oficio o labor que desempeña la persona con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a uno o más salarios mínimos legales mensuales vigentes.(1 ó >1 SMLMV) y que está obligado a cotizar al SGSSI en el Régimen Contributivo.
- 2.3. **Autosuficiencia económica:** Hace referencia fundamentalmente a la autosuficiencia y nivel económico que puede tener una persona en relación directa con la repercusión o impacto económico negativo generado por una deficiencia. Incluye la capacidad de la persona para cumplir con el mínimo vital de la persona y su familia.
- 2.4. **Edad cronológica:** Es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento.

3. Características.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Para calificar el rol laboral se identifican y valoran las restricciones generadas por una deficiencia (s) sobre la capacidad productiva de una persona para ejecutar las actividades de un trabajo o empleo. Para hacer objetiva su valoración, se tienen en cuenta los siguientes indicadores para los casos que aplique.

- a. **Perfil ocupacional:** instrumento aportado por terapeutas ocupacionales y que se relaciona con las habilidades y destrezas a nivel cognitivo, perceptual, motor, psicosocial y de relación con los procesos, objetos, máquinas, herramientas y materiales propios del puesto de trabajo donde la persona sufre restricciones.
- b. **Perfil y evaluación del puesto:** Considerado como el inventario de las demandas por componentes de ejecución: motor, cognoscitivo, psicosocial, perceptual y de relación con datos, personas y objetos, que un puesto de trabajo, mediante las tareas, operaciones y pasos le exige a una persona un desempeño competitivo. Es importante anotar que esto corresponde a la aplicación de un análisis ocupacional y en ningún momento tiene que ver con evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo.
- c. **Rehabilitación profesional:** Se define como el conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de formación, de tiempo limitado, articuladas, definidas y conducidas por un equipo interdisciplinario, en el que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso, a la familia, a la comunidad laboral y a la comunidad social, en el cumplimiento de los objetivos trazados, que apunten a lograr cambios en el trabajador y en su entorno, y que conduzcan a una reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad. Este es aportado por los equipos inter o transdisciplinarios de rehabilitación integral del SGSSS y SGSSRL acorde a las condiciones de salud.

4. **Clasificación de las restricciones en el rol laboral.**

Para una mayor facilidad en la comprensión y valoración que respecta al rol laboral, puede presentar una persona como consecuencia de una deficiencia (s), estas restricciones se han dividido por categorías; cada categoría a su vez tiene un puntaje máximo calificable. Para facilitar la evaluación se tendrá como guía el “Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales” o el Manual que lo modifique, adicione o sustituya, y lo descrito en instrumentos construidos para valorar repercusiones en el rol laboral. En la Tabla 1 se condensa esta clasificación con los puntajes respectivos. Así mismo, se incluyen las categorías que incluyen los puntajes en función de la autosuficiencia económica y de edad cronológica que aplican para efectos de calificación. Las Tablas 2 y 3 explican estas categorías.

Tabla 1: Clasificación de las restricciones en el rol laboral.

Categoría	Porcentaje máximo asignado
<p>1- Activo: Sin limitaciones para la actividad laboral</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima (MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, sin limitación ni restricción alguna, en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Puede realizar todas las tareas principales o básicas y las secundarias o accesorias sin ningún tipo de limitación en la labor habitual.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: adecuados, sin limitación, ni restricción.</p>	0 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
<p>Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 100% de acuerdo a la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o accidente.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: Reintegro sin modificaciones en el puesto de trabajo.</p>	
<p>2- Rol laboral recortado: limitaciones leves para la actividad laboral.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima (MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones leves en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Realiza las tareas básicas o principales y no puede realizar o participar en algunas de las tareas secundarias de la labor habitual.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones leves para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 80% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o accidente.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: Reintegro con modificaciones en el puesto de trabajo.</p>	5 %
<p>3- Rol laboral o puesto de trabajo adaptado.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima (MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones moderadas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Necesita contar con ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos o férulas e incluso ayuda de otro para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias de la labor habitual.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: Con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 50% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o accidente.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: Reintegro con modificaciones en el puesto de trabajo o reubicación temporal.</p>	10 %
<p>4- Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones graves en y para:</p>	15 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
<p>Tareas y operaciones: Con el uso de ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos o férulas e incluso ayuda de otro, la persona solo se puede desempeñar en otro puesto de trabajo, con limitaciones para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias de este nuevo puesto.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: Con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: sin limitación en el 100% de acuerdo a la jornada asignada.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: reubicación definitiva.</p>	
<p>5- Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo con actividades recortadas:</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima (MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones completas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Con el uso o no de ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos o férulas permanentes e incluso ayuda de otro, la persona solo se puede desempeñar en algunas tareas u operaciones del nuevo puesto de trabajo, con limitaciones moderadas o completas para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias del puesto.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: Con limitación para el 50% de acuerdo a la jornada asignada.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: La persona amerita o cuenta con el concepto de reconversión de mano de obra.</p>	20 %
<p>6. Rol laboral en condiciones especiales o sin posibilidad de rol laboral- restricciones completas:</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Médica Máxima (MMM) o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, no puede realizar ninguna actividad laboral habitual y presenta limitaciones y restricciones completas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Con ó sin el uso ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos, férulas permanentes e incluso ayuda de otra persona, no se puede desempeñar en ninguna actividad laboral. Puede requerir rehabilitación vocacional en alguna institución o solo desarrolla actividades para el uso del tiempo.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones completas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: Limitación total para cualquier tipo de jornada laboral.</p> <p>Forma de reintegro^(a) laboral: No existe, la persona permanece en casa o en una institución de cuidado especial.</p>	25 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

(a)Adaptada por Rodríguez, F; Suarez, H, 2018

*Nota: Para aplicar y escoger la categoría de la Tabla 1, la clase que prima es aquella en la que predominen o tengan mayor relevancia los aspectos de restricción laboral en términos de **ejecución para las tareas y operaciones, el tiempo de ejecución y la forma de reincorporación laboral**

5. Calificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica.

Tabla 2. Clasificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica

Categoría	Porcentaje máximo asignado
Autosuficiencia: Implica obtener ingresos económicos, derivados del rol laboral, con el objetivo de garantizar una seguridad económica para las necesidades presentes. Implica la capacidad de la persona para cumplir con las obligaciones de orden personal y familiar, así como la capacidad de la persona para llevar a cabo transacciones económicas básicas y complejas; por ejemplo participar en cualquier forma de transacción económica básica, usar dinero para comprar comida o hacer trueques, intercambiar bienes o servicios y ahorrar dinero. La persona es o puede ser el único miembro aportante en el núcleo familiar.	0 %
Autosuficiencia reajustada: Se refiere a aquellas personas que presentan un rol laboral recortado y que económicamente son autosuficientes, pese a una deficiencia (s) con un deterioro leve en la situación económica, si se tiene en cuenta la posición en que estaban antes de adquirir la deficiencia (s) y su condición de discapacidad o la que podrían haber alcanzado en caso de no tenerlas, como sería el caso de los que reciben menos ingresos o los que han tenido que realizar gastos por encima de lo normal como consecuencia de su discapacidad y hasta el punto de experimentar pérdidas considerables. No requieren ayuda económica de otros para mantener la autosuficiencia económica. La persona es o puede ser el único miembro aportante en el núcleo familiar.	1,0 %
Precariamente autosuficiente: Se refiere a las personas que presentan un rol laboral adaptado y que como consecuencia de una deficiencia (s), ven sus ingresos económicos afectados de forma moderada. Pueden requerir ayuda de otras personas o de la comunidad para mantener su autosuficiencia económica. La persona es o puede ser el único miembro aportante en el núcleo familiar.	1,5 %
Económicamente débiles: Se refiere a las personas que presentan un cambio de rol laboral como consecuencia de una deficiencia (s); ven sus ingresos económicos afectados de forma severa; no logran una autosuficiencia económica y la ayuda que reciben de otras personas o de la comunidad sólo sirven para cubrir parte de las necesidades básicas. La persona es el único miembro aportante en el núcleo familiar.	2,0 %
Económicamente dependientes: Se refiere a las personas que presentan un rol laboral en condiciones especiales o sin posibilidad del mismo con restricciones completas como consecuencia de una deficiencia (s); ven sus ingresos económicos afectados de forma completa puesto que dependen	2,5 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
de la buena voluntad de otras personas; al mismo tiempo si se tiene un núcleo familiar, estos viven por debajo de la línea de pobreza (personas cuyos ingresos no permiten cubrir el costo de una canasta básica de consumo).	

6. Reglas para asignar la calificación por autosuficiencia económica.

- Asignar a la persona una única categoría teniendo en cuenta la autosuficiencia económica actual, derivada de la deficiencia (s) presente (s), en comparación con la autosuficiencia económica previa a la contingencia médica.
- No deben tenerse en cuenta otras condiciones económicas propias de la persona o de la familia, así como otros beneficios suplementarios: mesadas pensionales, indemnizaciones, subsidios, auxilios entre otros, que se puedan obtener a futuro.
- La categoría asignada debe estar directamente relacionada y condicionada a la realidad del rol laboral al momento de calificar, sin sujeción al comportamiento del mercado laboral del país.

7. Calificación de las restricciones en función de la edad cronológica.

Para efectos de calificar, se tiene en cuenta la Tabla 3, así como la regla de calificación expuesta en el numeral 2.4. de este capítulo.

Tabla 3. Clasificación de las restricciones en función de edad cronológica por edad cumplida al momento de calificar.

Categoría	Porcentaje máximo asignado
Menor de 18 años	2,5 %
Mayor o igual a 18 años, menor de 30 años	0,5 %
Mayor o igual a 30 años, menor de 40 años	1,0 %
Mayor o igual a 40 años, menor de 50 años	1,5 %
Mayor o igual a 50 años, menor de 60 años	2,0 %
Mayor o igual a 60 años	2,5 %

Regla para asignar la calificación por edad cronológica.

Asignar a la persona una única categoría, teniendo en cuenta la edad cronológica a la fecha de la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

Capítulo III
Calificación de Otras Áreas Ocupacionales

3. Definiciones.

Áreas ocupacionales: para efectos del presente Manual, se definen como diversas actividades de la vida, en que las personas participan, incluyendo las siguientes categorías: Actividades de la vida diaria - AVD, actividades de la vida diaria instrumentales - AVDI, educación, estudio, juego, ocio y

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

participación social. Estas se expresan como adquisición de conocimiento, cuidado personal, movilidad, tareas y demandas generales, comunicación y vida doméstica.

Dispositivos médicos, también llamados productos y tecnologías de apoyo Es cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por una persona con deficiencia, fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar o minimizar la alteración en el funcionamiento de un órgano o sistema.

Ayuda de otra persona: es la cantidad de ayuda o apoyo que puede proporcionar otra persona tanto en lo físico como en lo emocional, que involucra aspectos relacionados propios del auto cuidado como son la alimentación, limpieza o aseo a nivel personal, en la vivienda, en el lugar de trabajo, estudio o formación y otros aspectos relacionados con las interacciones con otras personas. Esta ayuda puede configurar una condición de dependencia.

Dependencia intelectual: Este concepto se relaciona con aquellas personas que presentan limitaciones en la capacidad para la autonomía económica, resolución de problemas y toma de decisiones como consecuencia de una deficiencia intelectual, cognitiva o mental y requieren asistencia de otra persona para que asuma la resolución de problemas, manejo de responsabilidades, manejo de bienes y para la toma de decisiones.

3.1. Criterios de calificación. Para calificar otras áreas ocupacionales, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- Capacidad de ejecución.
- Dependencia: Implica su valoración en la adquisición de conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, de la ejecución en las tareas y demandas generales, de la comunicación y la de vida doméstica.
- Considerar el uso de cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por una persona con discapacidad, especialmente producido o generalmente disponible para prevenir, compensar, supervisar, aliviar o neutralizar la discapacidad; se incluyen aquí entre otras: órtesis, prótesis, cualquier producto, instrumento, equipo o tecnología adaptada o especialmente diseñada para mejorar el funcionamiento de una persona con discapacidad.

3.2. Escala de calificación. Para una mejor comprensión y facilidad del tipo de compromiso que puede tener una persona en estas cinco áreas ocupacionales, se aplica una escala de calificación compuesta por clases mutuamente excluyentes, denominadas: A, B, C, D y E. Estas incorporan criterios cualitativos, necesidad de ayudas y grado de dependencia cuando aplican. Esta escala aparece en la Tabla 4.

Tabla 4. Escala de calificación de otras áreas de ocupacionales *

Clase	Criterio cualitativo	Criterios para la asignación de la deficiencia (s) evaluada (s)
A	No hay dificultad-no dependencia	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y doméstica, no requiere de ayudas . Es independiente. NO DEPENDENCIA .

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Clase	Criterio cualitativo	Criterios para la asignación de la deficiencia (s) evaluada (s)
B	Dificultad leve-no dependencia	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere de mayor tiempo; no requiere de ayudas . Es independiente. NO DEPENDENCIA .
C	Dificultad moderada-dependencia moderada	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere del uso de ayudas técnicas para la ejecución de las mismas. DEPENDENCIA MODERADA .
D	Dificultad severa-dependencia Severa	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y doméstica, requiere ayuda de otras personas para el desarrollo de la actividad. La persona presenta una DEPENDENCIA SEVERA .
E	Dificultad completa-dependencia Grave-completa	La persona con sus habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación para iniciar, desarrollar y finalizar la adquisición del conocimiento, del cuidado personal, de la movilidad, en la ejecución de las tareas y demandas generales, de la comunicación y de la vida económica y doméstica requiere ayudas técnicas y/o ayuda personal; no realiza las actividades por sí sólo. DEPENDENCIA GRAVE-COMPLETA .

*Alonso, C; Rodríguez, E; Suárez H. Versión ajustada Junio de 2011. MANUAL ÚNICO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL. 2011

3.3. Clasificación de las otras áreas ocupacionales.

- Aprendizaje y aplicación del conocimiento:** Trata sobre el aprendizaje, la aplicación de los conocimientos aprendidos, el pensamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
- Comunicación:** Trata sobre los aspectos generales y específicos de la comunicación mediante el lenguaje, signos y símbolos, incluyendo la recepción y producción de mensajes, llevar a cabo una conversación y utilización de instrumentos para la comunicación.
- Movilidad:** Trata sobre moverse cambiando de posición el cuerpo, desplazarse de un sitio a otro y llevar, mover o manipular objetos, andar, correr o escalar y usar varias formas de transporte.
- Cuidado personal:** Trata sobre las habilidades del cuidado personal, lavarse y secarse uno mismo, el cuidado del cuerpo y partes del cuerpo, vestirse, comer y beber y cuidar de la propia salud.
- Vida doméstica:** Trata sobre cómo llevar a cabo tareas y acciones domésticas y cotidianas. Las áreas de la vida doméstica incluyen conseguir un lugar para vivir, comida, ropa y otras necesidades, limpiar y reparar el hogar, cuidar de los objetos personales y de los del hogar y ayudar a otras personas. Las áreas ocupacionales se expresan en la Tabla 5 con los valores de gravedad máximos individuales para la calificación.

Tabla 5. Relación por otras áreas ocupacionales y sus puntajes máximos individuales

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Otras áreas ocupacionales	Porcentaje máximo asignado
Aprendizaje y aplicación del conocimiento	4,0 %
Comunicación	4,0 %
Movilidad	4,0 %
Cuidado Personal	4,0 %
Vida doméstica	4,0 %
Puntaje total	20,0 %

Cada área ocupacional, tiene un valor máximo de 4,0 (cuatro), con valores internos proporcionales de gravedad, de acuerdo con el número de categorías por cada área ocupacional. El área ocupacional de aprendizaje y aplicación del conocimiento, tiene 16 categorías, cada una de estas con los siguientes niveles de gravedad:

A: 0,0, B: 0,1, C:0,2, D:0,3 y E:04. Las Tablas . 4, 6, 7, 8, 9 y 10 contienen los indicadores que constituyen cada una de las categorías descritas.

Tabla 6 Relación de las categorías para el área ocupacional de aprendizaje y aplicación de conocimiento con sus valores máximos individuales

1.	Aprendizaje y aplicación del conocimiento (valor máximo posible 4,0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1.1	Mirar: Usar el sentido de la vista intencionalmente para apreciar estímulos visuales, como ver un acontecimiento deportivo o niños jugando.					
1.2	Escuchar: Usar el sentido del oído para apreciar estímulos auditivos, como escuchar la radio, música o una lección.					
1.3	Aprender a leer, escribir y calcular: Desarrollar una competencia en la lectura de material escrito (incluido Braille) con fluidez y exactitud, como reconocer caracteres y alfabetos, vocalizar palabras, leer en voz alta con una correcta pronunciación y comprender las palabras y frases. Desarrollar competencia para producir símbolos en forma de texto que representen sonidos, palabras o frases de manera que tengan un significado (incluida escritura Braille), como deletrear correctamente y usar la gramática correcta.					
1.4	Aprender a calcular: Desarrollar competencia para manipular números y realizar operaciones matemáticas simples y complejas, como la habilidad de usar signos matemáticos (+,-) para sumar y restar, y aplicar el procedimiento matemático apropiado a cada problema.					
1.5	Pensar: Formular y manipular ideas, conceptos e imágenes, tanto orientadas como no a metas específicas, y que pueden ir acompañadas o no, como crear una ficción, probar un teorema, jugar con ideas, hacer una tormenta de ideas, meditar, valorar o ponderar, especular o reflexionar.					
1.6	Leer: Realizar actividades involucradas en la comprensión e interpretación de lenguaje escrito (ejemplo: libros, instrucciones o periódicos, en texto o Braille) con el propósito de obtener conocimientos generales o información específica.					
1.7	Escribir: Usar o producir símbolos escritos para transmitir información, como describir por escrito un evento o hacer un borrador de una carta.					
1.8	Calcular: Realizar cálculos aplicando principios matemáticos para resolver problemas que son descritos mediante palabras y producción o exposición de los resultados, tales como calcular la suma de tres números o encontrar el resultado de dividir un número entre otro.					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

1.	Aprendizaje y aplicación del conocimiento (valor máximo posible 4,0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1.9	Resolver problemas y tomar decisiones: Encontrar soluciones a problemas y situaciones detectando y analizando las consecuencias, desarrollando opciones y soluciones, evaluando efectos potenciales de las soluciones y ejecutando la solución escogida, como resolver una disputa entre dos personas.					
1.10	Llevar a cabo tareas simples: Llevar a cabo, acciones sencillas o complejas y coordinadas relacionadas con los componentes mentales y físicos implicados en una tarea, como iniciar una tarea, organizar el tiempo, espacio y materiales para una realizar una tarea, llevarla a cabo, completarla y mantener la actividad.					

X¹ Según Tabla 4.

Tabla 7. Relación de las categorías para el área ocupacional de Comunicación con sus valores máximos individuales.

2.	Comunicación (valor máximo posible 4,0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
2.1	Comunicarse con--recepción de--mensajes verbales.					
2.2	Comunicarse con--recepción de--mensajes no verbales: Comprender el significado literal e implícito de mensajes creados con gestos, símbolos y dibujos, como darse cuenta de que un niño está cansado cuando se frota los ojos o que una alarma significa que hay fuego.					
2.3	Comunicarse con --recepción de--mensajes en lenguaje de signos formal: Recibir y comprender mensajes en lenguaje de signos formal con un significado implícito y literal.					
2.4	Comunicarse con---recepción de---mensajes escritos: Comprender el significado literal e implícito de mensajes que están estructurados a través del lenguaje escrito (incluido Braille), como seguir eventos políticos en el periódico o entender el mensaje de una escritura religiosa o de una historia.					
2.5	Habla: Producir palabras, frases y párrafos en mensajes hablados con significado literal e implícito, como la habilidad de expresar un hecho o contar una historia en lenguaje oral.					
2.6	Producción de mensajes no verbales: Usar gestos, símbolos y dibujos para dar a entender mensajes, como la habilidad de asentir con la cabeza para indicar que estamos de acuerdo o dibujar un diagrama para ilustrar o expresar una idea compleja. Incluye: producir gestos corporales, señales, símbolos, dibujos y fotografías.					
2.7	Mensajes escritos: La habilidad de producir mensajes con significado literal o implícito, expresados mediante el lenguaje escrito, como escribir una carta a un amigo.					
2.8	Conversación: Iniciar, sostener y finalizar un intercambio de pensamientos e ideas, llevado a cabo a través de lenguaje hablado, escrito, de signos u otras formas de lenguaje, con una o más personas conocidas o extraños, en un ambiente formal o informal.					
2.9	Discusión: Iniciar, mantener y finalizar la evaluación de un problema, con argumentos a favor o en contra, o llevar a cabo un debate mediante lenguaje hablado, escrito, de signos u otras formas de lenguaje, con una o más personas conocidas o extrañas, en un ambiente formal o informal.					
2.10	Utilización de dispositivos y técnicas de comunicación: Usar dispositivos, técnicas, y otros medios con el propósito de comunicarse, como llamar a un amigo por teléfono.					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

X¹ Según Tabla 4.

Tabla 8 Relación de las categorías para el área ocupacional de movilidad con sus valores máximos individuales.

3.	Movilidad (valor máximo posible 4.0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
3.1	Cambiar las posturas corporales básicas y cambiar de lugar: Adoptar y dejar de mantener una postura y pasar de una postura a otra, como levantarse de una silla para tumbarse en una cama y adoptar y salir de las posiciones de arrodillamiento y levantarse.					
3.2	Mantener la posición del cuerpo: Mantener el cuerpo en la misma posición durante el tiempo necesario, como permanecer sentado o permanecer de pie en el trabajo o colegio.					
3.3	Levantar y llevar objetos: Levantar un objeto y llevarlo de un sitio a otro, como levantar una taza o llevar a un niño de una habitación a otra.					
3.4	Uso fino de la mano: Realizar acciones coordinadas relacionadas con manejar, recoger, manipular y soltar objetos, utilizando una mano, los dedos y el pulgar (los dedos de la mano), como levantar monedas de una mesa, o girar un tirador/perilla/picaporte.					
3.5	Uso de la mano y el brazo: Realizar las acciones coordinadas que se requieren para manipular y mover objetos utilizando las manos y los brazos, como girar tiradores/perillas/picaportes o lanzar o coger un objeto.					
3.6	Andar y desplazarse por el entorno: Avanzar sobre una superficie a pie, paso a paso, de manera que al menos un pie esté siempre en el suelo, como caminar hacia delante, hacia atrás o de lado. Mover todo el cuerpo de un sitio a otro de una manera que no sea andando, como escalar una roca, correr por una calle, saltar en un pie, correr, brincar, correr esquivando obstáculos.					
3.7	Desplazarse por distintos lugares: Andar y moverse por varios lugares y situaciones, como andar por las habitaciones de una casa, dentro de un edificio o por la calle de un pueblo.					
3.8	Desplazarse utilizando algún tipo de equipo: La habilidad para mover todo el cuerpo de un lugar a otro, en cualquier superficie o espacio, utilizando dispositivos específicos diseñados para facilitar el movimiento o crear métodos distintos de moverse, como equipo para patinar, esquiar, bucear, o moverse por una calle en una silla de ruedas o con un andador.					
3.9	Utilización de transporte como pasajero: La habilidad para utilizar cualquier tipo de transporte para desplazarse como pasajero, como ser llevado en un coche, autobús, minibús, carro tirado por personas, animal, transporte impulsado por animales, taxi público o privado, autobús tren, tranvía, metro, barco o avión.					
3.10	Conducción: Dirigir y mover un vehículo o el animal que lo empuja; conducir u operar cualquier medio de transporte, ya sea con motor, de tracción humana o animal, como un coche, una bicicleta, un barco/bote o montar animales.					

X¹ Según Tabla 4.

Tabla 9. Relación de las categorías para el área ocupacional de cuidado personal con sus valores máximos individuales.

4.	Cuidado personal (valor máximo posible 4.0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
4.1	Lavarse: Lavarse y secarse todo el cuerpo o partes del cuerpo, utilizando agua y materiales o métodos apropiados de lavado y secado, como					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

4.	Cuidado personal (valor máximo posible 4.0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
	bañarse ducharse, lavarse las manos y la cara, el pelo; y secarse con una toalla.					
4.2	Cuidado de partes del cuerpo: Como por ejemplo la piel, la cara, los dientes, el cuero cabelludo, las uñas y genitales, que requieren más que lavar y secar.					
4.3	Higiene personal relacionada con los procesos de excreción: Planificación y ejecución de la eliminación de residuos humanos (menstruación, orinar y defecar) y la propia limpieza posterior.					
4.4	Vestirse: Llevar a cabo las acciones coordinadas relacionadas con ponerse y quitarse ropa y calzado en el orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas, como poner, colocar y quitar, camisas, faldas, blusas, pantalones, ropa interior, medias, sombreros, guantes, abrigos, zapatos, botas, sandalias y zapatillas/pantuflas.					
4.5	Quitarse la ropa: Llevar a cabo las tareas coordinadas precisas para quitarse ropa de las diferentes partes del cuerpo, como quitarse ropa por la cabeza, de los brazos y los hombros, y de la parte superior e inferior del cuerpo; quitarse guantes y el sombrero.					
4.6	Ponerse calzado: Llevar a cabo las tareas coordinadas precisas para ponerse calcetines, medias y calzado.					
4.7	Comer: Llevar a cabo las tareas y acciones coordinadas relacionadas con comer la comida que está servida, llevarla a la boca y consumirla de una manera culturalmente aceptable, en un contexto/entorno uniforme, cortar o partir la comida en pequeños trozos, abrir botellas y latas, usar cubiertos; actividades relacionadas con banquetes, fiestas o cenas.					
4.8	Beber: Sujetar la bebida, llevarla a la boca y consumir la bebida de una manera culturalmente aceptable, en un contexto/entorno uniforme, mezclar, revolver y preparar líquidos para ser bebidos, abrir botellas y latas, beber mediante un pitillo o de grifo o fuente.					
4.9	Cuidado de la propia salud: Asegurar la salud y bienestar físico y mental, en un contexto/entorno uniforme, como mantener una dieta balanceada/equilibrada, un nivel adecuado de actividad física, una temperatura corporal adecuada, prevenir daños para la salud, seguir prácticas sexuales seguras, incluyendo el uso de preservativos, seguir los planes de inmunización y realizar exámenes físicos regulares.					
4.10	Control de la dieta y la forma física: Cuidar de uno mismo siendo consciente de las propias necesidades, por ejemplo seleccionando y consumiendo comida nutritiva y manteniendo la forma física.					

X¹ Según Tabla 4.

Tabla 10. Relación de las categorías para el área ocupacional de la vida doméstica con sus valores máximos individuales.

5.	Vida doméstica (valor máximo posible 4.0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
5.1	Adquisición de un lugar para vivir: Comprar, alquilar, amueblar y organizar una casa, apartamento u otra vivienda.					
5.2	Adquisición de bienes y servicios: Seleccionar, obtener y transportar todos los bienes y servicios necesarios para la vida diaria, como seleccionar, obtener, transportar y almacenar comida, bebida, ropa, productos de limpieza, combustible, artículos para la casa, utensilios, baterías de cocina, aparatos domésticos y herramientas; procurarse servicios y utilidades domésticas.					
5.3	Comprar: Conseguir a cambio de dinero, bienes y servicios necesarios para la vida diaria (incluyendo enseñar y supervisar a otra persona para					

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

5.	Vida doméstica (valor máximo posible 4.0)	Clases X ¹				
		A	B	C	D	E
	Nivel de gravedad, excluyentes entre los cinco indicadores	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
	que haga la compra), como la selección de alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos para la casa o ropa en un mercado o tienda; comparar la calidad y precio de los productos necesarios, negociar y pagar por los bienes o servicios seleccionados y transportar los bienes.					
5.4	Preparar comidas: Idear, organizar, cocinar y servir comidas sencillas y complicadas para uno mismo o para otras personas, como decidir el menú, seleccionar alimentos y bebidas, reunir los ingredientes para preparar una comida, poner al fuego los alimentos y preparar comidas y bebidas frías, y servir la comida.					
5.5	Realizar los quehaceres de la casa: Ocuparse de la casa limpiándola, lavando la ropa, usando aparatos domésticos, almacenando comida y eliminando la basura, como barrer, pasar el trapeador, limpiar las encimeras, paredes y otras superficies; recoger y eliminar la basura de la casa; ordenar habitaciones, armarios y cajones; recoger, lavar, secar, doblar y planchar ropa; limpiar calzado; utilizar escobas, cepillos y aspiradoras; utilizar lavadoras, secadoras y planchas.					
5.6	Limpieza de la vivienda: Lavar la vivienda, ordenar y quitar el polvo, barrer, fregar y pasar el trapeador a los suelos, limpiar ventanas y paredes, limpiar cuartos de baño e inodoros/excusados, limpiar muebles.					
5.7	Cuidado de los objetos del hogar: Mantener y reparar los objetos del hogar y otros objetos personales, incluyendo la casa y su contenido, la ropa, los vehículos y los dispositivos de ayuda y el cuidado de plantas y animales, como pintar o empapelar las habitaciones, reparar los muebles, reparar las cañerías, asegurarse de que los vehículos funcionan adecuadamente, regar las plantas, cuidar y alimentar mascotas y animales domésticos.					
5.8	Ayudar a los demás: Ayudar a miembros de la casa y a otras personas en su aprendizaje, en la comunicación, en el auto cuidado o en el desplazamiento dentro o fuera de la casa; preocuparse por el “bienestar” de los miembros de la casa y de otras personas.					
5.9	Mantenimiento de los dispositivos de ayuda: Reparar y cuidar de los dispositivos de ayuda, como prótesis, órtesis y de herramientas especializadas y de dispositivos de ayuda para la casa y el auto cuidado; mantenimiento y reparación de dispositivos de ayuda para la movilidad personal como bastones, andadores, sillas de ruedas y ciclomotores; y mantenimiento de dispositivos de ayuda para la comunicación y el tiempo libre.					
5.10	Cuidado de los animales: Cuidar de los animales domésticos y las mascotas, alimentar, limpiar, cepillar y sacar a hacer ejercicio a las mascotas; cuidar de la salud de animales y mascotas; asegurarse del bienestar y cuidado de animales o mascotas cuando uno está ausente.					

X¹ Según Tabla 4.

Capítulo IV Valoración de Roles Ocupacionales

1... Valoración de las limitaciones para bebés, niños, niñas.

Trata sobre la valoración para niños y niñas de 0 a 3 años, con base en el desarrollo neuroevolutivo propio de esta etapa del ciclo vital. Para su aplicación se tiene en cuenta la actividad motriz y la actividad adaptativa, de acuerdo con la escala de calificación dada en la Tabla 11. Para esto, se utilizan las 25 categorías expuestas en la Tabla 12.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Tabla 11. Escala de calificación para limitaciones en bebés, niños y niñas de 0-3 años

Clase	Valor asignado	Criterio cualitativo	Criterios para la asignación de la deficiencia (s) evaluada (s)
A	0	No hay dificultad-no dependencia	El bebé, niño o niña es independiente en la realización de la actividad motriz y adaptativa.
B	1	Dificultad moderada-dependencia moderada	El bebé, niño o niña es semi- independiente en la realización de la actividad motriz y adaptativa, con el uso de ayudas técnicas o tecnología de asistencia, o de la madre o cuidador.
C	2	Dificultad completa-dependencia Grave-completa	El bebé, niño o niña es dependiente en la realización de la actividad motriz y adaptativa, con o sin uso de ayudas técnicas o tecnología de asistencia, o de la madre o cuidador.
NA	2 (se redistribuye según fórmula)*	No hay dificultad-no dependencia	El bebé, niño o niña es independiente en la realización de la actividad motriz y adaptativa. La conducta se encuentra integrada por neurodesarrollo o por la edad no se espera que esté presente.

*Al calificar las limitaciones en actividades de la vida diaria acorde a desarrollo neuroevolutivo, para aquellos niños y niñas que no tienen dificultad, ya sea por procesos integrativos o edad, los puntos de este valor se redistribuyen matemáticamente según metodología.

Tabla 12. Valoración para niños y niñas de 0 a 3 años.

Criterios según desarrollo Neuroevolutivo para niños y niñas de 0 a 3 años.					
Actividad Motriz					
		0	1	2	NA
1	Mantiene una postura simétrica o alineada				
2	Tiene actividad espontánea				
3	Sujeta la cabeza				
4	Se sienta con apoyo				
5	Gira sobre sí mismo				
6	Se mantiene sentado sin apoyo				
7	Pasa de tumbado a sentado				
8	Se pone de pie con apoyo				
9	Da pasos con apoyo				
10	Se mantiene de pie sin apoyo				
11	Anda sólo				
12	Empuja una pelota con los pies				
13	Anda sorteando obstáculos				
Criterios según desarrollo Neuroevolutivo para niños y niñas de 0 a 3 años.					
Actividad Adaptativa					
14	Reflejo de succión				
15	Fija la mirada				
16	Sigue la trayectoria de un objeto				
17	Sostiene un sonajero				
18	Tiende la mano hacia un objeto				
19	Sostiene un objeto en cada mano				
20	Abre cajones				
21	Bebe sólo				
22	Se quita una prenda de vestir				
23	Reconoce la función de los espacios de la casa				
24	Imita trazos con el lápiz				
25	Abre una puerta				

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

		N0	N1	N2	
	SUMATORIA (SUMAR LOS VALORES ADJUDICADOS A LAS 25 CATEGORÍAS)	0	0	0	
	SUMATORIA DE LAS CATEGORIAS CALIFICADAS CON NO APLICA (NA)				0

*NA= No aplica porque la actividad calificada como tal no debe existir para la edad; por ejemplo: ítem 22, se quita una prenda de vestir, no aplicaría para un bebé de tres meses.

Alonso, C; Rodríguez, E; Suárez H. Versión ajustada Rodríguez, F; Suárez, H. Noviembre de 2016. MANUAL ÚNICO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL. 2016-2018

Metodología

1. Determinar el número de ítems que corresponden a cada categoría (0,1,2 y NA), de manera tal que el número de ítems con cero (0) se reemplazaran en la fórmula en el valor N0 y el número de ítems con uno (1), se reemplazara en la fórmula en el valor N1 y el número de ítems con dos (2), se reemplazara en la fórmula en el valor N2
2. Multiplicar por dos (2) el número de categorías que no aplican (NA), obteniendo así el valor a redistribuir entre las tres categorías restantes.
3. Sumar el número de categorías 0,1 y 2
4. El valor obtenido en el numeral 2, es decir el valor a redistribuir, se divide entre el valor obtenido en el numeral tres (3), obteniendo así el valor K por cada ítem.
5. Aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Valor final del Título II para niños y niñas de 0 a 3 años} = ((1*N1)+(N1*K*0,5) +(2*N2)+(N2*K*1))$$

2. Valoración de los roles ocupacionales de juego-estudio y de las limitaciones en otras áreas ocupacionales para niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes.

Esta tabla aplica para los niños y niñas mayores de 3 años y adolescentes, teniendo en cuenta que para desempeñar los roles de juego y estudio propios de la edad, participan en los mismos, mediante la selección de elementos, herramientas, juguetes, accesorios, equipos mecánicos o electrónicos, entre otros, de acuerdo con su edad para dar una organización a una actividad, manejan su contexto, imitando y participando con otras personas de sus mismos grupos en diferentes contextos. Para estos casos, se utiliza la Tabla 13 siguiendo la metodología:

- a) Seleccione la categoría de acuerdo a los criterios dados que represente la restricción en el rol ocupacional de los niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes y asigne el valor correspondiente.
- b) El valor obtenido representa la restricción del rol ocupacional
- c) Aplique las tablas correspondientes a las áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria (6,7,8,9 y 10), tomando como referencia los criterios de la Tabla 4.
- d) La sumatoria del rol y de las otras áreas ocupacionales, será el valor final del Título II, que sin ponderar se suma con el valor ponderado del Título I.

Tabla 13. Valoración de los roles ocupacionales de juego-estudio en niños y niñas mayores de tres (3) años y adolescentes.

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
Rol Ocupacional sin dificultad-no dependencia Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación, no requiere de dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) , ni de otras personas para la ejecución de las actividades de juego-estudio. Es independiente.	0%
Rol ocupacional con dificultad leve-no dependencia Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación, requiere de mayor tiempo; no requiere de dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) ni de otras personas para la ejecución de las actividades de juego-estudio. Es independiente. NO DEPENDENCIA	6 %
Rol ocupacional adaptado con dificultad leve Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación con modificaciones en el contexto o entorno habitual DIFICULTAD LEVE con DEPENDENCIA ADAPTADA	12 %
Rol ocupacional adaptado con dificultad moderada-dependencia moderada Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación con el uso de dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) para el desarrollo de las actividades de juego-estudio. La persona presenta una DIFICULTAD MODERADA con DEPENDENCIA MODERADA .	18 %
Rol ocupacional con dificultad severa-dependencia severa Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación con la presencia dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) o ayuda de otra persona. La persona presenta una DEPENDENCIA SEVERA .	24 %
Rol ocupacional con dificultad completa-dependencia Grave- completa No cuenta con las habilidades o destrezas para iniciar, desarrollar y finalizar la ejecución de las tareas básicas o las escolares, el juego y la comunicación. Mediante dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) y/o ayuda de otra persona no realiza las actividades de juego-estudio. DEPENDENCIA GRAVE-COMPLETA .	30 %

Fuente: Alonso, C; Rodríguez, E; Suárez H.(2011). Versión ajustada por Rodríguez y Suarez, (2018)

3. Valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en adultos mayores.

Esta tabla aplica para los adultos que nunca han tenido un trabajo habitual por su condición de salud y los adultos mayores de 60 años, no activos laboralmente, teniendo en cuenta que para desempeñar estos roles participan de acuerdo con sus gustos e interés, así como capacidad económica en diferentes actividades familiares y comunitarias, de forma individual o colectiva, acorde a su edad en diferentes contextos, participando en actividades de recreo y ocio, tales como: juegos y deportes informales, programas de bienestar físico, relajación, diversión o entretenimiento, ir a galerías de arte, museos, parques, cines, teatros y lugares públicos o privados; participar en manualidades o hobbies; leer por entretenimiento; interpretar instrumentos musicales; ir a ver paisajes, turismo y viajar por placer, entre otras.

También se incluyen actividades como socializar y participar en reuniones informales con otros, o visitar a amigos, familiares y reunirse en lugares públicos, así como las relacionadas con otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras. Para estos casos, se utiliza la Tabla 14 teniendo en cuenta la siguiente metodología:

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

-
- a. Seleccione la categoría de acuerdo a los criterios dados que represente la restricción en el rol ocupacional del adulto o adulto mayor. y asigne el valor correspondiente.
 - b. El valor obtenido representa la restricción del rol ocupacional.
 - c. Aplique las tablas correspondientes a las áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria, tomando como referencia los criterios de la Tabla 4.
 - d. La sumatoria del rol y de las otras áreas ocupacionales, será el valor final del Título II, que sin ponderar se suma con el valor ponderado del Título I.

Tabla 14. Valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en adultos y adultos mayores.

Categoría	Porcentaje máximo asignado
<p><u>Rol Ocupacional sin dificultad-no dependencia.</u></p> <p>La persona cuenta con las habilidades para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento, no requiere de mayor tiempo; no requiere de dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) , ni de otras personas. Es independiente. NO DEPENDENCIA.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima (MMM), puede realizar su actividad o rol ocupacional, sin limitación ni restricción alguna en y para:</p> <p>Tareas y operaciones propias del rol: Puede realizar todas las tareas principales o básicas y las secundarias o accesorias de la actividad o rol ocupacional desempeñado sin restricción alguna</p> <p>Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: adecuados, sin limitación</p> <p>Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 100% de acuerdo a la actividad ocupacional- rol ocupacional desempeñado. NO DEPENDENCIA</p>	0 %
<p>Rol ocupacional con dificultad leve-no dependencia</p> <p>Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento, requiere de mayor tiempo; no requiere dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros) , ni de otras personas. Es independiente. NO DEPENDENCIA.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima (MMM), puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones leves en y para:</p> <p>Tareas y operaciones propias del rol: Realiza las tareas básicas o principales y no puede realizar o participar en algunas de las tareas secundarias su rol ocupacional.</p> <p>Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones leves para la ejecución de los mismos en el rol ocupacional</p>	6 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 80% de acuerdo al tiempo destinado a su rol ocupacional. NO DEPENDENCIA.	
Rol ocupacional adaptado con dificultad moderada Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento con modificaciones en el contexto o entorno habitual. DEPENDENCIA MODERADA La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima (MMM), puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones moderadas en y para: Tareas y operaciones: Necesita contar dispositivos (modificaciones en el entorno o apoyos, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes, prótesis e incluso ayuda de otro para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias su actividad o rol ocupacional. Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: Con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad-rol ocupacional. Tiempo de ejecución: con limitación del 20% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o el accidente	12 %
Rol ocupacional adaptado con dificultad grave Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento con dispositivos (ayudas técnicas- prótesis, ortesis, ajustes, tecnologías entre otros). DEPENDENCIA GRAVE La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima, puede realizar su actividad o rol ocupacional con limitaciones y restricciones graves pese al uso de dispositivos(ayudas técnicas, modificaciones o apoyos en el entorno, prótesis, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes e incluso ayuda de otra persona) Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos.) Con limitación del 50% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o el accidente	18 %
Rol ocupacional con Dificultad severa-dependencia severa	24 %

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

Categoría	Porcentaje máximo asignado
<p>Con las habilidades cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento con la ayuda de otras personas. La persona presenta una DEPENDENCIA SEVERA.</p>	
<p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima (MMM), puede realizar su actividad o rol ocupacional, con limitaciones y restricciones completas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Con el uso o no de ayudas técnicas, modificaciones o apoyos en el entorno, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes e incluso ayuda de otra persona solo se puede desempeñar en algunas actividades ocupacionales, con limitaciones moderadas o completas para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias de su rol ocupacional.</p> <p>Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones severas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad y rol ocupacional</p> <p>Tiempo de ejecución: Con limitación del 100% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de l en enfermedad o el accidente.</p>	
<p>Rol ocupacional con dificultad completa-dependencia completa</p> <p>No cuenta con las habilidades o destrezas para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento. Mediante dispositivos (ayudas técnicas, prótesis, ayudas técnicas y/o ayuda personal) no realiza las actividades,. DEPENDENCIA COMPLETA</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima (MMM), no puede realizar ninguna actividad ocupacional y presenta limitaciones y restricciones completas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Con o sin el uso ayudas técnicas, modificaciones o apoyos en el ambiente, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes e incluso ayuda de otra persona. No se puede desempeñar en ninguna actividad ocupacional. Puede requerir rehabilitación vocacional en alguna institución o solo desarrolla actividades para el uso del tiempo.</p> <p>Componentes del desempeño: (Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: con limitaciones completas para la ejecución la actividad o rol ocupacional.</p> <p>Tiempo de ejecución: Limitación total para cualquier tipo de actividad o rol ocupacional. Con limitación del 100% para cualquier tipo de jornada laboral.</p>	30 %

Fuente: Tabla creada por Rodríguez, FE; Suarez, HR (2018)

Continuación del Anexo Técnico al Decreto “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”

BORRADOR - APORTES